




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2588/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2588/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2588/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2588/A

A. XVIII. 0. 51

2588 / A

Phi

Wetdug de veld de veld de veld

3.10.15 8948

1225

XV

Galeni

1549


EX BIBLIOTHECA
DOMINICANORUM
MONTIS POLITIANI

1786.

*cap
2im
1786
i. May*

2588/A


~~Ex libro d. Bartholomeo~~

~~Conventus~~ 

Conventus S. Domini
ei de Cortona; recepit
ab exilatore

Bi. Rubeo

De J. Nicolau Barbe-
ria.



CLAVDII
GALENI DE

LOCORVM AFFE-
CTORVM NOTITIA

LIBRI SEX,

*

Gulielmo copo Basiliensi
interprete.

*Singulari diligentia recogniti, breuiq; atq;
eadem dilucida expositione marginali
non vulgarnet illustrati.*

REM MAXIMAM SIBI



PROMITTIT PRUDENTIA.

M


LVGDVNI,

Apud Gulielmum Rouillium

Sub scuto Veneto.

1549





AD CHRISTIANISSI-

MVM FRANCORVM REGEM

Lodoicum XII. Gulielmi Copi

Basileiensis in librum Gale

ni de Affectorum lo

corum notione,

Prafa-

tio.

*



Consideranti mihi, Christianis-
sime Rex, varia mortalium
studia, quibus optimum finem.
summumq; bonum assequi pro
viribus quisque nititur, rectis-
sime hortari videtur Satyricus, id praecipue &
solum optandum esse, ut sit mens sana in cor-
pore sano. Verum tanta est prohi dolor hodie
hominum peruersitas, ut neglecto animo post-
habitaq; corporis salute, omne studium ad di-
uitias conuertant, eoq; deuentum sit, ut quo
quisque maiorem pecuniarum cumulum osten-
tare potest, eo videatur maiore honore di-
gnus: cum interim viri & morum probita-
te, & bonis literis praediti, quod diuitiis non
affluant, non solum debito priuentur hono-
re, verum etiam pro stultis reputentur. Id ni-
mirum cause esse videtur, cur tam pauci no-
stra tempestate recte philosophentur. Cum pri-

EPISTOLA.

mum enim tres, quatuorve literulas scioli qui-
 dam deliberauerint, non veritatem inquirere, sed
 diuites illos adulando captare student, quo ali-
 quid ab ipsis pecuniarum detrudere, & instar il-
 lorū primas sedes in conuenticulis occupare pos-
 sint. Sanè sunt nonnulli, qui vix delibatis sacra-
 rum literarum primis rudimentis, protinus ad
 aucupanda (vt aiunt) beneficia nihil reliqui fa-
 ciunt. Alij perlectis tribus, quatuorve Bartoli ar-
 gumentis, nunquam inspecto Pandectarum, Co-
 dicisve cortice ad agendas causas properant, non
 vt tueatur pupillum, sed vt pecunias, quibus plu-
 rima sibi lati fundia comparent, ab eo astute ex-
 torqueant. Sic etiam inueniuntur non pauci (vt
 interim professionis meae non obliuiscar) qui cum
 primum aut ptisanam nominare, aut vino agris
 interdicare, aut clysterē iniicere nouerunt, preti-
 nus medicam artem professi, populatim miseris
 mortalibus graui cum periculo imponere non erub-
 bescunt, ac potentes illos adulationibus captare
 aggrediuntur, neglectis spretisq; doctissimorum
 medicorum Hippocratis, Galeniq; monumentis.
 Quippe nemo iam inde ex tam longo aeuo inuen-
 tus est adeo veritatis studiosus, vt illorum libros
 ex Graeca lingua in Latinam vertere curauerit.
 Quanquam inueniuntur aliqui, qui Galeni ope-
 ra vt Latina circumferant, credantq; sese ei tan-
 quam à secretis esse, atque iactent, nullum sese Ga-
 leni locū nō intelligere. Ego verò haudquaquam

cte

EPISTOLA.

crediderim Galeni mentem ex illis libris à quo-
 quam deprehendi posse, quos ne ipse quidem au-
 tor, si viueret, esset intellecturus, adeò deprauata
 est illorum librorum series, vt ex mille versibus
 vix vnus Galeni mètem referre videatur. Quod
 nonnulli intelligentes, reiectis Galeni libris, Au-
 cennam potius imitari voluerunt, quòd scilicet
 concinno (vt aiunt) ordine, vastū illū Canonem
 suum texuerit. Qui si diligēter multa quæ de cu-
 randi ratione conscripsit capita, ad amūssim exa-
 minassent, non ordinem & lucem, sed tenebras
 potius & confusum chaos offendisse se faterētur.
 Contrā verò si Galeni tres doctrinas, ordine con-
 tentas, olfecissent, summo tum ordine tum artifi-
 cio ipsum commentarios suos scripsisse haudqua-
 quam negarent. Equidē fateri audeo, multò plus
 solidæ doctrinæ, biennio ex Galeni lectione disci-
 pulum reportaturum, quàm si decem perpetuis
 annis Auicennæ Canonē reuoluat. Id verò faciliè
 videre est, vel in eo libro quem de locorum affe-
 ctorum notione, conscripsit. Quem si quis diligen-
 ter sepenumeroq; perlegerit, omnes internorum
 morborum notas, & multò facilius deprehendet,
 & tenaciori memoria seruabit, quàm si assidue
 inexhaustam illam signorū Auicennæ congeriem
 legendo repetat. Hūc ego Galeni librum, ne nihil
 agerem, cum in strenua ista tua contra Anglos
 expeditione, vnā cum doctissimis Medicis tuis ca-
 stratua sequerer, ex Græco Latinum feci, sperans

EPISTOLA.

hoc opus non solum medicis, sed vniuersis quoque mortalibus profuturum. Nam latentes morbos quam facillime dignoscere docet. sine qua notitia nullum affectum recte curari posse apud omnes medicos in confesso est. Caterum qui maximum medicum, maximi quoque principis nomine illustratum, in publicum prodire decebat, tu mihi Rex inuicissimè hoc ipso nomine pulcherrimè succurristi, cui opus hoc dedicarem. Quippe qui iustitie animi administratione Traianum, victoriarum numero Alexandrum Macedonem, clementia Iulium Cæsarem facile superas, & quod ad religionem pertinet, sanctissimi regis Lodoici vestigia intentis neruis imitari conaris. Suscipe igitur Christianissime Rex benigno vultu, has nostras, quas in medio armorum strepitu exarauimus lucubrationes. Sic enim ad reliqua Galeni volumina interpretanda animum mihi eriges, & vniuersum mortale genus hoc non mediocri beneficio perpetuis amoris Vinculis tibi obligabis. Vale Christianissime Rex, ex Parisiorum Lutetia, Anno millesimo quingentesimo decimo tertio.



INDEX COPIO-

SISSIMVS EORVM OM-
nium quæ in Libris de Locis affectis conti-
nentur: cuius prior numerus, paginam: poste-
rior lineam indicat.



- Abscessus co- Abscissus suffusio-
 li. 4. 24 nis ab ore ventriculi
 Abscessus in procedentium notæ.
 gula. 287. 8 188. 13
 Abscessus in muscoli epi Acerbum. 95. 22
 gastrij. 304. 17 A crasso humore, mor-
 Abscessus renum indi- buscomitalis. 147. 4
 cia. 335. 22 Acris humor singultum
 * Accidētia hysterica ad & conuulsionem effi-
 vterū pertinent. 364. 15 cit. 179. 17
 Accidētia inflammatio- * Actio. 14. 3. & 26. 27
 nis. 81. 1 Actio læsa. 37. 14. & 28.
 Accidentia melanco- 13. & 121. 29. & 104. 26
 lia. 162. 27 Actionis læsio. 121. 29.
 Accidentia ob astricta & 124. 14.
 menstrua. 372. 8 Actio muscu. ani. 347. 13
 Accidentia venæ erosæ Actio propria. 107. 24
 aut ruptæ. 283. 8 Actio respirationis ad
 Accidentia pleuritidis. thoracē pertinet. 276.
 277. 27 19
 Accidentia propria. 39. Actio musculorū thora-
 27 cis per somnum serua-

INDEX.

- tur. 256.6 Affecti iecinoris notæ. 297.8
- Actiões morales. 137.18 Affecti musculi circa spi-
nam. 54.9
- Actiões principales. 137.17 Affecti nerui faciei. 178.27
- * Aduersus Erasistratios de transumptione san-
guinis ex magna arte. 269.6 Affecti stomachi singul-
tus. 168.27
- * Aegrotare. 28.5 Affectus. 26.28
- Aegrotus interrogandus de suo affectu. 286.1 Affectiões hypochondriacæ. 151.13
- Aenea fistula, Catheter. 9.17 Affectio instrumento-
rum seminis gonorr-
rhæa. 379.7
- Aequalis & inæqualis pulmonis intemperies, 244.13. Affectiões similiarum
& instrumentaliū par-
tium. 198.10
- Aestus signa. 214.3 Affectorum locorū ge-
nerales notæ. 104.1
- * Affectæ partes digno-
scendæ, priusquàm adhi-
beantur remedia. 219.8 Affectorum locorum
quintuplex deprehen-
sio. 37.6. & 123.23
- Affecta pars quando di-
catur. 20.17. & 118.4 Affectorū pulmōis brō-
chiorum notæ. 242.18
- Affecti colis virilis indi-
cia. 376.21 Affectorum spinæ ner-
uorum notitia. 51.25
- Affecti iecinoris indicatiū
euentissimum ab ex-
crementis per aluum
deiectis. 310.23 Affectum colicū quo-
modo discernas à ne-
phritide. 329.24
- Affe

I N D E X.

- | | |
|--|--|
| Affectū pulmonis cor- | Affectus priapismi vn- |
| dis pulsatio sequitur. | de. |
| 252.17 | 385.16 |
| Affectuum capitis cura- | Affectus primitiuus. |
| tio. | 109.10 |
| 110.5 | Affectus primogenius. |
| Affectus cerebri phreni- | 140.19 |
| tidem indicātes. 281.4 | Affectus proprii cordis. |
| Affect ^o cognitio ex pro | 257.11 |
| priis accidentibus. 39.2 | Affectus propri ^o . 25. 28. |
| Affectus colici experi- | & 40.23. & 11.6 |
| mentum. | Affectus pulmonis. 241. |
| 34.20 | 13 |
| Affectus hydropicorū. | Affectus quatuor modis |
| 302.13 | deprehenditur. 37.12 |
| Affectus ceruicis ali ^o an- | Affectus renū proprius |
| ginæ nō similis. 212.16 | diabetes. 344.24 |
| Affectus inflāmatorius. | Affect ^o scotomatici no |
| 63.14. | tæ. |
| Affectus lien, melancho | 171.15 |
| licam mæstitiam gi- | Affect ^o stomachi. 289.1 |
| gnit. | Affectus vertiginosi o- |
| 326.3 | rigo. 172.22 |
| Affectus lienis quib ^o no | Affectus ventriculi spa- |
| tis discernantur. 323.13 | tij. 293.25 |
| Affectus œsophagi. 284 | Affectus vesicæ ob im- |
| 12 | becillitatem. 327.21 |
| Affectus panniculi cor- | * Affici per consensum. |
| dis. | 25.26. & 41.10. & 109. |
| 260.23 | 17. & 113.19 |
| Affectus per cōsensum. | * Aloë. |
| 25.25. & 40.26. & 109. | 189.25 |
| 17. & 113.19. & 40.22 | |

INDEX.

- Ex Aloë medicamentū. Angustia in spiritalibus
 290.24 instrumentis. 214.17
 Alteratrix facult. 314.18 Anhelitus nocumentū,
 Alui excrementa indicāt periculum in apople-
 affectum iecur. 310.23 xia. 170.17
 Aluus adstricta. 55.5 Anima. 153.12
 *Amatores Phœnices à Animalis facultas. 45.5
 cibo abstinent. 368.1 Animæ essentia dissolu-
 Amissa memoria. 139.25 tio. 257.10
 *Analogia. 118.2 Animæ pars quomodo
 Anasarca. 302.5 lædatur. 108.5
 Anatomia nervorū ad Animæ princeps facul-
 tempora & nares ac la- tas. 16.8. & 107.11
 bra pertinentiū. 200.4 Animæ sedes præcipua.
 ἀνατομή. 324.12 134.18
 Angina. 40.3. & 202.8. Animæ sedes. 147.28
 & 229.2 Animalia cur ad coitum
 Angiæ definitio. 210.25 excitentur. 360.22
 Anginam indicantes no Animalia instrumenta.
 ta. 202.25 56.10
 Anginæ quatuor gene- Animalia latentia. 112.7
 ra. 212.5 & 136.4.
 Angina in dispnoæ spe- Animalis spiritus. 147.
 ciem transit. 236.4 22. & 197.15
 Anginosi. 210.22 Ani musculi act. 347.13
 Angulosa spine luxatio. Anterior cerebri pars af-
 208.3 fecta. 195.21
 Angustia plenus dolor. Antidotū Philonis. 70.1
 832.6 Antipatri medici morbo
 quo

I N D E X.

- quo extitit est. 250.12 Aqua inter cutem. 153.25
 Antipatri morbus. 252.2 Aqua intercus ex indu-
 *Apnoea nulla, aut abo rato liene. 324.15
 lita spiratio. 240.1 Aqua inter cutem vitio
 Apnoea omnibus parti- splenis. 325.26
 bus cōmunis. 240.17 *Archigenes. 75.16. &
 Apnus Heraclidis. 356. 116.18
 20 Archigenis apophleg-
 Apophlegmatif. 136.11 matif. 129.17
 Apophlegmatifimus Ar- Archigenis epistolæ.
 chigenis. 129.17 126.27
 Apoplexia. 177.4.195.1 Archigenis error. 11.15
 Apoplexiæ ex anhelitus Ardentes febres. 297.23
 nocumento periculū. Ariditas. 146.1
 170.17 Arteria aspera. 103.12
 Apoplexiæ succedit pa- Arteriæ magnæ vasa,
 ralyfis. 196.8 per quæ sanguis in pul-
 Apople. vehemēs. 255.6 monem transfertur.
 Appetentia. 344.9 267.22
 Appetentia canina. 292. Arteriæ pudendis inna-
 24. & 340.2 tæ. 384.29
 Apoplexiæ magnitudo. Arteriæ pulsant sine dō-
 179.5 lore. 62.10
 *Aquæ frigida potio. Arteriarum sectio ver-
 302.29 tiginosis indicta apud
 Aquæ gutta lapidem ex- antiquos. 172.7
 cauans. 23.4 Artificiofa coniectura.
 Aquæ vitiofa frigida 12.12. & 122.18
 potio. 325.19 *Ascites. 302.8
 Ascle

INDEX.

- Asclepiadis error. 16.5 uulsionem soluens.
 ἀσκληπιάδα. 29.10 291.10
 Ascensus humoris ad ca Bilis atra. 148.20
 put in epilepsia. 164.15 Bilis atræ differentia.
 Aspera arteria. 103.12 149.16
 Astringens. 89.4 *Blæsi. 231.23
 Astringens sapor. 95.24 *Bronchia quid vocen-
 *Athleta Secundus, cō- tur. 242.20
 presso spiritu laborās. Bronchion. 2.15
 216.14 Bronchiorum pulmo-
 Atra bilis. 148.20 nis affectorum notæ.
 Atræ bilis differentia. 242.18
 149.16 *Bubo ab vlcere. 26.13
 Atrox dolor. 95.9 C Achexia. 153.26
 Attractrix facultas. 314. C Calidæ intēperies
 15 iecinoris. 308.28
 *Auditus. 198.26 Calculi notæ. 9.10
 Auiculæ seleucides. 340. Caloris fons cor. 254.4
 29 Caluariae fractura. 108
 Austerum. 95.29 19
 Austerus dolor. 93.1 Canina appetentia. 292.
 Austerus sapor. 95.23 24. & 340.22
 *Axioma. 19.23 Canis rabiosi sputum ra-
 B Albi. 231.22 biem excitat. 364.2
 Balneæ. 136.22 Cantoribus & athletis
 *Biliosus succus in cere- rugosa pudenda. 388.1
 bro abūdans, visorum Capitis dolorum diffe-
 causæ. 193.1 rentia. 174.11
 Biliosus vomitus con- Capitis fractura. 151.17
 Capitis

INDEX.

Capitisfungi.	5.19	Cā morbi comitialis ex
Capitis grauitas.	136.9	Pelopis sentētia.166.10
Capitis vstio.	108.25	Causa stuporis. 58.29
Caput nō tentat vinum		Causæ præcedētes vasis
album modicè adstrin		ruptionē ī thorace aut
gens.	290.16	pulmōe efficiētes.245.2
Caput propria rationis		Causæ procatarctica.
sedes.	135.12	349.13
Cardiaca syncop.	257.18	Causæ flatuosæ melan-
Carni mediæ subtenfa		cholia. 158.9
membrana.	86.28	Causēruptionis vasis in
Caro.	62.1	pulmone. 245.25
Κάρου.	196.4	Cenchris. 112.17
Καρδιωγμύς.	17.23	* Cephalalgia. 174.6
Καρδιώτης.	18.1	Cephalææ definitio, &
Cartilaginesfigmoides.		eius notæ. 173.18
229.10		Cerebri affectus phreni-
Carūcula ī vesica.10.24		tidem indicantes.281.4
Carunculæ in vrina.336		Cervicis affectus angī-
24.& 353.21		næ non similis. 212.16
* Catalepsis.	132.14	Cervicis vertebra, dens
Catheter,ænea fist. 9.27		vocata. 102.18
Catoche.	132.13	* Chœras. 26.17
Caulis virilis corpus fi-		Chondrus. 31.23
stulosum & neruosum		Chordapson. 332.25
384.2		* Cibi cupiditas, & con-
Causa & dispositio.58.3		coctio vitiata ex reten
Causa morbi Antipatri.		to seminæ. 359.15
252.2		Cibi melācholici.15.13
		Cibo

INDEX.

- Ciborū dissipatio. 343.
18
Cibustrifariā corrum-
pitur. 28.15
Circumscribere. 78.6
Cittæ. 292.22
* Clausa vteri ceruix ci-
tra duritiem, pregnan-
tem indicat. 372.22
* Cogitatio. 107.10
Cogitatio libidinis pria-
pismum excitat. 387.13
Cognitio affectus ex
ppriis accidētib⁹. 39.2
Coli abscessus. 4.24
Colica Galeni. 67.25
Colicæ signa. 70.7
Colici dolores. 68.26
Colici dolores dysen-
teriā procedunt. 71.9
Colicorū sanatio. 34.10
Colicum affectū quo-
modo discernas à ne-
phritide. 325.24
Colicū affectū à nephri-
tide distinguit nausææ
magnitudo. 334.24
Colis accidens priapif-
mus. 379.9
Colis cōpositio. 379.24
Colis virilis affecti in-
dicia. 376.21
Color corporis. 40.10
Color declarat iecoris
splenisq; vitia. 305.17
Coloris vitium. 153.28
Comitialis cōuulsio ob
vitium oris stomachi.
291.3
Comitialis morbi cau-
sa ex Pelopis sentētia.
166.10
Comitialis differentia
& species. 163.25
Comitialis morbi me-
dicamen. 168.2
Comitialis morbus.
146.13
Comitialis morbus à
crasso humore. 147.4
Comitialis morbus ab
atrabile. 150.10
Comitialis morbus ex
vehementi in docen-
do labore. 290.3
Comitialis morbus, in-
ter soporē & apople-
xiam medius. 156.15
Com

INDEX.

- Cōmunes facul.** 305.16
Cōicatio linguæ cū ce-
rebro p̄ neruos. 197.23
Comparatio neruorum
ad fides lyricas & lora.
 145.25
Cōpositio colis. 379.24
Cōpositio musculorū.
 55.25. 61.27. & 88.26
Cōpressio spiritu labo-
rans athleta. 216.14
Confusio & productio
neruorū à ceruice or-
torum. 48.11
Cōcoctio vitata ex re-
tento semine. 359.15
Coniectura artificiosa.
 12.12. & 122.18
Cōsideratio excremen-
torum in dysenteria.
 327.20
Cōsideratio excremen-
torū in morbo regio.
 319.23
Consideratio sputi in
pleuritide aut pulmo-
num dolore. 243.4
Contenta in spacio. 6.7
Cōtractio, vesicæ offi-
cium. 347.5
Conuulsio. 143.4
Conuulsio comitialis,
ob vitium oris ventri-
culi. 291.3
Cōuulsiones epilepticæ
cur fiāt in morbo co-
mitiali. 168.17
Conuulsionem & sin-
gultum efficit humor
acris. 169.17
Conuulsionē non infe-
runt nerui ad os vētri-
culi pertinētes. 291.22
Conuulsionē soluit bi-
liosus vomitus. 291.10
Copula. 142.20
Cor ab antiquis voca-
tū os vētriculi. 288.26
Cor fons caloris. 254.4
Cordis dolor. 292.29
Cordis inflammatio.
 259.7
Cordis palpitatio. 258.
 II
Cordis panniculi affe-
ctus. 260.23
Cordis proprii affectus.
 27.11

Cor

INDEX.

Cordis pulsatio, pulmo-	Cruris resoluti sanatio.
nis affectum sequitur.	217.27
252.17	Crustula ephelcis. 5.23
Cordis vulnus. 259.10	* Cucurbitula. 128.18. &
Corporis color. 40.10	130.20
Corporū particulæ loci	Cuidã ex casu suppressa
vocitantur. 1.19	vrina. 350.16
Corpus caulis virilis fi-	Cupiditas serosæ humi-
stulosum neruosumq̃.	ditatis nimia in renibus
384.2	341.8
Costæ à quibus venis	Cur animalia ad coitum
nutriuntur. 273.1	excitentur. 360.22
Costas succingēs mem-	Cur febris vehemēs pleu-
brana. 271.1. & 274.8	ritidē sequatur. 263.2
* Crassi humores in ce-	Cur fiat cōuulsio. 144.19
rebro. 142.14	Cur melancholici ti-
Crassi humores vrinam	meant. 162.1
supprimentes. 10.20	Cur tangentibus obste-
Crassus humor comi-	tricibus vterus sursum
tialem morbum gene-	& in latus retrahi vi-
rat. 147.4	deatur. 368.17
Chrysippus. 116.6	Curatio. 54.24
Cruda tubera. 210.14	Curatio affectuum ca-
Cruditās. 28.26	pitis. 110.5
Cruēta dysenteria. 71.15	Curatio vniuersi corpo-
Cruenta vrina. 70.6	ris præmittenda. 125.1
Cruris motus difficultas	Curat Galenus suffusio-
ex suppuratione orta	nis accidentia per epi-
in altera nate. 218.3	stolas. 190.4
	Cuti

INDEX.

- Cuti sub tensa membra- 29
na, & in media carne. Diabetes. 338.22
86.28 Diabetes proprius renū
Cynanche. 211.25 affectus. 344.24
D Eceptus Galenus. Diadosis à ventre ad he
68.15 par. 339.21
Defensio empiricorum. Dialectica problemata.
119.15 47.8
Definitio cephalæ & Dialectica quæstio. 6.14
notæ. 173.18 Diaphragma. 279.6
Delatio à ventriculo ad Diaphragmatis vsus ex
intestina, à naturali fa- Platonis sentētia. 279.8
cultate fit. 348.3 * Differentiæ atræ bilis.
Delirium. III.3. & II.2. 149.16
27. & 280.10 Differentiæ dyspnœarū.
Delirium à septo transf. 238.14
uerso. 282.12 Differentiæ dolorū ca-
Delirium Galeni adhuc pitis. 174.11
pueri. 192.3 Differentiæ melācholi-
Dens vertebra ceruicis corum. 161.5
vocata. 202.18 Differentiæ pituitæ. 148.
Dentiformis vertebra. 27
205.7 Difficultas motus cru-
Dentium stupor. 72.8 ris ex suppuratione or-
Destillatio. 139.16 ta in altera nate. 218.3
Desiderium renū natu- Difficultas spirandi ab
rale. 340.20 affecto corde. 261.2
*Diabete ad ventricu- Difficilis spirationis cau-
lum nō pertinet. 342. sa. 232.19
b

INDEX.

Digitiaffecti.	116.27	Dissipatio ciborū.	343.
Digitiresoluti.	47.16	18	
Dilatatio thoracis in an-		Dissolutio animæ essen-	
gustiaspiritus.	115.29	tia.	257.10
Dilatatio thoracis quā-		Distētio neruorū.	82.21
do vehemētior aut pe-		Distētio neruorum ob	
riculosior.	237.10	semen retentū.	179.17
Diogenes Cynicus libi-		Diuisiones vasorū circa	
dini indulgit, vt noxā		pulmonem.	276.1
retēti seminis euitaret.		*Dodecadactylos.	340.
360.7		6	
Dissectio.	118.25	Dogmatici.	120.12
Dissectio musculorum		Dolor.	59.7
epigastrij.	296.2	Dolor ab inflammatio-	
Dissectio recurrentium		ne.	62.13
neruorum.	228.10	Dolor atrox.	95.9
Dispositio cataschesin.		Dolor angustiae plenus.	
118.20		83.26	
Dispo coeliaca.	333.11	Dolor austerus.	93.1
Dispositio & causa.	58.3	Dolor circa mēbranas.	
Dispo hectica.	118.19	84.10	
Dispositio ppria.	14.22	Dolor cordis.	292.29
Dispositio renū qd diffe-		Dolor dorsi gulæ affe-	
rat ab intestinorū & vē		ctum indicat.	287.28
triculi dispōne.	342.17	Dolor dulcis.	90.19
Dispōnes mixtae.	138.15	Dolor extensiuus.	65.27
Dispositiones varię do-		Dolorē excitantes varię	
lorē excitātes.	238.27	dispositiones.	238.27
Dipsacos.	338.23	Dolor ex laeso cerebro.	

INDEX.

- 109.20 Dolor torpidus. 95.4.
Dolor grauis. 95.12. & Dolor vteri in coxam
175.19 transiens. 373.5
Dolor hepatis. 94.22 Dolor vlcerofus. 89.22
Dolor infixus. 91.11 Dolores colici. 68.26
Dolor inhaerens. 94.17 Dolores colici dysente-
Dolor intestinorū. 19.13 riam precedunt. 71.9
Dolor lacerans. 92.12 Dolores mēbranarum.
Dolor lateralis similis ossib⁹ adiacētiū. 87.13
pleuritidi. 278.6 Dolores renum. 69.18
Dolor laxus. 88.6 Dolores sublimiorū in-
Dolor leuiter acut⁹. 90.5 testinorum. 332.12
Dolor mordax. 175.17 Dolores vteri. 93.4
Dolor nephriticus. 334. Doloris causæ. 20.7
20 Doloris modi. 66.7
Dolor non infestat eos Dolorum capitis diffe-
quibus à pulmone san rentiæ. 174.11
guiserumpit. 223.20 Dolorū differētia qua-
Dolor pertēdens. 78.19 drisariā sumitur. 69.6
Dolor profundus. 83.2 Dolorum vocatiōes. 98.3
Dolor prurigin. 90.28 Dolorū nomina. 73.2
Dolor punctorius. 72.5 Dolorū qualitates sim-
Dolor pulsatorius. 64. plices explicari nō pos-
27. & 77.6. & 78.15 sunt. 96.16
Dolor stringens. 93.3 Dorsalis medull. 279.15
Dolor stimulans. 92.1 Dorsi dolor gulæ affe-
Dolor tenuium intesti- ctum indicat. 287.28
norum. 332.6 Dracūcul⁹ à barbaris, ve-
Dolor tensius. 175.15 na medē noīatur. 337.8

INDEX.

Duo genera motu. 27.3	126. 27
* Dysenteria. 3.16.	Erosæ venæ aut ruptæ
& 21.8	accidentia. 288.8
Dysenteria cruenta. 71	Erosio in vtero. 375.4
15. & 317.8	Erosio vasis in pulmo-
Dysenteria propriè vo-	ne. 246.18
cata. 327.10	Error Archigenis. 11.15
Dysenteria hepaticæ si-	Error Asclepiadis. 16.5
gna 328.16	Erysipelas. 244. 6
Dysenteria præcedunt	Erysipelas pulmonis.
dolores colici. 71.9	244.8
Dyspnœarum differen-	Erysipelatodes phleg-
tia. 238.14	mone. 297.27
E Lephass. 153.24	* Essentia animæ disso-
Emissio sanguinis	lutio. 257.10
per tussim. 244.26	Essentia partium pro-
* Ephelcis. 225.2	prietas. 2.12
Ephelcis, crustula. 5.23	Essentiæ magnitudo. 3.13
Epigastrij musculorum	* Ethmoidea ossa. 182.
dissectio. 296.2	19
Epigastrij musculorum	Excrementa. 14. 20
abscessus. 304.27	Excrementa hepatica.
Epiglottis. 3.24	307.18
Epilepsia. 146.17	Excrementa intestinū af-
Epilepticæ cōuulsiones	fectū indicantia. 36.16
quare in comitali	Excrementa spontè de-
morbo fiant. 168.17	iecta. 53.25
Epileptici. 152.27	Excrementa thoracis
Epistolæ Archigenis.	spuēdo reiecta. 263.22
	Ex

INDEX.

- Excrementa triplicia. Experimentum in affe-
 124.6 ctu colico. 34.20
 Excrementi reiecti ma- Expiratio. 229.25
 gnitudo. 3.6 Expiratio à quibus mu-
 ab Excrementis alui in- sculis fiat. 231.14
 dicium affecti iecoris. Expirationem & exuf-
 310.23 flationem efficientes
 Excrementorum confi musculi. 231.14
 deratio in morbo re- Expuitionem & vomi-
 gio. 319.23 tionem sanguinis exci-
 Excrementorum in dy tat epota hirudo 225.6
 senteria consideratio. Expultrix facultas. 314.
 327.20 23
 Excrementum. 314.25 Exq̃sita pleuritis. 262.25
 Excretio puris per vri- Extēsiuus dolor. 65.27
 nas. 338.3 Exufflatio. 229.26
 Excretio vrinæ propria Exufflatio strepēs. 230.
 vesicæ actio. 345.29 12
 Exercitatio circa signa. Exufflatio citra strepi-
 104.14 tum. 230.25
 Exercitationis modi **F**aciei musculorum
 tres. 57.24 offensio, à dextra
 Exercitationis via ad af in aduersam partē de-
 fectorum locorum no flectitur. 200.21
 titiam. 241.3 Faciei nerui. 195.13
 Ex menstruorum reten Faciei nerui affe. 178.27
 tione oritur plenitudo Facies quādo sensū aut
 venarum & vinculo- motum amittit. 199.13
 rum vteri. 183.11 Facult. alteratrix. 314.18

INDEX.

Facultas animæ prin-	corpus caulis virilis.
ceps. 16.8. & 107.11	384.2
Facultas animalis. 45.5	* Flatus. 42.3
Facul. attractrix. 314.15	Flatuosæ melancholiæ
Facul. expultrix. 314.23	causæ. 158.9
Facultas nervorum ter-	Flatuosus & hypochon-
riæ cerebri cōiugatio-	driacus morbus. 157.13
nis. 194.14	& 252.3
Facultas propria hepa-	Fluor urinæ subitò eue-
tis. 306.13	niēs in renibus. 341.24
Facul. retentrix. 314.20	Fluxio ī pulmon. 235.22
à Facultate naturali fit	* Foliata & spicata vn-
delatio à vētriculo ad	guenta. 249.10
intestina. 348.3	Folliculi fellis imbecil-
Facultates cōes. 306.16	litas. 321.21
Facult. naturales. 314.13	Foramina vertebrarū p
Fauces. 212.6	quę nerui exeūt. 208.14
* Febres ardētes. 297.23	Fortuna. 313.28
Febres morbi melācho-	Fractu. caluariae. 108.19
licum morbū contra-	Fractura capitis. 151.17
huit. 156.23	Frequens & rarus spiri-
Febris vehemens cur se-	tus qui indicēt. 239.17
quat pleuritidē. 263.2	Fricta oua. 30.2
Fellis folliculi imbecil-	Frigidę & vitiosę aquæ
litas. 321.21	potio. 325.19
Femen. 11.24	Frigidæ potio. 131.14.
* Fibræ. 62.4	& 302.29
Fist. enea, catheter. 9.27	Frigus vehemēs lethar-
* Fistulosum nervosūq;	gum excitat. 170.6
	Fru

INDEX.

- Frusta pulmonis per spu Gibbus quādo accidit.
 tum eiecta. 248.21 206.21
 Frustulum tunicae ex- * Glans pudendi. 380.2
 cretum. 38.3 Gloria Galeni. 122.20
 * Fuligo. 152.2 * Gonorrhæa. 377.9
 Fumolus ructus. 29.27 Gonorrhæa unde dicta.
 Fumus. 152.2 377.23
 Fungi capitis. 5.19 * Grammaticus quidā in-
 Aleni adhuc pueri uenis, ex vehemēti ī do
 delirium. 192.3 cēdo labore comitiali
 Galeni colica. 67.25 morbo corrept⁹ 290.3
 Galeni deliberatio de Grando ex pulmone.
 empiricis & dogmati 249.17
 cis. 120.6 Grauedo. 139.17
 Galeni gloria. 122.20 Grauis dolor. 95.12. &
 Galeni iactātia. 120.28 175.19
 Galenus curat suffusio- Gravitas capitis. 136.9
 nē per epistolas. 190.4 Grumi in vesica & aliis
 Galenus deceptus. 68.15 īternis ptib⁹ notā. 251.7
 Gal. prędicat medicū nō Grumus. 10.2
 affligi pleuritide. 311.16 * Gula. 283.28
 Galenus prænunciat fu- Gula abscessus. 287.8
 turam in seipso phre- Gula affectum indicat
 nitidem. 192.15 dorsi dolor. 287.28
 Gangrana. 77.21 Gula ībecillitas. 286.18
 * Genera intēperantiæ. Gula īflāmatio. 285.6
 126.3 Gula tumor cū imbe-
 * Gibbarū iecoris partiū cillitate. 286.23
 inflammatio. 295.21 Gula tumor eū inflam-

INDEX.

- matione. 286.26 100.21. & 300.19
 Gulæ vlcus. 288.19 Hepatis propria facul-
 Gulæ vlceratae indicia. 306.13
 287.18 Hepatis scirrhus. 100.22
 Gustus. 194.12 & 299.12
 Gustus proprietas inef- Hiera. 33.26. & 149.16
 fabilis. 96.24 Hydrops ex indurato
 Gutta aquæ, lapidem liene. 324.15
 excavans. 23.4 Hypofarca 302.5
Hæmodia. 72.7 Hippocrates in libro de
 Hæmorrhoides. 270
 71.23 Hirudine correptus iu-
 Haud secº nocet suppres- uenis ad narium mea-
 sum sperma, ac venena tum. 226.21
 ti animalis ictº. 361.18 Hirudo epota, vel nari-
 Hæctica dispositi. 118.19 bus adhærēs, expuitio-
 Hedychroum medica- nē & vomitionē fan-
 mentum. 249.4 guinis excitat. 225.6
 Hemisrania. 175.2 Historia adolescentis
 Hemisranciae sphacelo- Mytilenæi. 4.6
 des. 75.27 Historia de vino. 111.25
 Hepatica excrementa. * Hædi naturalis indu-
 307.18 stria. 380.19
 Hepaticæ dysentericæ si- Holcimos. 93.12
 gna. 328.16 * Humiditas & frigi-
 Hepatis dolor. 94.22 ditas præter naturam.
 Hepatis inflammatio. 85. 136.29
 24. & 195.24 Humor acris singultu
 Hepatis obstructio, & conuulsionem effi-
 cit.

INDEX.

- cit. 169.17
Humor crassus morbi comitialis causa. 147.4
Humor in ambiēte cor tunica cōtentus. 258.13
Humor vitr. 68.2. 149.6
Humores crassi in cerebro. 152.14
Humores crassi vrinam supprimentes. 10.20
Humoris ad caput in epilepsia ascēsus. 164.15
Humorū retent. 378.10
Humorū secretio. 378.5
*Hydropicorum affectus. 302.13
Hydrops matellę. 338.21
Hypocondriacę affectiones. 151.13
Hypochondriacus morbus. 292.3
Hypochondriacus flatuosusq; morbus. 157.13
ἵποχονδριασμός. 324.12
Hysterica accidentia. 364.15
Hysterica accidentia ad vterū pertinēt. 364.15
Hystericę mulie. 355.28
Actātia Gale. 120.28
Ictus phalāgii. 166.23
Iecino. affecti iudiciū ab excremētis alui. 310.23
Iecinoris calida intemperies. 308.28
Ex iecore affecto morbus regius. 324.24
Iecori quid conferāt venę mēseraicę. 315.17
Ieco. affecti notę. 297.8
Iecoris ibecillitas. 306.6
Iecoris intemperantię. 307.2
Iecoris obstructionum signa. 295.15
Iecoris positio exterior. 297.3
Iecoris fimarum partiū inflammatio. 298.7
Iecoris splenisq; vitia color declarat. 305.17
*Ignavia. 388.15
Ileos. 332.24
Illeſo motu sensus amissus. 49.8
*Imagines oculorum. 17.13
Imagines varię melan-

b s

INDEX.

cholicoꝝ.	161.1	costalium.	262.12
Imbecillitas folliculi fel-		Inflāmatio mesenterij.	
dis.	321.21		316.3
Imbecilli. gulæ.	286.18	Inflāmatio partiū con-	
Imbecilli. iecoris.	306.6	tinentiū hepar.	106.17
Imbecillitas renū.	338.12	Inflāmatio pulmonis	
Imbecillitas spinæ.	215.1		244.4
Immodicè vacuatorum		Inflāmationis acciden-	
menstruorum acciden-		tia.	81.1
tia.	374.12	Inflāmatorius affectus.	
Impedita spiratio.	171.7		63.14
Imperatoris seru ⁹ qdā à		Inflammatuſ musculus.	
vipera morſus.	303.24		62.21
* Incocta pleur.	278.4	Ingens ſitis citra diabe-	
Indicia vlceraſ gulæ.		tem.	344.10
	287.18	Inhærens dolor.	94.17
Induſtria hædi natura-		Initiū neruorū.	170.28
lis.	380.19	Inſtrumentales morbi	
Ineffabile.	74.2	oris ventriculi.	293.8
Infixus dolor.	91.11	Inſtrumenta naturalia	
Inflāmatio gibbarū ie-		& animalia.	56.7
coris ſigna.	295.21	Inſtrumēta vocis.	42.5
Inflāmatio gulæ.	285.6	& 227.10. & 116.25	
Inflāmat. cordis.	259.7	Inſtrumentalium & ſi-	
Inflāmatio hepatis.	85.	milarium partium affe-	
	24. & 105.24	ctus.	198.10
Inflāmatio iecoris par-		Inſtrumentorum ſemi-	
tium ſimarum.	298.7	nis affectio gonor-	
Inflammationes inter-		rhæa.	379.7
		Inſtru	

INDEX.

- Instrumentorum voca- Intestinorū ordo. 331.15
lium officium quādo Intestinorum sublimio
lādatur. 117.17 rum dolores. 332.12
In stultitia somnus ob- Intestinorū tenuiorum
seruandus. 139.5 dolor. ibid. 6
Intemperantiæ genera. Intestinorum vulnus.
126.3 4.19
Intemperantiæ iecoris. Intestinū affectū excre-
307.2 mēta indicātia. 36.16
Intemperies æqualis & Intestinū vitiatū expur-
inæqualis pulmonis. gātē medicamēto. 35.5
244.13 Inuita stercoris & vri-
Intemperies calida ieco- næ emissio, à resolutis
ris. 308.28 neruis. 348.22
Intensus vterus quomo- * Irrationalis obliuio.
do crebra efficiat re- 281. 10
spirationem. 366.6 * Ischuria. 345.10
Intercoſtales musculi lē * Itria. 29.29
ſi, vocem vitiant. 43.1 * Iuuenis, hirudine ad
Intercoſtales musculi ſpi- narium meatum cor-
rationē adiuuāt. 205.25 reptus. 226.21
Intercoſtalium inflam- L Acerans dolor. 92.
mationes. 262.12 12
Interrogādus ægrotus Lactuca. 136.7
de ſuo affectu. 286.1 Leſa actio. 28.17. & 37.
Intestina non trahunt 14. & 104.26. 121.29
ſuccum à ventriculo. Laſa memoria. 124.21
340.2 & 135.15
Intestinorū dolor. 12.13 Leſi intercoſtales musculi

INDEX.

- vocem viciant. 43.1
 Lēſio actiōis. 121.29. & 124.14
 Lamæ. 353.20
 Lapis ex ano per tines-
 mum eiectus. 329.11
 Lapis in veſica vrinam
 ſupprimi. 350.29
 Latētia animalia. 112.7
 & 136.4
 Latēralis dolor ſimilis
 pleuritidi. 278.6
 Latēralis morbi, notæ.
 102.19
 Latus muſculus. 209.14
 Laxus dolor. 86.6
 *Lethargus. 135.24. &
 140.12
 Lethargus à vehementi
 frigore. 170.6
 *Libera ſpiratio. 215.15
 Libidinis, cogitatio pria
 piſmum excitat. 387.13
 Lien induratus, hydropē
 gignit. 324.15
 Lienis affectus quibus
 notis diſcernātur. 323.13
 Lienis officium. 323.24
 Lienteria. 333.10
 Ligulæ vlcus. 247.6
 Līguæ cōmunicatio cū
 cerebro p̄ neruos. 197.23
 Linguae motio. 382.23
 Linguae motus à quibus
 neruis. 194.26
 *Locī corporum parti-
 culæ. 1.19
 Locorū affectorum ge-
 nerales notæ. 104.1
 Locorū affectorū quin-
 tplex deprehēſio. 37.
 6. & 123.23
 Locus. 39.16. & 57.28
 Locus, quinque modis
 deprehenditur. 37.6
 Logicæ quæſtiōes. 116.3
 Λογικὰ διαγνώσις. 183.21
 Loquela. 227.6
 Loquendi vſus. 231.19
 Lordoſis vertebrarū lu-
 xatio ad īterna. 206.10
 Luxatæ exterius verte-
 bræ, ſtranguriā quidā
 induxerunt. 349.23
 Luxatio ſpinæ angulo-
 ſa. 208.3
 Luxatio ſpinæ in obli-
 quum. ibid. 10

Lu

INDEX.

- Luxatio vertebrarū ad Medicamētum ex aloē.
 interna. 206.10 290.24
- Luxationis vertebrarū Medicamentum hedy-
 causā. 210.6 chroum. 249.4
- M** Agnæ respiratio Medicatio pulmonis à
 nis differentia. putrefaciente humore
 236.20 affecti. 249.1
- Magnetis vis. 362.21 Medulla spinalis. 201.20
- Magnitudo essentia. & 279.15
- 3.13 Medullæ spinalis neruis.
- Mānæ turgidæ. 388.17 177.20
- Maior noxa ex retento Medullæ spinalis sectio,
 semine, quā mēstruis quā noxā adfert. 178.2
- 359.24 Mel. 31.25
- Mania. 140.14 Melancholia. 140.14 &
- Marina torpedo vene. 150.15
- noxa. 362.13 Melancholia à ventricu
- Marina turtur veneno- lo orta. 157.12
- sa. 165.26 Melancholiæ accidētia.
- Matellæ hydrops. 338.21 162.27
- * Meatus vrinæ, trifariā Melancholiā quomodo
 stipatur. 8.22 curauerit Galen⁹. 163.7
- Meat⁹ vrinarius à crasso Melancholica mœstitia.
 pure obstructus. 350.29 324.8
- Media vena secanda in Melancholica mœstitia
 melancholicis. 157.1 ab affecto liene. 326.3
- Medica nomina. 26.25 Melancoliæ flatuosæ cau
- Medicamen cōtra mor- sæ. 158.10
- bum comitialē. 168.2 Melancholici. 152.27
- Me

INDEX

- Melancholici cibi. 155.13
 Melancholici cur ti-
 meant. 162.1
 Melancholici sanguinis
 notæ. 154.22
 Melancholicorum dif-
 ferentiæ. 161.5
 Melancholicorum va-
 riæ imagines. 161.1
 Melancholicus morbus
 per febriles morbos cõ-
 tractus. 156.23
 Mébrana costas succin-
 gens. 271.1. & 274.8
 Membrana cuti substra-
 ta, & in media carne.
 86.28
 Membranarum dolor.
 84.10
 Membranarum ossibus
 adiacentium dolores.
 87.13
 Memoria amissa. 139.25
 Memoria læsa. 124.21.
 & 135.15
 Meningophila. 197.8
 Menstrua. 71.23
 Menstrua prægnantiũ.
 375.10
 Menstrua retēta panum
 generant. 373.13
 Menstruorum immo-
 dicè vacuatorũ acci-
 dentia. 374.12
 Menstruorum retētio,
 plenitudinē venarum
 & vinculorum vteri
 excitat. 371.9
 Menstruorum suppres-
 sionum notæ. 372.16
 Mentem quare phrenas
 appellauerint antiqui.
 282.18
 Meseraici. 315.10
 Mesenterij inflamma-
 tio. 316.3
 Meseraicæ venæ quid
 cõferant iecori. 315.17
 Methodus Gal. in mor-
 borũ curatione. 122.15
 Methodus vniuersalis
 inueniēdi locũ. 101.17
 * Missio sanguinis in
 melancholia. 154.15
 Mitylenæi adolescentis
 historia. 4.6
 Mixtæ dispositiones.
 138.15

Mœ

INDEX.

- * Mœstitia melâcholica Morb^o comitialis. 146.13
 ab affecto liene. 326.3 Morbus comitialis ab
 Mœstitia melâcholica. atrabile. 150.10
 324.8 Morbus comitialis à
 Modi doloris. 66.7 crasso humore. 147.4
 Modi exercitatioistres. Morbus comitialis cur
 57.25 epilepticas habeat con-
 * Morales actiones. 137. uulsiones. 168.17
 18 Morbus comitialis, in-
 Morbi Antipatri causa. ter soporem & apople-
 252.2 xiam medius. 196.15
 Morbi comitialis cā ex Morbus factus. 22.19
 Pelopis sentētia. 166.10 Morbus fiens. ibidem
 Morbi comitialis diffe. Morbus flatuosus & hy-
 rentiæ & species. 163.25 pochondriacus. 292.3
 Morbi comitialis medi. Morbus hypochōdria-
 camen. 168.2 cus & flatuosus. 157.13
 Morbi regij causę & in- Morb^o lateralis aut pleu-
 dicia. 343.12 ritis vnde fiat. 277.24
 Morbi lateralis notæ. Morbus melancholicus
 102.19 per febriles morbos cō-
 Morbi oris vētriculi in- tractus. 156.23
 strumentales. 292.3 Morbus regius. 153.24
 Morbos exiguos vincit Morbus regius à splene
 natura. 24.4 304.22
 Morbus. 27.6 Morbus regius citra fe-
 Morbus Antipatri Me- brē quō curatur. 221.8
 dici quo extinctus est. Morb^o regius ex affecto
 250.12 liene & iecore. 324.24
 Mor

INDEX.

- Morb⁹regius post febrē acutā succedēs. 320.15
Mordax dolor. 175.17
Morsus viperæ. 303.24
Motio linguæ. 382.23
Motionis principiū neruis à volūtate quæ est in cerebro. 145.7
Motores nerui oculorum. 185.7
Motus difficultas orta in crure, ex suppuratione orta in altera nate. 218.3
Motus genera duo. 27.3
Motus & sensus deperditi. 220.23
Motus linguæ à quibus neruis fiat. 194.26
Motus volūtarius. 49.29
Motum voluntariū nō habet vesica. 346.25
* Muliebre profluuium. 374.21
Mulieres hysteric. 355.28
Mulieres viduæ vteri suffocationibus laborantes. 358.11
Multarum pulsationum cumulus systematicæ. 251.11
Multi puris in pulmone b⁹ collecti notæ. 242.27
Multitudo & magnitudo nausæ, collicum affectum à nephritide distinguit. 334.24
Munus musculorū oculorum mouentium. 186.1
Musculiani actio. 347.13
Musculi circa spinā affecti. 54.9
Musculi expirationē & exufflationem efficiētem. 231.14
Musculi intercostales læ si vocem vitiant. 43.1
Musculi intercostales spirationē adiuuāt. 205.25
Musculi oculorum sex. 185.13
Musculi supernā palpebram mouentes. 187.2
in Musculis epigastrii abscessus. 304.27
Musculorum cōpositio. 55.25. & 61.27. 88.26
Musculorum epigastrii dis-

INDEX.

- dissectio. 296.2 magnitudo, colicum
 Musculorum faciei of- affectum à nephritide
 fensio, à dextra in ad- distinguit. 334.24
 uersam partē deflecti- *Nephriticorum signa,
 tur. 200.21 quantum à colicis dif-
 Musculorū munus ocu- ferunt. 330.15
 los mouentium. 186.1 Nephriticus dolor. 334.
 Musculorū thoracis a- 20
 ctio, per somnum ser- à Nephritide quomodo
 uatur. 256.6 discernas affectum co-
 Musculus inflammatus. licum. 329.24
 62.21 Nephritidis notæ. 70.3
 Musculus latus. 209.14 Nerui ad cutem manus
 Arium primæ cō- peruenientes. 181.23
 tractæ in dyf- Nerui ad faciem. 195.13
 pnoea. 234.19 Nerui ad os ventriculi
 Natura vincit morbos pertinentes conuulsio-
 exiguos. 24.4 nem inferunt. 291.22
 Naturale renum deside- Nerui à spina in faciem.
 rium. 341.20 201.12
 Naturales facultatis. Neruis ex primis spinæ
 314.13 vertebri ad caput. 220.1
 Naturalia instrumenta. Nerui faciei affecti. 178.
 56.7 27
 à Naturali facultate fit Nerui habent principiū
 delatio à vētriculo ad motionis à voluntate
 intestina. 348.3 in cerebro sita. 145.7
 Nausea. 33.15. & 292. 28 Nerui linguæ motores.
 Nauseæ multitudo & 194.26

INDEX.

- Nervi oculorum mo- spatio sunt productio
tores. 185.7 vsq; ad manus. 217.20
- Nervi recurrētes. 44.24 Nervorum recurrētium
dissectio. 228.10
- Nervi septi transuersi. 205.17 Nervorum resolutio.
- Nervi spinalis medullæ. 177.10. & 180.26
- 177.20 Nervorū rigor. 146.17
- Nervi vocales. 44.19. & Nervorum spinæ affe-
228.1 ctorum motitia. 51.25
- à Nervi resolutis, inuita Nervorum tertiæ cere-
vrinæ emissio. 348.22 bri conjugationis fa-
cultas. 194.14
- Nervorum à ceruice or Nervus. 142.18
- torū productio & con- Nervus opticus offen-
fusio. 48.11 sus. 186.21
- Nervorum ad tempora, Nervus tertiæ coniuga-
nares, & labra pertinen- tiōis mollis dict°. 198.2
- tium dissectio. 200.4 Nervus visificus. 184.24
- Nervorum comparatio * Nicander. 112.17
- ad fides lyricas & lora. Nidorosus ruct°. 30.24
- 145.25 Nimia refrigeratio. 50.5
- Nervorū distētio. 82.21 * Nomina dolorū. 73.2
- Nervorum distentione Nomina medica. 26.25
- laborans quædam vi. Notæ accidētium suffu-
dua, ob retentū semen. sionis ab ore ventricu-
361.3 li procedētium. 188.13
- Nervorū initiū. 170.28 Notæ affectus scotoma-
Nervorū origo. 142.14 tici. 171.15
- Nervorū qui in primo Notæ anginam indican-
& secūdo intercostali tes,

INDEX.

- res, nullo tamē existē- 323.13
 re in gutture proprio Notæ suppressorū men-
 affectus. 202.26 struorum. 372.16
 Notæ bronchiorū pul- Notæ veneni epoti. 363.
 monis affectorū. 242. 10
 18 Notæ vlcis perseverā-
 Notæ calculi. 9.10 tis in renibus. 336.9
 Notæ colis virilis affe- Notæ vocis obscuræ &
 cti. 376.21 parvæ. 227.22
 Notæ cephalæ, & eius Notæ vomicarum crū-
 definitio. 173.18 pentium. 352.12
 Notæ delirij phreniti- Noxa maior ex retento
 dis. 280.23 semine, quā men-
 Notæ generales locorū struis. 359.24
 affectorum. 104.1 * Nullus ramus venæ ā
 Notæ grumi in vesica cōcaua in pulmōem.
 & aliis partibus. 351.7 272.9
 Notæ ieco. affecti. 297.8 **O** Bliqua spinæ tor-
 Notæ lateralis morbi. ffo. 207.8
 102.19 Oblivio irrationalis.
 Notæ melancholici fan 281.10
 guinis. 144.22 Obscuræ & parvæ vo-
 Notæ nephritidis. 70.3 cis causæ. 227.22
 Notæ peripneumoniæ. Obstructio hepatis.
 102.1 100.21. & 300.19
 Notæ puris in pulmōe Obstructionum iecoris-
 collecti. 242.27 signa. 295.14
 Notæ quibus discer. Obstructus meatus vri-
 nantur lienis affectus. narius ā crasso pure.

INDEX.

- 350.29
 Oculorū imagīes. 17.13
 Oculorum motores ner-
 ui. 185.7
 Oculorum muscoli sex.
 185.17
 * Oesophagus. 283.25
 Oesophagi affectus.
 284.12
 Oesopha. tunice. 284.8
 Oesophagi vsus duplex
 284.2
 * Officium lienis. 323.24
 Officium vesicæ cōtra-
 ctio. 347.5
 Officium vocalium in-
 strumentorum quan-
 do læditur. 117.17
 * Olfaciendi vis lasa.
 182.14
 * Opinio. 107.10
 Opticus nervus offen-
 sus. 186.21.
 * Ora venarum ad vte-
 rum. 367.13
 Ora venarum quando
 aperiuntur. 246.11
 Ordo ītestinorū. 331.15
 Ordo vasorum. 83.8
 Origo neruorū. 142.14
 Origo vertiginosi affe-
 ctus. 172.22
 Oris vētriculi sensus ex-
 quisitus. 176.2
 orthopnœa. 102.3.211.2
 * Os. ethmoidea. 182.19
 Osibus adiacentiū mē-
 branarū dolores. 87.13
 Ostocopi. 87.18
 Os ventriculi. 100.15. &
 288.25
 Os vētriculi cor ab anti-
 quis nominatū. 288.26
 Os ventriculi, Galeni tē-
 pestas vocabat stoma-
 chum. 288.28
 Os ventriculi stoma-
 chus. 100.15. & 169.5
 Os vteri non nem mensi-
 bus, ita clauditur, vt ne
 specilli acumen admit-
 tat. 383.26
 * Oua fricta. 30.2
P Alpebram superio-
 rem mouentes mu-
 sculi. 187.2
 Palpitatio colis. 386.3
 Palpitatio cordis. 258.11
 in

INDEX.

- in Palpitatione cordis fecta. 195.21
 detractio sanguinis v- Partes principes corpo-
 tilis. 259.24 ris. 254.6
 Pāniculi cordis affectus. Partes ventriculi. 326.19
 260.23 Particulæ corporum lo
 Panis. 31.22 ci dicti. 1.19
 Panus. 133.12 Partiū continentīū he-
 Panus ob retenta men- par inflāmatio. 106.17
 strua. 373.13 Partium essentiaē pro-
 Paradoxon. 48.26 prietas. 2.12
 Paralyfis. 54. 21. 63.27. Pausanię curatio. 181.10
 177.4.180.27. & 195.3 *Pelops pceptor. 165.10
 Paralyfis apoplexiæ suc Penis rigidus cuidā ob
 cedit. 196.8 Veneris desuetudinem.
 Paralytici ab angina. 387.20
 204.12 Per cōsensū affici. 41.10.
 Parasynanche. 211.25 Pericardij affect. 260.23
 Paraphrosyne. III.7. & Perineos. 11.25
 150.20 Peripneumonia. 64.2.
 Pars affecta dignoscen- & 263.11
 da priusquā adhibeā Peripneumoniæ notæ.
 tur remedia. 219.8 102.1
 Pars affecta quando di- Peritonei vulnus. 5.9
 catur. 20.17. & 118.4 Pertendens dolor. 78.19
 Pars altera spinæ affe- Peruersiōes vteri. 371.9
 cta. 51.3 Pessima spiratio. 179.14
 Pars animæ quomodo *Phalangij parui ictus.
 lædatur. 108.5 166.23
 Pars anterior cerebri af- Phalangium. 165.20

I. N. D. E. X.

Philonis antidotū. 70.1	Pituita. 148.20
Phoenices amatores à ci bo abstinent. 368.1	Pituitę differētię. 148.27
Phlebotomia. 128.10	*Placitorum variorum philosophorum enu- meratio. 134.1
Phlegmone erysipelato des. 297.27	Platonis sentētia de vte- ro. 365.12
Phrenę terminus quo pars thoracis inferior finitur. 275.1	Plenitudo venarum & vinculorum vteri ex menstruorum retentio ne oritur. 371.9
Plrenas quare mentem appellauerint antiqui. 282.18	Pleuritici. 85.4
Phreniticus vitrea vasa & lanifici puerum ex fenestra deiicit. 191.18	Pleuritis. 64.5. & 105.13 & 119.7
Phrenitica indicia, per cerebri affectū. 281.4	Pleuritis exq̄sita. 262.25
Phrenitidē in seipso prę- nūtiat Galenus. 192.15	Pleuritis incocta. 278.4
Phrenitis. 140.12. 150.20	Pleuritis vnde fiat. 277. 24
Phrenitidis delirij notę. 280.23	in Pleuritide aut pulmo num dolore, sputi con- sideratio. 243.4
Phrenitidis spēs. 191.10	Pleuritidē cur sequatur febris vehemens. 263.2
*Picę. 292.23	Pleuritidis accidentia. 277.27
Pilis similia quędam in vrinis. 336.27	* Positio iecoris exte- rior. 297.3
Piscator circa sedem & vesicam infrigidatus. 218.23	Positus. 37.23
	Potio aquę vitiosę fri- gidę

I N D E X.

- gida. 325.19 Primitiu^o affect^o. 109.30
 Potio frigida. 131.14. & Primogenius affectus.
 302.29 140.19
 Potio vini moderata. Princeps animæ facul-
 136.24 tas. 16.8. & 107.12
 * Præcedentes causæ va Prirripes partes corpo-
 scriptionem in thora ris. 254.6
 ce aut pulmone effici- Pricipales action. 137.17
 tes. 245.2 Problemata dialectica.
 Prædicat Galenus corā 47.8
 Glaucōe medicū quē. Procatactica causa.
 dam nō pleuritide (vt 349.13
 putabat) sed iecoris af- Productio & confusio
 fectu laborare. 311.16 neruorum à ceruice or-
 Prægnantē indicat clau torum. 48.12
 sa vteri ceruix citra du Profluuium muliebre.
 ritium. 372.22 374.21
 Prægnantiū menstrua. Profluuiū vrinæ. 338.22
 375.10 Profundus dolor. 83.2
 Prænuntiat futuram in Propria accidētia. 39.27
 seipso phrenitidem Ga Propria actio. 107.24
 lenus. 193.15 Propria disposit. 14.22
 Priapismi affectus vnde. Propria hepatis facultas.
 385.16 306.13
 Priapismus. 377.12 Propria vesicæ actio, v.
 Priapismus colis accidēs. rinæ excretio. 345.25
 379.9 Proprietas gustus ineffa-
 Priapismū excitat libidi bilis. 96.24
 nis cogitatio. 387.13 Proprij cordis affectus.

INDEX.

- 257.11 fectorum notæ. 242.18
 Proprius affectus. 25.28 Pulmōis et thoracis vo-
 & 40.23. & 113.6 mica expurgatę p vri-
 Pruriginosus dolor. 90 nas & aluum. 354.8
 28 Pulmonis erysipelas.
 Prurigo. 90.14 244.8
 *Pudenda rugosa canto Pulmonis frustra per spu-
 ribus. 388.1 tum eiecta. 248.21
 Pudendi glans. 380.2 Pulmonis inflammatio.
 Pudēdis innatę arteriæ. 244.4
 384.29 Pulmonis intemperies.
 Pulmo nullum venę ra æqualis & inæqualis.
 mum accipit à conca- 244.13
 ua. 272.9 Pulmonis medicatio à
 in Pulmone, vasis ero- putrefaciente humore
 fio. 246.18 affecti. 249.1
 in Pulmonem fluxio. Pulmonis particule cum
 235.22 sanguine excreantur.
 P.in pulmonibus colle- 223.10
 & i puris notæ. 242.27 Pulmonis tuberculi fi-
 Pulmonis affectus. 241. gna. 241.26
 13 Pulmonis tuberculum.
 Pulmonis affectum se- 231.28
 quitur cordis pulsatio. Pulmonis vasa. 271.10
 257.17 Pulmonis vlcus. 2.19. &
 Pulmonis à putrefacien 224.18
 te humore affecti fi- Pulsare torpidè. 89.20
 gna. 247.24 Pulsatio cordis pulmo-
 Pulmonis brōchiorū af nis affectum sequitur.
 257.

I N D E X.

- 257.17
Pulsatorium multarum
 cumulus. 251.11
Pulsatorius dolor. 64.
 27.& 72.6.& 78.15
Pulsus. 62.7
Punctorius dolor. 72.5.
 & 91.9
Pupillæ consideratio suf-
 fusionis veræ indicia
 præbet. 189.10
Puris excretio per vri-
 nas. 338.3
Puris multi in pulmoni-
bus collecti notæ. 242.
 27
Puris vacuatio in pleuri-
ticis & suppuratis ad-
uersus Erasistratum.
 270.11
Pus ex partibus septo su-
perioribus in ventrem
 defluens. 355.6
Pus in vesica. 10.9
***Pylorus.** 159.24
Q Væ difficultas spi-
 randi oriatur ab
 affecto corde. 261.2
Questio dialectica. 6.14
Questiões logicæ. 116.3
***Qualitates dolorum**
 simplices explicari nō
 possunt. 96.16
Qualitas sputi. 103.6
Quā facies sensum aut
 motum amittit. 199.13
Quare ī comitiali mor-
bo fiant epileptica cō-
 uulsiones. 168.17
Quare vrinæ fluor subi-
 tō eueniat in renibus.
 341.24
Quatuor modis affect⁹
 prehenditur. 37.12
***Quid bronchia vocen-**
 tur. 242.20
Quinque modis locus
 prehenditur. 37.6
***Quō melancholiā cu-**
 rauerit Galenus. 163.7
Quomodo naturaliter
 vrina reddatur. 7.23
Quomodo renes tā ce-
 leriter vrinam ad se at-
 trahant. 340.18
R Abiē excitat spu-
 tum rabiosi ca-
 nis. 364.2

I N D E X.

Radiculæ.	30.3	trahant.	340.18
Ramentum excretum.	225.5. & 353.18	à Renibus nō trahit ve-	340.1
Recurrētes nervi.	44.24	sica.	340.1
Recurrentium neruorū		in renibus vrinæ fluor	
dissectio.	228.10	quare citò eueniat.	
Refrigerationimia	60.5	341.24	
Regij morbi causæ &		Renū abscessus indicia.	
indicia.	303.12	335.22	
Regij morbi citra febrē		Renum desiderium na-	
curatio.	321.8	turale.	341.20
in Regio morbo excre		Renū dispositio qd dif-	
mentorum considera-		ferat ab intestinorū &	
tio.	319.23	vētriculi dispo.	342.17
Regius morbus.	153.24	Renum dolores.	69.18
Regius morbus à sple-		Renū ībecillitas.	338.12
ne.	304.22	Renū proprius affectus	
Regi ⁹ morb ⁹ ex affecto		diabetes.	344.24
liene & iecore.	324.24	Repletio.	146.2
Regius morbus post fe-		Res adhærentes.	5.17
brem acutam.	320.15	Res contentæ.	4.4
Reiecti excrementi ma-		Resoluti digiti.	47.16
gnitudo.	3.6	Resoluti cruris sanatio.	
Remedia topica.	124.28	217.27	
Remedium præsentaneū		Resolutio neruorum.	
ex vinculis, aduersus ve-		177.10. & 180.26	
nera.	167.7	Resoluti. palyfis.	63.27
Renes quomodo tā ce-		Resolutio. variæ.	179.22
leriter vrinam ad se at-		Respiratio.	357.28
		Respiratio crebra ex in-	
		ten	

INDEX

- penso vtero. 366.8 luti. 217.27
 Respiratio fit per thora- Sanguinis detractio in
 cem. 240.15 palpitatione cordis v-
 Respiratio suppurato- tilis. 259.24
 rum. 235.14 Sanguinis emissio per
 Respirationis actio ad tussim. 244.26
 thoracē p̄tinet. 276.19 Sanguinis missio in me-
 Respiratiōis magnæ dif- lancholia. 154.15
 ferentiæ. 236.20 Sanguinis melancholici
 Respirationis vsus. 357.21 notæ. 154.22
 Retētio humorū. 378.5 Sanguinis transsumptio
 Retentio vrinæ, vnde ex magna arteria in
 fiat. 346.12 pulmonem. 269.6
 Retentrix facult. 314.20 Sanguinis vomitio ex
 *Rigidus penis cuidam hirudine epota. 225.6
 ob veneris desuetudi- Sanguis à capite ad fau-
 nem. 387.20 ces irrumpens. 222.10
 Rigor neruorū. 146.17 Sanguis à toto corpore.
 *Ruptæ aut erosæ ve- 71.21
 næ accidentia. 288.8 Sanguis à ventriculo re-
 Rptionis vasis in tho- iectus. 294.18
 race causæ. 245.3 Sanguis erumpens à pul-
 Rptionis vasis in pul- mone, dolore non infe-
 mone causæ. 245.25 stat. 223.20
 Ruptum sanantia. 33.20 Sanguis p̄ tussim eiectus,
 Rupt⁹ nidorosus. 30.24 vena erosa. 222.28
 Ructus fumosus. 29.27 Sapor astringens. 95.24
 Aliua. 149.8 Sapor austerus. 95.23
 S Sanatio cruris reso- *Scirr⁹ hepatis. 100.22.
 &

INDEX.

& 299.12	Sensus amissus motu in
*Scorpio. 166.5	columi. 221.15
Scotomatici affectus no	Sensus & motus deper-
ta. 171.15	diti. 220.23
*Secretio hūorū. 378.5	Sensus oris vētriculi ex-
Sectio arteriarum ver-	quisitus. 175.2
iginosis indicta apud	Sentētia Platonis de vte
antiquos. 172.7	ro. 365.12
Sectiones in spinali me-	Septi transuersi nerui.
dulla quam noxā adfe	205.17
rant. 178.2	à Septo transuerso deli-
Secundus athleta, com-	rium. 272.12
presso spiritu laborās.	Septum transuersum.
216.14	279.26
Sedes animæ. 147.28	Serosæ humiditatis cupi-
Sedes animæ præcipua.	ditas nimia in renibus.
134.18	341.8
Seleucides auiculæ. 340.	Seruus quidam à vipera
29	morſus. 303.24
A Semine retento, quæ	*Sigmoides cartilagi-
accidentia etiam viris	nes. 229.10
euenire soleant. 358.27	Signa colicæ. 70.7
Seminis retenti noxa.	Signa nephriticorū quā
359.26	tum à colicis differant.
Seminis īstrumētorū af	330.15
fectio, gonorrhœa. 379.6	Signa obstructionū ic-
Sensoria. 194.21	coris. 295.14
Sensus amissus, illæso	Signa pulmonis à putre
motu. 40.8	faciente humore affe-

I N D E X.

- | | | | |
|---------------------------|--------|--------------------------|---------|
| Ati. | 247.24 | Sopor stupidus. | III.17 |
| Signa vomicae erumpē- | | Sopor vigilans. | 138.7.& |
| ris. | 352.13 | | 196.28 |
| Simarum iecoris partiū | | Sorites. | 21.18 |
| inflammatio. | 298.8 | *Species vteri suffoca- | |
| Similarium & instrumē | | tionum plures. | 356.13 |
| talium partium affe- | | Sperma suppressum quā | |
| ctiones. | 198.10 | tūm noceat. | 361.18 |
| Singultum & cōuulsio- | | Sphacelos ī costa. | 264.3 |
| nem efficit acris hu- | | Sphacelos. | 77.17 |
| mor. | 169.17 | Sphacelodes hemicra- | |
| Singultus. | 292.29 | niæ. | 75.27 |
| Singultus ex affecto sto | | Spicata & foliata vngue | |
| macho. | 168.27 | ta. | 249.10 |
| Sinus. | 91.13 | Spina ex casu cuidam si- | |
| Sitis ingens citra diabe- | | nuata, vesicæ inflam- | |
| tem. | 344.10 | mationis causa fuit. | |
| Siti vehementi laboran | | | 349.17 |
| tes quatuor acciden- | | Spina proprio affectu la | |
| tium pericula subeunt. | | borans. | 207.15 |
| 343. | 5 | Spinæ luxatio angulo- | |
| *Somnus obseruandus | | sa. | 208.3 |
| in stultitia. | 139.5 | Spinæ luxatio in obli- | |
| Sopor. 135.24. & 136.15. | | quum. | ibid.10 |
| & 196.4 | | Spinæ imbecillitas. | 215.1 |
| Sopor à catalepsi quid | | Spinæ nerui in faciem. | |
| differt. | 197.1 | | 201.12 |
| Sopor in febrium acces- | | Spinæ neruorū affecto- | |
| sionibus. | 113.23 | rum notitia. | 51.25 |
| | | Spinæ | |

INDEX.

- Spinæ pars altera affe-
 ctæ. 51.3
 Spin. refrigeratio. 54.17
 Spinæ torsio obliqua.
 207.5
 Spinalis medullæ sectio
 nis noxæ. 178.2
 Spinal. medulla. 201.20
 Spinalis medullæ nerui.
 177.20
 à Splene regius mor-
 bus. 304.22
 Splenis & iecoris vitia
 declarat color. 305.17
 Splenis vitio aqua inter
 cutem. 325.26
 Spiratio. 170.23
 Spiratio à vita separari
 non potest. 357.11
 Spirationem adiuuant
 intercostales musculi.
 205.25
 Spiratio crebra ex intē-
 fo vtero & ventricu-
 lo. 366.20
 Spiratio impedita. 171.7
 Spiratio laesa, ob calei-
 rationē equi in pcor-
 diorū regione. 216.27
 Spiratio libera. 215.15
 Spiratio nulla, aut abo-
 lita. 240.8
 Spiratio ob virium im-
 becillitatem. 237.20
 Spiratio pessima. 179.14
 Spirationis difficilis cau-
 sa. 232.19
 Spirationis vitiū. 213.14
 Spirandi quæ difficultas
 oriatur ab affecto cor-
 de. 261.2
 Spiritualiū instrumento-
 rum angustia. 214.17
 Spiritu compresso labo-
 rans athleta. 216.14
 Spiritus animalis. 147.22
 & 197.15
 Spiritus rarus & frequēs
 quid indicent. 239.17
 Spiritus visificus. 185.4
 Spuēdo reiecta thoracis
 excrementa. 263.22
 Sputi in pleuritide aut
 pulmonū dolore con-
 sideratio. 243.4
 Sputi qualitas. 103.6
 Sputum rabiosi canis ra-
 biam excitat. 364.2
 *Ster

I N D E X.

- * Stercoris & vrinae in- Stuporis causa... 58.29
 uita emissio, à resolu- Stupidus sopor. III.11
 tis nervis. 348.22 * Sublimiorū intestino
 Stesianus abscessu in rum dolores. 332.12
 musculis epigastrij la- Sublimispiratio. 237.25
 borans. 304.27 Succinctura. 279.28
 Stillicidium vrinae vn- Succigēs mēbrana. 271.1
 de eueniat. 345.16 Succus biliosus in cere-
 Stimulans dolor. 92.1 bro abūdans, visorum
 Stomachi affecti singul- causa: 193.1
 rus. 168.27 Suffocationibus vteri la-
 Stomachi affectus. 289.1 borantes mulieres vi-
 Stomachicōpres. 100.11 duæ. 358.11
 Stomachi vitio, synco- Suffocationū vteri plu-
 pa. 256.28. & 292.26 res species. 356.13
 Stomachū vocabat Ga Suffusio. 44.11. & 17.3
 leni tempestas os ven- & 151.9. & 187.28
 tricoli. 169.6. et 289.18 Suffusio curata per epi-
 Stomachus. 100.18. & stolas Galeni. 190.4
 257.21. & 283.27 Suffusiones. 17.13. 115.27
 Stranguria ex luxatis Suffusionis accidētū ab
 vertebis. 349.23 ore ventriculi procedē
 Strāgur. 333.20. 340.11 tium notæ. 188.13
 Strepens exuffla. 230.12 Suffusionis indicia ex
 Stringens dolor. 93.3 pupillæ consideratio-
 Struma. 26.17 ne. 189.10
 Stultitia. 135.23. & 139.1 Suppressa vrina. 6.25
 Stupor. 59.17 Suppressa vrina ex ca-
 Stupor dentium. 72.8 su. 350.16
 Sup

INDEX.

Suppressæ urinæ causa.	ptoma eorum quæ ex-
11.20	tumescunt. 80.20
Suppressio urinæ. 55.5	Tensius dolor. 175.15
Suppressorū menstruorum notæ. 372.16	Theriaca aduersus venena. 167.25
Suppuratio in altera nate, difficultatem motus cruris efficiens. 218.3	Tenuiorum intestinorum dolor. 232.6
Suppuratio in vesica, ex pure excreto per urinæ. 353.2	* Ex hepate in asperam arteriam trāssumptio. 264.20
Suppuratorum respiratio. 235.14	Thoracis dilatatio ī angustia spiritus. 215.29
Surditas. 18.17	Thoracis dilatatio quando vehemētior aut periculosior. 237.10
* Sympathia ventriculi cum cerebro. 151.10	Thoracis excrementa spuendo reiecta, humore colore qualis sit indicant. 263.22
Synanche. 211.25	Thoracis musculorum actio per somnum seruatur. 256.6
Syncopacardiaca. 257.18	Thoracis vlcera. 224.22
Syncerissimavisio. 56.23	Thoracis vulnus. 4.26. & 274.9
Syncopa stomachi vitio. 256.28. & 292.16	* Tinesmus. 329.1
Syndesmus. 142.18	Tityus. 135.6
Systematice, multarum pulsationum cumulus. 251.11	* Toni. 50.16
T Endones. 50.12 & 62.7	Topica remedia. 124.28
Tésio commune sym-	Tor

INDEX.

- Torpedo.** 60.19 **Turtur marina vene-**
Torpedo marina vene- nola. 165.26
 nola. 362.13 **Tussis valida.** 243.29
Torpidè pulsare. 89.20 ***Tympania.** 302.8
Torpidus dolor. 95.4 **V** **Alida tussis.** 243.
***Transpiratio.** 357.27 29
Trāspiratio per vniuer- **Vapor.** 152.1
sum corpus ab arteriis. **Variae dispositiones do-**
 240.13 **lorē excitātes.** 238.27
Transsumptio sangui- **Variorum philosopho-**
nis ex thorace in aspe- **rum placitorum enu-**
ram arteriam. 264.20 **meratio.** 134.1
Trāsumptio sanguinis **Vasa ad pulmonē perti-**
ex magna arteria in **nentia.** 275.10
pulmonem. 269.6 **Vasa ex magna arteria**
Triplicia excrementa. **per quæ sanguis in pul-**
 124.6 **monem transfertur.**
***Tubera cruda.** 210.14 267.22
Tuberculis pulmonis **Vasis erosio in pulmo-**
signa. 241.26 **ne.** 246.18
Tuberculū in pulmo- **Vasisruptionis causæ in**
ne. 235.28 **pulmone.** 245.2. & 25
Tumor gulæ cum im- **Vasorū diuisiones circa**
becillitate. 286.23 **pulmonem.** 276.1
Tumor gulæ cū inflam- ***Vehemens apoplexia.**
matione. 286.26 255.6
Tunicę œsophagi. 284. **Vehemens febris cur**
 8 **pleuritidem sequatur.**
Turgidæ māmę. 388.17 263.2

d

INDEX.

- Vehemēti siti laborātes** taneū ex vīculis. 167.7
 quatuor accidentium Ventriculi cs. 100. 15. &
 pericula subeūt. 343.5 159.6.288.24. & 372.3
 * **Vena à dextra cordis** Vētriculi partes. 326.19
 auricula ad costas nu. Ventriculi spaciū affe-
 triendas. 273.1 & us. 293.25
Vena ad costas delata. Vētriculi sympathia cū
 271.24 cerebro. 151.10
 à **Vena concaua nullus** Ventriculi vulnus. 4.21
 ramus in pulmonem. à Vētriculo nō trahūt
 272.9 succū intestina. 340.2
Vena erosa sanguinis à Vētriculo reiectus san-
 per tulsim eiekti causa. guis. 394.18
 222.20 ad ventriculum nō per-
Vena medem barbaris. tinet diabete. 342.29
 337.8 Ventriculus intumescēs
Vena media in melan- cibo, crebriorem facit
 cholicis secanda. 157.1 spirationem. 366.20
Venæ erosæ aut ruptæ Verē suffusionis indicia
 accidentia. 288.8 ex pupillæ considera-
Venæ meseraicæ quid tione. 189.10
 cōferant iecori. 315.17 **Vertebra cervicis dens**
Venarū ora ad vterum. vocata. 202.18
 367.13 **Vertebra dentiformis.**
Venarum ora quando 205.7
 aperiuntur. 246.11 **Vertebræ exteriūs luxa-**
Veneni epoti notę. 363. tæ, stranguriā cuidam
 10 induxerunt. 349.23
Venenis remediū pręsen **Vertebrarum foramina**
 per

INDEX.

- per quæ nerui exeunt. 208.14
 VertebRARũ luxatio. ibi.
 VertebRARum luxatio. nis causæ. 210.6
 Vertiginosi affectus o. rigo. 172.22
 Vertiginosis indicta ar. teriarum sectio. 172.7
 Vesica nõ habet motũ voluntarium. 346.25
 Vesica non trahit à re. nibus. 340.1
 Vesicæ affectus ob im. becillitatem. 327.21
 Vesicę caruncula. 10.24
 Vesicæ grumi notæ. 351.7
 Vesicæ inflammatio, ex spina cuidam sinuata. 349.17
 Vesicæ officium cõtra. ctio. 347.5
 Vesicæ propria actio, vrinæ excretio. 345.25
 Vesicæ pus. 10.9
 Vidua quædã neruorũ distictione laborãs ob retentum semen. 361.3
 Viduæ mulieres, vteri suffocationibus labo. rantes, per corpus re. frigerantur. 358.11
 Vigilans sopor. 138.7.&
 196.28
 Vigiliæ. 112.27.137.14
 Vincula. 62.7
 Vincula superiorib⁹ par. tibus iniecta, venenis remediũ præsentaneũ adferunt. 165.7
 Vinculum barbaricum. 75.26
 Vini historia. 111.25
 Vini moderata potio. 136.24
 Vinum album modicẽ astringens, caput non tentat. 290.16
 Viperæ. 112.10
 Vires infirmæ in dy. spnoxa. 233.15
 Vis magnetis. 362.21
 Vis olfaciendi la. sa. 182. 14
 Viscera interiora quo. modo per aluũ & vri. nas expurgẽtur. 353.25

INDEX.

- Viscidum. 93.16
 Viscifcus neruus. 184.24
 Viscifcus spiritus. 185.4
 Visio syncerissima. 56.
 23
 Visorum causæ, à succo
 bilioso in cerebro a-
 bundante. 193.1
 Vitia splenis & iecoris
 declarat color. 305.17
 Vitiata vox. 3.26. & 42.
 16
 Vitiata vox, à musculis,
 à membrana gutturis,
 & destillationibus, &
 vehementi exclama-
 tione. 228.17
 Vitiatū intestinū ex pur-
 gāte medicamēto. 35.5
 Vitium coloris. 153.28
 Vitiū spirationis. 213.14
 Vitreus humor. 68.2. &
 149.6
 *Vlceratæ gulæ indi-
 cia. 287.18
 ab Ulcere bubo nascēs
 26.13
 Ulceris perseverantis in
 renibus notæ. 336.9
 Ulcerofus dolor. 89.22
 Ulcerū notæ, per vom-
 tum apparentes. 38.14
 Ulcus in aspera alteria.
 246.25
 Ulcus in gula. 288.19
 Ulcus in pulmone. 2.19
 224.18. & 247.3
 Ulcus ligulæ. 247.6
 Ulcera thoracis. 224.22
 *Vnde dicta gonorrhæa
 377.23
 Vnde fiat pleuritis aut
 lateralis morbus. 277.
 24
 Vnde priapismi affe-
 ctus. 385.16
 Unguenta spicata & fo-
 liata. 249.10
 Vniuersi corporis cura-
 tio præmittenda. 125.1
 Vniuersalis methodus
 inueniēdi locū. 101.17
 *Vocabulorū vsus. 27.
 14
 Vocales nerui. 44.19. &
 228.1
 Vocalia instra. 116.25
 Vocaliū instrorū offi-
 cium

INDEX.


cium qñ lēditur. 117.17	Vox vitiata.	3.26
Vocem vitiant interco-	*Vreteres.	15.26
stales musculi læsi. 43.1	Vrina cruenta.	70.6
Vocis instrumenta. 42.5	Vrina cuidam ex casu	
&. 127.10	suppressa.	350.16
Vocis obscuræ & paruæ	in Vrina carūculæ.	336.
indicia.	227.22	24
Voluulus.	333.24	Vrina quomodo natu-
Volūtas in cerebro, mo	raliter reddatur.	7.23
tionis principium ner-	Vrina suppressa.	6.25
uis præbet.	145.7	Vrinæ.
Volūtari ⁹ motus. 49.29	Vrinæ inuita emissio à	
Voluptas.	59.8	resolutis nervis. 348.22
Vomicæ in vesica, fe-	Vrinæ meatus trifariam	
pto, aut aliis partibus	stipatur.	8.22
erūpentis signa. 352.12	Vrinæ profluuiū. 338.22	
Vomitio.	32.21	Vrinæ excretio, propria
Vomitionem sangui-	vesicæ actio.	345.25
nis excitat hirudo epo	Vrinæ fluor quare subi-	
ta.	225.6	tò eueniat in renibus.
Vomitus biliosus con-	341.24	
uulsionē soluēs. 291.10	Vrinæ retentio, vnde	
Vomitus, vlcerū notas	fiat.	346.12
indicans.	38.14	Vrinæ suppressæ eua-
Vox.	41.29. & 227.7	cuatio.
Vox quibus affectibus	Vrinæ suppressæ causa.	
perit.	45.22	11.20
Vox quibus partibus	Vrinæ suppressio.	55.5
affectis vitiet. 228.17	Vrina stillicidium vnde	

INDEX.

eueniat.	345.16	transiens.	373.5
in Vrinis pili.	336.27	Vteri erosio.	375.4
Vrinam quomodo re-		Vteri os, nouem mensi-	
nes tam celeriter attra-		bus ita clauditur, vt ne	
hant.	340.18	specilli acumē admit-	
Vrinā supprimētes cras-		tat.	383.26
si humores.	10.20	Vteri puerfiones.	371.9
Vrinam supprimit lapis		Vteri suffocatio.	355.28
in vesica.	350.29	Vteri suffocationū plu-	
Vrinarius meatus à cras-		res species.	356.13
so pure obstructus.		Vteri venarū ora.	367.13
	350.29	Vterus.	355.15
per Vrinas excretio pu-		Vterus cur sursum &	
ris.	338.3	deorsum trahatur, ob-	
*Vstio capitis.	108.25	stetricibus tāgentibus.	
Vfus.	14.4		368.17
Vfus diaphragmatis ex		Vterus intēsus quomo-	
Platonis sentētia.	279.	do crebram efficiat re-	
8		spirationem.	366. 6
Vfus loquendi.	231.19	*Vulnerati in thorace.	
Vfus cesophagi duplex.			274.9
	284.2	Vulnus cordis.	259.10
Vfus respiratiōis.	357.21	Vuln ^o intestinorū.	4.19
Vfus vocabulorū.	27.14	Vulnus peritonæi.	5.9
*Vteri ceruix clausa ci-		Vulnus thoracis.	4.26
tra duritiē, prægnan-		Vulnus ventriculi.	4.21
tem indicat.	372.22	Vulua.	355.15
Vteri dolores.	93.4		
Vteri dolor in coxam			

FINIS.

3731
3734
menh.
ytne
admit.
3736
3739
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000



CL. GALENI


DE AFFECTORVM

LOCORVM NOTITIA

LIBER PRIMVS,

Gulielmo Copo Basiliensi interprete.

Designat in genere notarum sedes, è quibus affectum locum intelligas, idq; particularibus
10 exemplis latius explicat. Ac ferè sedes sunt in essentia, proprietate, in contentis, in actione propria, adnatis, & accidentibus variis, quorum natura exactè distinguenda, quemadmodum affectus primarij & secundarij, proprij & è consensu, leuiter inharentes & firmitus impressi.



20

NON solum recentiores Medici, sed veterum Loci, corporum quoq; non pauci, corporum partium particulas, locos
nominare consueverunt: ac quod diligentissime affectus ipsis euenire solitos, dignoscere studuerunt: propterea quod pro locorum differentia, curationem quoque variari contingit. Sed quam utilis ad curationem sit huiusmodi notitia, in eo libro, quem de curandi via & ratione conscripsimus, videre est. Nunc vero, quomodo affectus particule possint di-

A

†is lais, qua ex propriis accidentibus constituuntur ut phlegmonis è rubore, calore, dolore remittente, &c. alias quod statim oculis

obicitur scerni, explicare dūtaxat proposuimus. Igitur partes in superficie cōstitutę, vna cū affectuum †specie facilē sensibus deprehenduntur. Quę verò in imo corpore latent, exercitū ratione virū desiderant, cū in partiū & actionibus & utilitatibus, tū vel maximē in p̄cedentibus eas corporum dissectioni- 10

Essentia bus. Quippe hę nos docuerūt, cum alia proprietates multa, tū cuiuslibet partis essentia proprietate medicis è tem. Corpus igitur quoddā cartilagineum tēperie, fa est, secundū asperas pulmonis arterias (quod cultate, brōchion appellat) cuius proprietatem hī vsu, actio dūtaxat qui ipsum viderūt, cognoscere pone & par sunt. Id si aliquando tussiendo expuatur, matibus quę ximum vlcus, vel ab erosione, vel putredine integran- in pulmone esse existimamus. Est enim & 20 tur mate- per totū collū inter pharyngē & pulmone ria & pro media, talis corporis natura: tam grandis taptis acci- men vlceraō, in ipso haud quaquā fieri possentibus test, quin prius mors animal p̄occupet. In colligitur. pulmone verò talis fieri potest, vtpote qui ob humiditatē, & facile putrescere, & à vitiōsis humoribus p̄ptē erodi cōsuevit. Adde q̄ brōchia in ipso exigua admodū sint. Quocirca pars ipsorum putrescere non potest, quin potius totum brōchium reiici necesse

cesse est, mēbranosis vinculis quę ipsum cū aliis coniungunt, à sua continuitate absolutis, quę suis brōchiis multò celerius afficiuntur. hæc enim & cartilaginea, & dura, & crassa sunt: membranę verò quę ipsa coniungunt, tenues & infirmę. Quinetiam frustum quoddam vasis, haud ita paruum, tussiendo reici vidimus, quod ex pulmone fuisse eductum, planè intelligebant dissectorię artis

10 haud imperiti professores. Quotquot enim Magnitudinem ad asperam arteriam in collo perueniunt va- do essen-
sa, omnia capillorum ferè speciem referunt. tie.

Proinde non solùm essentiaę proprietates, sed Magnitudo quoque, sapenumero affectum $\dagger \Delta \iota \sigma \chi \omega \mu \epsilon \nu \theta \iota \nu \tau \epsilon$, locum haud obscure indicare potest. Sic enim $\dagger \Delta \iota \sigma \chi \omega \mu \epsilon \nu \theta \iota \nu \tau \epsilon$ co-
cū intestini tunicam per dysenteriaę deiectionem excretam, etiam conspexeris, sitq; & latitudine & crassitudine $\dagger \Gamma \lambda \iota \nu \tau \epsilon$ expulsa.

fitudine iis quę tenuia constituunt multò $\dagger \Gamma \lambda \iota \nu \tau \epsilon$ maior, non ab re conicies vlcérationem in $\dagger \Gamma \lambda \iota \nu \tau \epsilon$ crassis intestinis consistere. Ita cū adule-
bricam.

20 scentulum tussiendo, tunicam $\dagger \Gamma \lambda \iota \nu \tau \epsilon$ viscosam crassam $\dagger \Gamma \lambda \iota \nu \tau \epsilon$ Epiglot-
tamq; reicere videremus, coniecimus eam $\dagger \Gamma \lambda \iota \nu \tau \epsilon$ tis.

internam esse gutturis partem, quę ligulam $\dagger \Gamma \lambda \iota \nu \tau \epsilon$ Vox vi-
(gręci $\dagger \Gamma \lambda \iota \nu \tau \epsilon$ vocāt) cōstituit, ac sana-
tiata.

tus est adulescētulus, quāvis id nō admodū $\dagger \Gamma \lambda \iota \nu \tau \epsilon$ 4. aphor.

speraremus, māsit tamē vox vitiata. Præterea $\dagger \Gamma \lambda \iota \nu \tau \epsilon$ 76. et 81.

per essentiaę proprietatē, à vesicę vlceribus, ea quę in renib' cōsistūt, distingui possunt.

Scripsit enim in aphorismis Hippocrates:

A 2

Si ea quæ cum urinis excernuntur lamarum speciem referunt, in vesica vlcus esse, scire licet: si verò carunculis similètur, id erit in re-
Res contē nibus. Neq; nō à rebus in particulis quibus-
ta. dam contentis, creberrimè sedes affecta de-
Historia prehenditur. Nam Mitylenis adolescēs qui-
adolescē dam secūdam sedem vulneratus gladio vul-
us Mity- nere satis profundo, tribus primis diebus, ne-
lenæi. que cibum neque potum ingessit: quarta ve-
 rò die, adhibitis prius remediis, cibum sum- 10
 psit, ac bibit quoque: deinde occidente sole,
 iterū adhibita curatione, urinae circiter qua-
 tuor heminas per vulnus excrevit, quū antea
 ex quo vulneratus erat, nihil urinae reddidisset:
 tum verò ab onere quo circa pubē gra-
 uabatur, se perfectè liberatū esse dixit. Itaq;
 proculdubio cōstabat vesicam fuisse vulne-
Intestino- ratam. Quemadmodū ubi stercus per vul-
rum vul- nus excernitur, intestinorum alicui vulnus
nus. esse illatū haud dubium est. Sic etiā quum 20
Ventricu- cibus egreditur, in vētriculo vulnus esse ma-
li vulnus. nifestū est. Iam ortū supra inguina panum
Coli ab- ac suppuratum, quū medicus incideret, ster-
scessus. cus subsecutū, in colo abscessum esse decla-
Thoracis ravit. Atq; in hoc genere cōtinetur, spiritus
vulnus. efflatus, vulnerato thorace, & sanguis ab ar-
 teria profluens. Nā quū interdū vulneratū
 corpus sensu deprehendi non potest, ex-
 tam ab his consequimur notitiā. Igitur vt
 ex

ex thorace efflatus inter respirandum spiri-
tus, membranam costas succingentem, vulne-
ratam esse significat, ita sanguis saliendo eie-
ctus, arteriam, sed hic protinus eo qui ex ve-
nis erūpit, & calidior, & magis tenuis, & fla-
uior esse dignoscitur. At veluti horum non
incertæ sunt notæ, sic eodem modo si ali-
quando omētum, aut intestinorum aliquod
excidere per vulnus videatur, peritonæum *Peritonæi*
10 discissum esse nemo ambigere debet. Si ve- *vulnus.*
rò pulmonis aliqua fibra, extremā sui partē
à vulnere exerere videatur, thoracem con-
fossū esse ostendit. Atqui nihil refert siue
succingentem membranā vulneratā, siue
thoracē cōfossū esse dixeris. Iam verò ex
his etiā quæ † adnascuntur rebus affectæ sedis † *ἐπιφύδ-*
notæ petuntur. quippe res adhærentes essen- *μενα, alio*
tiæ proprietatem obtinēt. Quemadmodum *loco vocat*
fungi, si fracto capite, meninx (id est mem- *ἐπιτρεφό-*
brana cerebrum custodiens) fuerit affecta. *μενα, quæ*
20 Atq; rursus alia proprietas conspicitur, ossis ex reli-
particulæ cuiuspiam vitiato. Huius prætereā *quæ ali-*
generis est crustula quædam (ephelcis Græ- *menti in*
cè vocatur) quod eius particulæ, à qua excer *partibus*
ni videtur, vlcerationem protendit: vt vrine *excreſcūt*
qualis in
ossibus callus, in carnis vulneribus *ὀπιδερκασις* & hic
fungus: Sunt autem fungi *πλάσσαι ἐπιφύσεις*, molles, la-
xi, flaccidiq; tumores.

meatuum, si cum vrina: spiritaliū instrumentorum, si tussiendo reiiciatur: gulæ, ac ventriculi, si vomitione, excernatur: quemadmodum si cū alui excrementis deicitur, intestinorum aliquod vlceratū esse significat. Est præterea ex indiciis quibusdam alius notitiæ modus, quum videlicet in alieno spatio aliquid præter naturam continetur, vt in renibus, aut vesica, lapis, aut pus in thorace: ex eodem genere censetur & sanguinis grumus ¹⁰ (græcè thrombos) seorsum cōtineatur, aut alius quidam humor molestus in animalis corpore, genitus, vel extrinsecus ei adue-

*Quæstio
dialecti-
ca.* niens. Vnde iuniorum medicorum complures, quæstionem ad medicæ artis opera nihil conferentem, sed dialecticam potius habentem cōtemplationem, mouere solēt: Vtrum huiusmodi res in nobis præter naturam genitæ, ex affectis sint sedibus, aut loco nullo affecto, animal à causa præter naturam male afficiatur? Sed quòd inutilis (vt dixi) sit huiusmodi quæstio, cognitu facile est, si consideraueris quantū dignotiones ad artem con-

*Vrina sup-
pressa.*

ferāt. Subiiciamus ergo aliquem tribus diebus nihil vrinæ reddidisse, nōne protinus in qua corporis parte sit huiusmodi accidentis causa inuestigabimus, an in renibus aut vreteris, aut vesica, aut vrinæ fistula? Neque enim in hepate, pulmone, liene, ventriculo, corde

corde, aut alia quauis particula ipsam quære-
mus: quòd nulla ipsarum sit vrinæ instrumen-
tum. Vnde nisi nouerimus primam vrinæ se-
cretionem in renibus fieri, deinde eam per
vreteras ad vesicam peruenire, ac demùm in-
de excerni, quemadmodum iam antea in li-
bris Naturalium actionum ostēdimus, nihil
huiusmodi inuenire poterimus. Verùm huc-

- 10 potius perpendere oportet, quænam sit di-
ctorum causa, propter quã vrina supprimi-
tur. Est autē via contēplationis hæc: Intueri
oportet omnia tum præterita tum præsentia
accidentia: Præsentia quidē ipsemet Medi-
cus inspicere debet: Præterita verò nō solùm
à laborante, sed etiam ab ipsius familiaribus
interrogando perdiscere. Sit igitur (exēpli
gratia) tumor aliquis in pube, satis euidenter
in circumscriptione vesicam impletam esse
20 ostēdens, nihilq; excernatur. Nūquid planè
constat aut excretoriam vrinæ actionē ne-
cessariò resolutā, aut vrinæ fistulā esse con-
stipatam? In primis igitur considerandū est, *Quomodo*
num fieri potuerit, vt resolutæ facultatis no *naturali-*
mine id acciderit, si prius meminerimus, *ter vrina*
quomodo per bonā valetudinē volētibus *reddatur.*
nobis vrina excernatur. Musculus enim cer-
uicē vesicæ circundans, ab actione quiescit,
fungēte tū vesica suo munere, musculi autē

actio, voluntatis nostræ, imperiū imitatur.
at vesicæ actio & inuoluntaria est & natu-
ralis. Nanque in commentariis de naturali-
bus facultatibus iam declaratū est, in omni-
bus ferè corporis particulis esse vim qua ex-
crementa secernantur. Hæc quamuis semper
ipsis absit, non tamen vtuntur ea, nisi cum vr

† Ea er- gentur ab excrementis. † Quæ si aliquando
go vi ex fuerit affecta, fieri potest, vt vrina supprima-
cretice la- tur. Proinde si hominem ita figuraueris, vt 10
boranti cō decliuus sit ceruicis vesicæ positus, ac mani-
tingit ali- bus tumorem præter naturam cōpresseris,
quādomor expelletur vrina. Quod si ita faciendo nihil
bum fie- profeceris, à causa qua resoluta vis esse puta-
ri quam batur desistere, atq; vrinæ fistulā cōstipatā
ἡκιστα, esse suspicari oportet. quippe musculus ei cir-
i. vrinæ cūdatus, si resoluatur, ipse non cohibet, sed
suppressio præter voluntatem emissæ vrinæ causa est.
nē vocāt. Itaque quot modis contingat vrinæ meatū
Vrinæ (quem ὀφθαλμὸς id est vrinæ fistulam vocāt) 20
meatus tri stipari deinceps considerandum est. Equidē
fariam sti tres in vniuersum esse censeo. Aut enim cor-
patwr. pus ipsius in tantū tumore præter naturam
attollitur, vt meatus inde occupetur: aut ali-
quid ei præter naturā, vt vel caruncula, vel
callus innascitur: aut à re quapiā obstruitur
meatus. Corpus ipsius ad insignem tumore
attollitur, si vel inflammatione, vel scirrho.
vel abscessu, vel alio quouis tumore fuerit
affectum.

affectū. In meatu caro quidē oritur, si præces-
 ferit vlcus, alia verò res longo temporis spa-
 tio ex crasso lētoq; humore paulatim nasci
 potest. Obstruitur meatus, vel à lapide, vel
 grumo, vel pure, vel crasso lētoq; humore. *Aliquādo*
 Igitur hæc omnia distinguere oportet, non *naturali*
 solum ex præsentibus accidētibus, sed etiam *vitio* vt
 ex iis quæ præterierunt. Age igitur subiicia *in virgi-*
 mus vt puer laboret. apparuerint verò antea *ne quadā*
 10 calculi indicia, vrina quidem aque similis, in *cui vrina*
 qua subsident sabulosa quædam, ipse insuper *per sedem*
 assiduè pudendum scalpat, idque vel laxum, *reddeba-*
 vel intentum præter rationem, postea vrina *tur.*
 de repente supprimatur, nunquid optima ra- *Calculi*
 tione coniecero, huic calculum in vesicæ *notæ, vt*
 cervicem incidisse? Itaque supino figurato *4. Aphor.*
 puero, vt crura reliquo corpore multo sint *79.*
 sublimiora, multifariam ipsum concuties,
 hoc satagēs, vt lapis ex meatu recedat. Qui-
 20 bus peractis, iube vt puer urinam reddere
 tēter, id si bene successerit, profluatq; vrina,
 præter exactam causæ notitiam, curationis
 quoq; modum inuenisse te, haud dubia erit
 coniectura. Quod si nihilominus vrina sup-
 primitur, rursus concute, sed vehementius,
 atque si sic quoq; permanferit, tum demissa
 ænea fistula (Græci catheterem vocāt) simul *Catheter,*
 & lapidem à vesicæ ceruice repelles, & vri- *ænea fistu-*
 nam euocabis. At nulla calculi nota retentā *la.*

Grumus. urinam præcedente, si sanguis effluerit, par
 est, ut grumus urinæ fistulā obtinet. At fieri
 potest ubi ulcerata est vesica, ut paulatim in
 ipsa grumus concreascit, vel non præcedente
 sanguinis fluore. Accidit autē ut sanguis ex
 renibus per vřeteras in vesicam desluens, gru-
 mum efficiat. Atque in huiusmodi coniectu-
 ris, magnus est æneæ fistulæ usus: haud secus
Pus in ve- ac cū vel pus, vel crassum lentumque hu-
sica. morem meatum obstruxisse suspicamur. In 10
 huiusmodi verò coniecturam, ex præceden-
 tium notitia hoc pacto inducemur. Etenim
 siue vesica, siue renes, antea affectu aliquo
 laborauerint, per quē tale tantumq; pus col-
 ligi potuerit, ut par sit ab ipso meatū fuisse
 obstructum: probabiliter coniicies, hāc ob-
 causam urinam suppressi, aut si etiam in par-
 te aliquarenibus superiore fuerit abscessus:
 quo erupto, haud absurdè pus in renes trans-
Humores sumptum esse putaueris. Quod si nihil huius 20
crassi vri- modi præcesserit, victus rationem inquirere
nā suppri- oportet, an in ocio educatus, multis cibis
mentes. crassos viscososq; humores generare poten-
Carūcula tibus, fuerit usus. Sic etiā ubi ob carunculam
in vesica. aliquam ab ulcere innatam vesicæ cervicem
 obstructam esse putamus, & ex præcedenti-
 bus ulceris notis, & ex eo qđ demissa ænea
 fistula, vrina vacuatur, intelligere possu-
 mus. nā & hūc affectum aliquādo vidimus:
 quippe

quippe demissa fistula dolorem mouit, in ea videlicet meatus parte, vbi antea vlcus esse coniciebamus: fracta q; sub fistula carne, secuta sunt vrinae excretionē, & cruor aliquis, & carnis fragmēta. Atq; hæc diximus vt quæ ad institutum opus propriè pertineāt. Constat autē, vt paulò ante citata à nobis quæstio, dialectica duntaxat sit, quodq; nihil ad artis opera conducat. Id enim vtile fuerit, vt

10 cognoscamus meatū esse obstructū à grumo, si ita contigerit, aut lapide. At quærere vtrum affectū esse meatum, aut causam suppressæ vrinae in meatu contineri, dicendum sit, nihil ad artem utilitatis conferre potest.

Itaque Archigenem satis mirari nō possum: Archigenis error. qui non solū in huiusmodi quæstionibus nis error. multus sit, verumetiam de iisdem adeò ob-

scure scribebat, vt intelligatur à nemine. Igi Vrinae sup-
tur rursus propositum sermonem resumē- pressæ cau-

20 tes, consequentia tractemus: quomodo scilicet,

tum ex præcedentibus tum præsentibus accidentibus, causa cur vrina reddi non possit, deprehendatur. Percussus ergo validè quidam in ea parte, quæ femen appellatur Femen.

(Græci perineon dicunt) inflammatione sub- Perineos.
orta in vulnere, vrinam reddere nō potuit, ac vesica ipsa, vtpote plena, manifestè secundum circumscriptionem intenta videbatur.

Huic, ne irritaretur inflammatio, æneam
fistulam

fistulam adhibere nolimus, sed aqua calida
 adfusa, oleo perūgere satius esse putauimus,
 quumque tribus horis sic eum tractassemus,
 tumore non parum relaxato, ac dolore, ut
 ipsemet fatebatur, non ita grauiter infestāte
 iussimus ut urinam reddere tētare: interim
 quum nos vesicæ tumore, ad inferiores par-
 tes impellendo, sensim premeremus, iuuenis
 urinam reddidit. Atque in his qui sic afficiū-
 tur, causa suppressæ urinae facilè deprehen- 10
 ditur. quamuis in aliis quibusdam non adeo

Coniectu- manifestè dignoscatur. In quibusartificio-
ra artifi- sa cōiectura ab omnibus vocata, nobis per-
ciosa è si- quam utilis est, utpote quæ inter exactam
gnis pro- notitiam, & omnifariam ignorātiā, media
babiliter quodammodo putatur. Proinde fieri non
colligitur. potest, ut in omnibus morbis colligātur no-
Vide Cel- tæ, quæ concursus affectuū indices ab empī
sum lib. 2. ricis nominantur. Sed verissimū est id quod
capitu. 5. Erasistratus dicere solebat: Oportet (in-
Erasistra quit) hominem exercitatisimū ratione esse, 20
tus. qui voluerit nō solūm affectus ipsius quali-
 tatem, sed affectum quoq; locum probè di-
 gnoscere. Verūm ut ad huiusmodi exercita-
 tionem decenter perueniamus, haudqua-
 quam quærendum est, an dicere oporteat,
 vesicæ ceruicem, si vel à lapide: vel grumo
 obstruatur, affectam esse, aut ipsa non affe-
 cta, actionē ipsius lædi. Igitur in huiusmodi
 quæ

quæstionibus ad artem omnino superuacaneis Archigenes versari cōsuevit. Alij verò ultra hæc procedentes, ne lædi quidē actionem dicunt. fieri enim [ipsa] videtur, musculo qui vesicæ ceruicē cōstringit laxato: vesica autē, vrina in se contenta circumdata, ac circa eam contracta: musculis verò abdominis simul exprimētibus. Quū itaq; & vesica citra noxā munere suo fungitur, & musculi volūtatis imperio sic obediūt, vt superiores intēdātur, is verò qui ceruicem circumdat laxetur, quomodo (inquiunt) rectē poterit aliquis suspicari, noxam esse actioni illatā? Quapropter supprimi vrinā dicere coguntur, non læsa, sed impedita meiendi actione, tanquam arti medicinæ opē ferant, si vocabulū lædi transmutantes, impediri dixerint. Sed huiusmodi quæstiones (vt diximus) ad dialecticā pertinet, ac ad mētis exercitacionem magis, quàm vel ad affectus ipsius dignotionē, vel sedis affectæ inuentionē accommodantur. Verū ea, quā nuper proposuimus, ad institutū opus propriè pertinet. Intelligitur autē ex ipsa, quòd in primis per artem secādi corpora accuratè cognoscere oportet, qualis sit cuiuslibet partis essentia. deinde verò & actionem, & societatem quam cum proximis habet, quæ etiam in positio-

Quin

Quinetiã ipse quoq; partiũ vsus, ad affecto-
rum locorũ inuentionem magnificè condu-
cit. Actio enim motus est partium, factius.
Actio. *Vsus.* Vsus verò omnibus insunt, vel nihil agenti-
bus. Ergo, quod ad vrinæ redditionē perti-
net, excretionis actio fit à vesicæ cōtractio-
ne concurrente interdum musculorũ abdo-
minis auxilio, quũ videlicet admodum exi-
guam continet vrinam, aut vesica ipsa infir-
ma est: reliquæ verò partes oēs, vtilēs sunt ad 10
actionē: nisi enim vesica ipsa, cū toto spatio
sic figurata fuisset, ac ceruix ipsius tota fuis-
set perforata, & vtereres obliquè implantati
in ipsam fuissent, frustra habuisset cōprimen-
di motum. Ex horũ itaq; notitia, & affectæ
partes, & affectus ipsarũ deprehēdi possunt,
non ex ea quæstione, qua inuestigatur, vtrũ
dicere oporteat, obstructum instrumentum
esse affectũ, an omninò noxa carere. Haud
ab similis huic est alia quæstio, & quidem de 20
affectis iam partibus, sed quibus nōdum in-
Propria dispositio. est propria dispositio. Vocant autem pro-
priam dispositionē, quæ separata causa, quæ
ipsam fecit, permanere potest. Hac igitur
consideratione rursus dicunt nonnulli, ne-
quaquam affici caput, per eos capitis dolo-
res, qui à bilioso humore in ventriculo con-
tento proueniunt, quòd per vomitum eie-
cta bile, protinus capitis dolor quiescat,
quem

quemadmodum si post vomitum nihilominus permanferit, tum affici caput: Idq; multo magis, quum similia suffusioni accidētia, oculos infestāt, cum platis in ore ventriculi excremētis. hac enim veluti vmbra quasdam esse affectuum. In omnibus his quæstionibus plurimum occupati maiores nostri, perquam pauca de affectorum locorum notitia scripserunt. Nos verò diuersa incedētes via,
10 exercebimus, aut (vt dixerit quispiā) instruemus studiosos, quomodo sedes affectas dignoscere possint. Igitur quemadmodū paulò ante propositū est, quòd intēta vesica homo urinā reddere nō posset, ita impræsentiarum subiiciatur, citra vesicæ tumore urinam supprimi, ergo necesse est, quū sic retenta est urina, vel vteretas, vel rens esse obstructos. Quapropter rursus hic intueri oportet, num antequam supprimeretur urina, aut lapidis, aut inflammationis, aut alterius
20 cuiuspiam mali præcellerint accidentia, neque negligenda est vniuersi corporis dispositio, vt possimus (quoad artificiosa coniectura permiserit) distinguere vtrum in ipsīs renibus à lapide, vel crassis humoribus, fuerit obstructio, an in vocatis vreteribus (id Vreteres: est meatibus) qui à renibus ad vesicā protenduntur. Atque sunt quædam quæ ad exquisitam perducunt notitiam, veluti paulò ante diceba

dicebamus, de his quæ affectæ essentia proprietatem declarant. Aliâ verò artificiosè coniecturæ inseruiunt. Vnde prolixiorè esse disputationem accidit, nisi Sophistas valere sinas: quemadmodum hoc loco Asclepiadem *Asclepiadis error.* negleximus, qui de vrinè in vesica collectione (vt alibi deteximus) absurda scripserit.

Porro ea quæ de principe animæ vi scripta sunt ab iis, qui eam in corde cōsistere existimant, omnes disiectores iā damnarunt: cum *Princeps animæ factus.* tamē Archigenes ab hac opinione haudquā dimoueri potuerit, quāuis ea reprehendatur, cū per alia multa, tum maximè per ea, quæ in phreniticorum, lethargicorūq; curatione videntur: verū tū sursum, tum deorsum sermones suos conuertit, vt modò hoc dicat, modò illud, nihil omnino declarans. Atq; huius generis est tertius Archigenis liber quē de locis affectis cōscripsit. Nos verò principem animæ vim, in libris de Hippocratis, Platonisque placitis, magna ex parte 20 absoluiamus. Nunc verò hac veluti demonstrata, affectarum partium cōtemplationem perficiemus, quodq; omnibus affectis partibus & locis cōmune est, nō dialectica quaestione, sed ad artē necessariā prosequar. Quælibet in animantis corpore actio, peculiarem habet particulā, per quam perficitur, eo quæ actionem laedi necesse est, instrumēto ipsam efficien

efficiēte quomodolibet affecto. Atq; inter-
 dum facilē affectus soluitur, adeò vt simul
 atque opifex causa fuerit separata, ipse quie-
 scat, interdum tanta est soluendi difficultas,
 vt diutius permanere possit, causa etiam ab-
 lata. Accidit autē nonnunquā vt efficiēs cau-
 sa pertransiens, nō firmum in particula faciat
 affectum, quem Archigenes cum vmbra af-
 fectus cōparat. Similiter iis qui suffundūtur,
 10 collecto in ore ventriculi tenui excremen-
 to, vnde vapores quidam subleuati, dein cir-
 cunuenti à visifica facultate, similes imagi-
 nes mouent, quales per suffusiones apparere
 consueuerunt. Idquē maximē euenire solet *Oculorum*
 iis, quibus oculorum humor exquisitē purus *imagines.*
 est, aut visifica facultas quā facillimē sen- *Suffusio-*
 tit. Eandem ob causam, vbi sanguinis fluor *nes.*
 aut vomitus per morbos expectatur huius- *Hippocr.*
 modi accidentia interdum apparent, de qui- *li. prasag.*
 20 bus Hippocrates in prasagiis hunc in mo- *3. aphoris.*
 „ dum scripsit: Si cuipiam, inquit, in non letali *32.*
 „ febre, caput dolet, aut ante oculos obscura *Ibidem a-*
 „ quædā obuersantur, aut† cordis dolor acci- *pho. 35.*
 „ dit, is bilē euomet. Ac† paulò pōst. Quibus *† κρεδνω-*
 „ verò in huiusmodi febre, caput dolet, ocu- *γυδς sum-*
 „ li verò obscuras illas imagines non vident, *mi vētri-*
 „ sed caligatione hebetantur, aut splendentia *culi mer-*
 „ quædā ipsis obiiciuntur, ac pro† cordis do- *sus. Gale.*
 „ lore, in alterutra parte, præcordia tēduntur, *† ἀντίος,*

B

παυρ-
διωπ-
πρε ven-
tricoli
morsu.

neque dolore, neque inflammatione infestant. “
 te, iis pro vomitu sanguis ē naribus effluet. “
 Hæc est verborū Hippocratis series, quibus
 docuit sæpenumero cōtingere, vt ab humo-
 ribus multis in vētriculo collectis, imagines
 quardā oculis obiciantur. Quod si nihil o-
 mnino ab humoribus ascēdat ad oculos, nul-
 lū huiusmodi accidentiū euenire solet: quē-
 admodum, vbi neque vel ad aurium, vel na-
 riū meatus, vel etiā ad linguæ corpus, quic- 10
 quam transfertur. Vnde manifestū est, quod
 oportet oculos participes fieri eius dispo-
 sitionis, quæ ventriculum infestat, si videndo
 debeat animal errare. Cū itaq; rursus dicat
 Hippocrates: † Quibus deiectiones biliosæ “
 exeunt, surditate superueniente finiuntur: & “
 Surditas. quibus surditas præcesserit, desinit, si deie- “
 ctiones sequuntur biliosæ. Quis est autem “
 adeò demens interpret, vt omittat in huius
 sermonis enarratione aurium affectum? Aut 20
 tum dicat nasci surditatem, quum bilis, quæ
 antea per aluum vacuari cōsueuerat, ad ocu-
 los efferatur? Igitur semper incipere oportet
 à læsæ actionis instrumēto, deinde quærere
 quis sit noxæ modus, vtrū videlicet dispo-
 sitio iam stabilis ac firma, an adhuc fiens, ita vt
 perseverare nondum nata sit. Quod si nunc
 quoque fiat, vtrum causa quæ affectum effi-
 cit, in ipsa parte contineatur, an per ipsam
 trans

transeat, inuestigandum est. Etenim arefacto
 immodice humore (quē crytaloidē vocāt)
 perseverans erit noxa, & essentia ipsius pro-
 prius affectus: si verò crassus humor in pupil-
 la cōstitit, essentia quidem nōdū laeditur,
 verū accidentis causa in oculo ipso conti-
 netur: sed tum per ipsum trāsire dicitur, cum
 euaporās humor cōsistit in ventriculo. Qui
 verò partem quampiam tunc solum arbitra-
 10 tur esse affectam, cū in essentia ipsius per-
 manens fuerit dispositio, † legislatoris mune-
 re, qui patriis nominibus propria significata Sic lib. 2.
 instituit, fungi videtur. Nam vbi vehemens de differ.
 dolor intestinū infestat, firmato in vna qua- pulsuum.
 piam parte dolore, vt quasi perforari videa- Intestino
 tur, quo pacto, vel nequaquam affici intesti- rum do-
 num, aut affectum in ipso non esse quis dixe- lore.
 rit? quamuis interdū huiusmodi dolores ex-
 creto vitreo quodā humore, vel vnico tēpo-
 20 ris momēto finiantur. Nec verò aliud quid- ἀξίωμα
 piā, dolorē concitasse putandum est, prater hoc modo
 humorem excretum. Quo enim excreto, il Graci de
 lico dolor sistitur, hoc ex cōmuni hominū finiunt
 opinione doloris causam censerī par est, idq; λεκτεν α-
 ob naturale quoddam axioma (id est enūtia ποτὲ λίσ-
 tum) quod ex seipso ad huiusmodi causarū ἀποφαν-
 dinotionem, fidem habere videtur. Id enim τὸν ὅσον
 quo tangente afficimur, & quo separato τὸ ἐφ' ἑαυ-
 sat affectus, causam esse, apud omnes homi- πρ.

nes in confesse est. Sic enim & igne vstulationis, & gladium sectionis causam esse credimus, atque de singulis aliis similiter dicendum est. Ergo vacuatū humorem, infestantis mali causam fuisse, quo tempore in particula continebatur, putandum est. Sed an ob *Doloris* id quod vehementer infrigidat, aut calfacit, *cause.* aut in totum per intemperaturam locum afficit, aut quia per continuas partes transit, eas ad excretionem vi quadam excitans, aut ob flatuosam spiritum ab eo exortum, qui continentem partem extendere potest, aut quia violenter impactus est, aut quia erodit, & mordet, nondum ex euacuationis ope manifestum est. quippe id solum constat, quod cum continebatur, molestiam inferebat. Igitur *Pars quā* non solū putare oportet huiusmodi humo *do dica-* *tur affe-* *cta.* rem esse causam doloris, verū partē quoque in qua continebatur, illo tempore affectam, quo ob humoris præsentiam dolore cruciabatur. Sic etiam affici aliquem dicimus cum aliquid extrinsecus incidit, vel calfaciens ut ignis, vel refrigerans ut nix, vel contundens ut lapis, quo separato protinus finitus fuerit affectus nemine propter hoc dicente, partē non fuisse affectam, quod in ipsa nulla sit relicta dispositio. Igitur hoc vno supposito, quod & nomine affectus, & verbo affici, ad hūc modū vtamur, ita dicendis animū adhibe,

be, quo vtilitatem, tum in praefagio, tum in curationis ratione consequaris. Quippe nō nunquam à causa quapiā oritur affectus, sed ita oritur, vt separata causa, haudquaquā per manentem habeat dispositionem. interdum autē partim iam factus est, partim etiam dum fit. Saepenumero conquiescit: abeunte causa iam verò perseverās manet dispositio. Veluti in dysenteria, mordax humor causa est affectus, vtpote qui ab initio & absterget, & abradit, dein temporis tractu vlcerat intestinū. Quod si ante aquā vlcus induxerit, in intestina influere desinat, affectus ipse nōdum dysenteria dicitur. Si verò vlcere praecuper intestinū, quāvis humor finiatur, nō tamen simul finitur affectus. Neq; est quod in praesentia ratione ex minutatim coaceruatis cōtexta, quem foriten (id est acerualem) vocant, moueamur: quippe multa ad vitā haud inutilia, communem ex ipso sortiuntur dubitationem: de quibus priores, tum medici, tum philosophi, locuti sunt, proinde superuacaneū esset ea nunc percurrere, mihi praefertim, qui proposui in ipsa hac parte, artis κερὸν verambiguitatem ostendere. Quod enim tembum est pore ad affectuum generationem sit opus, logicum inter omnes conuenit. An verò quemadmodum quod nondum cūm domus sit, nōdum est domus, sed facile Latotum hoc simul, siens domus: eodē etiam iure red-

das: οα pitus: ωαρε μικρόν ισοτιςως. qualia interrogata in granis quæ aceruum faciunt, in guttis quæ lapidem cavant, in momentis quæ vocant instantia, & hic de momento quo iam morbus factus dicitur & iam non fit: ita multis minu-

tatim & pacto, quilibet affectus dum fit, si cōs quidem gradatim sit, nondum tamen existat, haud ab re quæ- additus ritur: neque enim omnium quæ sunt eadem vel dem- ratio est. quippe res similes, nullā naturalē ptis simili figuram requirentes protinus ab initio eadē 10 tudine fal constant essentia: dissimiles verò, & quilibet.

bus varia est forma, essentiam generatione posteriorē habere possunt. Neq; enim quū domus cōstruitur, simul fiūt fundamenta, parietes, fastigium, tegulæ, ianuæ, fenestræ ex quibus omnibus quodammodo cōpositis, atq; in vnam formam redactis, domus ipsius Morbū fa essentia cōposita est. Morbus verò & cal- cit primus dus, & frigus, & humidus, & siccus, protinus tempera- ab initio, cū primum corpus temperaturæ, 20 menti ex- quæ bonæ valetudini debetur, limites excessus. ferit, eandem sibi ipsi naturam habet. Quā- uis enim interdum adeò sit exiguus, ut neq; à nobis cognosci, neque laborantium sensu percipi possit, nihilominus tamen propriam habere speciem censetur. Haud aliter inflam- matio quoque in quacunque animalis parte constiterit, siue maxima, siue minima fuerit, vnus atq; idem erit affectus, non specie qui- dem.

dem, sed magnitudine varius. Ceterū quod possint aliquæ affectiones in corpore consistere, adeo exiguæ, vt non appareant, argumento est gutta longo temporis tractu saxum excavans, de qua recte carmē hoc pro-
Gutta aquæ lapē
 ditum est: *Mollior assiduus saxum cavat ictibus dem excavanda.* neque enim vel vnus, vel duo, vel tres, *vans, hinc* vel quatuor aquæ ictus, saxum ferientes, ac *enim fori-* centesimus quidem, sensibilibiter videtur *tem sophi-* saxum excavare. Neq; etiam fieri potest, vt *stæ veteres* primo nihil efficiente, alter aliquid faciat. *acerua-* quippe qui habet eandem, quam primus ha-
bant. buit, ad saxū rationē. Ergo si secundus ictus in saxum quippiam effecerit, ipsum à primo ita mutatum fuisse necesse est, vt nō omnino idem, quale ab initio fuerat, permanserit. Etenim si ipsum vndiquaque idem permaneat, atq; agens quoq; in ipsum causa, nempe aquæ stilla, necesse est, quemadmodum à
 10 primo ictu non affectum est, ita neque à secundo, quod si fateare, neq; tertius quoque ipsum afficiet, quippe eadem ratio est: haud secus de quarto, & quinto, & reliquis deinceps omnibus, dicendum est. Etenim quoad eodem modo se habente saxo, eadem quoque causa accesserit, nihil amplius efficietur.
 20 Quod si à millesimo ictu, sensibilibiter videatur in saxo contauitas, ad singulos ictus, affectus in saxo nunc primum sensibilibiter apparentis

millesima pars referenda est. Quum itaque
 causæ agunt in corpus, species affectus ab ini-
 tio est eadem, tamen ob exiguitatem non
 Natura apparet. At verò huiusmodi affectus qui
vicit mor- adeo sunt exigui, separatis causis facientibus
bos exigu- illico finiuntur, natura videlicet ipsos sanan-
os. te. Quippe illi duntaxat externo egēt auxi-
 Magni lio, quos ob magnitudinem natura vincere
morbi ex- non potest. Igitur eadem quoque ratione,
ternis egēt quum primum mordax humor aliquod in- 10
auxiliis. testinorū deraferit, quāuis id quod factum
 est nōdum videatur, nihilominus dispositio
 ipsa sub dysenteriae specie comprehenditur.
 Sed ut natura parua quædā vlcera, quæ non-
 nunquam eueniunt, ita & intestinorū abra-
 siones, nullo adhibito medicamento, sanare
 potest. Hac ergo ratioe, falsum omnino est
 quod à quibusdam dicitur, Nullum per hu-
 iusmodi symptomata, in corpore relinqui
 affectum. Quod si verū esset, tamen intesti- 20
 na tum fuisse affecta haudquaquam negan-
 dum est, quum ab acredine excrementorum
 ipsa rodētium dolor notatu dignus euenire
 percipiebatur. Hoc igitur ad omnia quæ
 posthac dicturi sumus: veluti elementum
 quoddā, obseruare debetis, sitq; hoc initium
 methodi, qua inueniri debent sedes affectæ,
 nullam actionem lædi, nisi pars quæ ipsam
 facit, afficiatur. Si enim quum vel dolor, vel
 tumor

tumor præter naturã aliquis eam infestat, omnino affici dicitur, multò magis eã affici, læsa actione, fatendum est. Atq; iam supradi *Epilogus.*

- ctum est, quòd ab excrementorum natura, affectæ sedis coniecturam facere possumus. id verò bifariam fieri constat: vel ab excretae essentia proprietate, vel ab his quæ in ipsa parte continentur. Similiter diximus ab innatis interdum rebus, de locis affectis coniecturam sumi posse. Itẽ ab accidentiũ quoque genere, quæ quidem non mediocrẽ habent inter se differentiam, sed hanc postea explicabimus. Nunc verò rursus ad principium sermone reducto, in singulis partibus tentemus inuenire notas, affectus earum indicantes, tum eos qui in ipsarũ essentia consistunt, tum illos qui ipsis veluti instrumentis accidunt. Rursus in vtroque separemus & discernamus à factis iam affectibus, eos qui
- 10 etiam dum fiunt: & qui nondum pertinaciter inhaerent. Item causas quæ in affecta parte continentur, ab iis quæ eo tanquam transitu duntaxat vtuntur. Quòd verò ex iis alij *Affectus* componantur modi, satis constat. Præterea *per consensum.* distinguere oportet eos qui per consensum *sum.* alterius particulæ accidunt, à propriis. nam *Affectus* magis proprium fuerit idiopathiam, id est, *proprius.* proprium affectum, quàm vt medici solent) *protopathiã;* id est primarium affectum, no

minare, veluti ex aduerso diuiso affectu per
cōsensum à proprio. Ergo qui propriè voca-
bulis vti voluerit, primogenito quidem affe-
ctui, secūdariū aut posteriorem opponet: Ei
verò qui per consensum infestat proprium.
Quāquā sapenumero cōtingere potest, vt
aliquis simul & per cōsensum, & propria affe-
ctione laboret, cum in affecta particula per-
manens sit dispositio. Neq; enim primario,
sed secūdario & propriè, ipsam tum affici di-
cemus. Id verò haud obscure in partibus ex-
ternis videri potest: quemadmodū in corpo-

Bubo ab re plethorico, ab orto ingēti bubone ab vlce
ulcere. re, quū inductū fuerit vlcus cicatrice, perma-
net etiam dū bubon vel in suppuratā inflam-

Chæras. mationem transiens, vel scirrhosam disposi-
struma. tionem quam chærada, id est strumā, appel-
lant. At nemo primarios dixerit huiusmodi
morbos, qui ob aliū præcedentē euenerūt,
quippe per cōsensum facti ad huiusmodi per
mutātur idiopathiā, perinde ac si ptinus ab
initio protopathia (id est primaria affectio)
ipsis accidisset. Cæterū in præsentia nō inu-
tile fuerit, meminisse eorū quæ in libro de

Medici Medicis nominibus diximus, vbi de signifi-
nomina. catis est sermo, quæ pessimè à recentioribus
Actio. tū Medicis, tū Philosophis cōfundūtur. Ma-
Affectus. ximè enim propriū vocabuli, (Affectus) vsus
est contrarius, & è diametro pugnat cū vo-

ce

ce actiōis. Quippe id agere dicitur, quod ex
 seipso motū obtinet. Affici verò, quod mo-
 tū habet ab alio. Quū itaq; duo sint motus *Motus ge-*
 genera, alterationis, & lationis: vbi ad perma *nera duo.*
 nentem dispositionem alteratio peruenerit, *Morbis.*
 sitq; dispositio scilicet præter naturā, mor-
 bus appellatur: quāuis per abusionem inter-
 dum, eādē dispositionem nōnulli affectū
 nominent, qui si more Græcorū patrio no-
 mine vterentur, partes ipsas potius affici di-
 10 cerent, quum motū sustinent præter naturā:
 quum verò dispositiones habent præter na- *Vocabulo-*
 turam, si propriè quis loquatur, egrotare eas *rum vsus.*
 potius, quā affici dicet: q; si ab vsu recesserit,
 nō solum ægrotare, sed affici quoq; dice-
 re poterit. Equidē quod semper dicere con-
 sueui, nūc quoq; dicā: q; in ea doctrina, qua
 de arte quapiā agitur, satis est si quis vocabu-
 lum atq; significatum eius, pro doctoris vo-
 luntate proferens, procedat deinceps ad re-
 rum enarrationē. Admonui autem nunc si-
 20 gnificatorum, eo quòd nonnulli, non solum
 patriorum vocabulorum significata peruer-
 tunt, verū etiam eos qui rectē ipsis vti ten-
 tant, calumnia prosequuntur: de quorum
 numero sunt hi quoque, qui dicunt, inter-
 dum laesa actione, partem ipsam non lædi,
 eo quòd nondum permanentem habet dis-
 positionem, veluti vbi propter humores in
 ventri

ventriculo contentos, caput dolet. Quòd si
 cōmutata ratione, de nominibus certare de-
 fieris, magis proprie interpretādo dices, affici
 quidem caput quando ventriculo consentit,
 ægrotare verò, cū proprio affectu laborat.
 Similiter ventriculum affici quidem, quum à
 vitiosis molestatur humoribus: egrotare ve-
 rò, aut per propriam intemperiem, aut quum
 inflammationē, vel vlcus, vel abscessum habet
 præter naturam. Quòd si omnino† accura- 10
 tiori scrutinio volueris huiusmodi quæstio-
 nes enodare, interdum simul atque alimenta
 fuerint corrupta, coctionis quoque actionē
 subtilius laxam esse dices: interdum hanc quidē non
 laxam esse dices: interdum hanc quidē non
 ac velut laxam esse dices: interdum hanc quidē non
 summo nis ciborum tres primæ, ac veluti generalis-
 dialectico simæ sunt differentiæ. Vna quidem fit per
 rum iure. proprios vētriculi morbos: Altera à vitiosis
 quem ri- humoribus in ipso accumulatis: Tertia ab
 gore vo- alimentorum qualitate inducitur. Hæc igitur 20
 cant. tur quum suapte natura, vel nidorosa, vel aci-
 Cibus tri- da, aut foetori, aut putredini, aut omnino
 fariā cor- corruptioni fuerint obnoxia, aut ex præpa-
 ratur, rationis modo, ad huiusmodi dispositionē
 ex distin- aliquā deducta, certum est ea in ventriculo
 ctione cau corrumpi, atq; hoc modo cruditatem fortas-
 sarum. se fieri dixeris. Sed oritur protinus discordia,
 Crudi- nunquid afficiatur tum ob hæc concoquen-
 tas. di facultas: quippe nonnulli per huiusmodi

cru

cruditates, eam haudquaquam affici conten-
 dunt: alii verò è contrario. Atque inuenitur ^{+ ἀπὲ}
 tertia quoque secta eorū, qui huiusmodi ali ^{πρὸς}
 menta ^{+ ἡ} incrudari negant, quāuis ea ^{+ ἡ} haud- ^{+ ἀπὲ}
 quaquam concocta esse fateantur: tanquam ^{πρὸς}
 non sit idem, per negationem aliquid enun ^{Contentio}
 tiare, aut per priuatoriam vocatam à dialecti ^{est} diale-
 cis dictionem, idem intellexisse Erasistratū ^{dicorum}
 puto, quū acinos, & sesāma, & reliqua omnia ^{de priua-}
 10 ^{+ quæ} omnino corrupta, & immutata deri ^{tione, &}
 ciuntur, nullam dixit indicare in animalibus ^{neganti-}
 factam esse ^{ἀπὲ} ^{+ ἡ} id est cruditatem, sed ^{bus, de}
 hoc ipsum duntaxat, quòd non essent cōco ^{qua pri-}
 cta. Quare in his negligēter versari nō opor ^{mo cap. 2.}
 tet sed mente adhibita diiudicandū est, quæ ^{de inter-}
 quæstiones tanquā logica prætermittendæ ^{pretatio-}
 sint: contrā, quæ ad affectæ sedis notitiā cō- ^{ne Aristo.}
 ferant, atque idcirco accuratius tractari de- ^{+ ἡ}
 beāt. Hinc enim & id quod futurū est præ- ^{Nam &}
 20 sagire, & affectum iam factum decenter cu- ^{concocta}
 rare poterimus. Itaque sine contentiosis no- ^{putria,}
 minibus, ex rebus ipsis vtilitatem consequi li ^{vocare}
 cet, hoc modo: Esto vt quispiam mane exur ^{solet Hip-}
 gens dicat nidorosum se ructum emittere, ^{poc.}
 aut aliquid huiusmodi, vt ab ouis frictis, aut ^{Ructus}
 alia quapiam re magis fœtente, & putri. Ille ^{fumosus.}
 itaque qui fumosum ructum percepit, fatea- ^{Itria.}
 tur se à cœna placentā nidore plenam come-
 disse, quales sunt quæ ex oleo & itriis[& aliis
 huius

Oua fri- huiusmodi] preparantur: Alter verò confi-
cta. teatur, fricta oua ingessisse, atque nunc illo-
Radicu- rum nidore eructare: deinde alius cōplures
lae. radículas comederit, vt foetens putrisq; exeat
 ab eo ructus. Igitur cibos in is non bene fuif-
 se concoctos nemo negat, quamuis ex hac
 re ventriculus haudquaquam fuerit affectus,
 neque etiam quod ad ipsius rationem perti-
 net, circa actionē errauerit: haud aliter quā
 vbi quis integros acinos per aluū deiecerit: 10
 si enim humani ventriculi officium esset aci-
 nos transmutare, accusaremus ob hoc vētri-
 culi, corpus ipsumque vitiatum esse putare-
 mus. Cū verò id sui muneris nō sit, sed aci-
 norū essentiae accidat, vt cōcoqui nequeāt:
 haud ab re dicemus, hos quidem non esse cō-
 coctos, vētriculi verò corpus naturaliter se-
 se habere. Quippe hoc & nosse, & definire
 ad Medicū haud inutiliter ptinet, Sed qua-
 rere an dicendum sit actionem ipsius per hu 20
 iuscemodi excremēta fuisse laesam, an con-
 trā, ad medicæ artis opera superuacaneum
Ructus ni- est. Age rursus vt quispiam nidorosum ru-
dorosus. ctum emittat, nihilque nidorosum comede-
 rit, nimirum huic igneum quēdam calorem
 in ventriculo esse dicemus. Ac deinde rursus
 distinguendo inuestigabimus, vtrum ab in-
 temperie corporis ipsius ventriculi hoc eue-
 niat, aut à flaua bile: eaq; vel in ipsius spatio
 conten-

cōtenta, aut in tunicas, ita vt vix abstergi
 possit, demissa. Ac ne hic quidē cōsistemus.
 Nam quærere oportet, an iecinore male suo
 officio fungete huiusmodi humor accumu-
 letur, an is ex vniuerso defluat corpore, an
 etiam in ipsomet gignatur ventriculo. Hæc
 sunt cognitu perquam necessaria, sed quæ vi-
 ro indigent exercitata considerationis, qui-
 res ipsas potius quàm nomina quibus expli-
 10 cantur scire studuerit. Non enim quēadmo-
 dum corruptionis forma efficiētem causam
 apertē ostendit, sic etiam licet inuenire defi-
 nitam demonstrationem eius generationis
 quæ circa formā illam est. Igitur si in ventri-
 culo cibi non suapte natura in nidore trās-
 eunt, efficientem causam calidā: si verò sapo-
 rem acidum referūt, eam frigidā esse necesse
 est. Sed non protinus constat, utrū intempe-
 ries aliqua, an vitiosus quispiam humor, ven-
 20 triculi corpus infestet. Proinde distinguen-
 dum est, dareq; oportet cibos qui suapte na-
 tura modo corruptionis quam maximè ad-
 uersentur: vt panem aut chondron (gratia
 exempli) illis qui in nidorem transmutare ci-
 bum consueuerunt, mel autem his qui acidū
 à cibo saporem percipiunt. Deinde confide-
 rare excrementa, tum ea quæ vomūtur, tum
 quæ per alium deiciuntur, num humor
 aliquis, cum illis quidem biliosus & calidus, tho.
 cum

Chōdrus
enim ad-
dito acetū
tantillo
maximè
conuenit
picrecho-
lis 8. Me-

cū his verò pituitosus ac frigidus, simul ex-
cernatur: an nullo vacuato humore, ipsa exi-
guam quādam mutationem habeant. Quip-
pe vbi igneo calore vētricus infestatur, pa-
nem aut chōdron sine humore deiici vide-
bis, perquam exigua in ipsis facta trāsmuta-
tione. Quòd si humor quoq; [prauus] dei-
ciatur, qui cibum corrumpere possit, viden-
tur cibi in huiusmodi humore submersi, &
ab ipsius actiōe manifestius alterati id quod 10

Vomitio. à vomitione clarius discernitur, si laborans
suapte naturā facilè vomere possit. Nam co-
gere eum qui vomere nō potest, absurdum
est. Atque hæc ita deprehenduntur, si in spa-
tio vētrici noxius humor innatet: Si verò
in tunicas ipsius refunditur, nausea quidem
omnino consequitur: sitis verò magis à cali-
dioribus sequi nata est, vt à frigidioribus ci-
borum cupiditas, excitari solet. Verū con-
siderare oportet, vtrum illæsum sit hepar, an
affectu copiam laboret: & qualis sit ipsius af- 20
fectus, vtrum calidus, an frigidus. Haud secus
de splene quoque, quippe ex horū omnium
cōsideratione, simul cum quotidiana cibo-
rum potionumq; experientia, exquisitè po-
terit quis inuenire, nō solū locū affectum,
sed etiam ipsius dispositionem. Hæc autem
notitia eò est vtilior, quò facilius curationis
species per ipsam figuratur. Etenim calida
dispo

dispositio, vbicunq; fuerit, semper refrige-
 randa est. Sed quousque, aut quomodo, aut
 qua materia refrigerare conueniat, locus affe-
 ctus cōmōstrat. Igitur si id ipsum quod mo- *Intēperiei*
 lestat, nihil aliud fuerit quā intēperatura, *alteratio.*
 calidam refrigerando, & frigidam calfacien-
 do, illicō iuueris hominem. Neq; nudā dun-
 taxat opinionem, verum etiam scientiam, &
 quidem haud obscuram, susceptæ habebis
 10 coniecturæ: idque multō magis, si vtrunque
 ipsam examinaueris: refrigerantibus tū me-
 dicamentis, tum victus ratione, videndo ho-
 minem sanari, à calorificis verò lædi. Quod
 si humor quispiam in ipsis ventriculi tunicis
 contineatur, nausea quidem vexabit, sed in- *Nausea.*
 anis, & sine vomitu, & quæ turbat ac cōuel-
 lit duntaxat, nullum humorem euacuans,
 quemadmodum fieri solet, vbi secundū in-
 ternam spatij latitudinem, in ventriculo hu-
 20 mor continetur. Cæterum ructus ab aliis *Ructum*
 acidi, ab aliis nidorosi emittuntur. Auxilia- *sanantia.*
 tur autē illis quidē medicamētum ex tribus
 piperis generibus institutū: aut aliud, quod *Διά τρι-*
 huiusmodi habeat facultatē, ex aqua vel vi- *ων τριπε-*
 no epotum: his verò, tum absynthium, tum *πιων. 4. sa*
 hiera ex aloë facta, quam nonnulli picram *nit. tuend.*
 quoque appellāt. Igitur si per primam pro- *Hiera dia*
 tinus experientiam, à familiaribus medica- *loēs.*
 mētis, in vtroq; humore, manifestū videat

C

† ἐπισυμμε auxiliary: simul habebis, & notitiam τὰ τῆ-
 vixῆν δια ciosam, & modū curationis. si enim ipsis vtī
 γνωσῆς, si perseveraueris, homo sanitati restituetur: q̄
 mam di- si à solitis auxiliari medicamentis, vtranque
 gnotionē dispositionē noxa cōsequatur, deceptum te
 & sciens- circa notionem inuenies. Quippe certissima
 tificam. omnium huiusmodi dispositionū notitia,
 ab his deprehenditur, qui intelligūt, quibus
 quælibet præfidiis, ad bonam valetudinem
 Colicorū reduci possit. Sic equidem quosdam colicos 10
 sanatio. vocatos sanaui, dato in potu medicamento
 Dialoē. ex aloē: quippe coniiciēs. mordacem humo-
 rem ad affecti intestini tunicas defluxisse:
 dato medicamento, speravi omninò huius-
 modi dispositionem fore quietiorem: quod
 vbi contigit, intelligens recta me ductum
 coniectura, rursus plus ipsius exhibui. Sed
 quid me ad hanc coniecturam promouerit,
 Experimē operepretiū fuerit enarrare. Vidi hominē à
 tum in as calidis, tū cibis, tum medicamētis, atq; ab o. 20
 fectu coli- mni calorisifica victus ratione irritari, rursus
 co. iuuari ab alimētis boni succi, & tēperatis no-
 minatis: insuper inediā ei noxā inferre. do-
 lor is verò speciem percontanti mihi, morda-
 cem esse respondit, qua de re multo magis
 sperans, ad veram me peruenisse notitiam,
 ausus sum amarum ei medicamentū exhibe-
 re. Postremò conspiciens hominem mirificè
 adiutum, quæ fuerit dispositio, efficaciter
 me

me deprehendisse putavi. Fuit alter, quem cibi concoctu faciles irritabant. hic de præcedentibus interrogatus, respondit, se in hæc deductum dispositionem, sumpto purgante medicamento. Rursus interrogans, quid *Vitiatum* ipsum ad sumendum medicamentum pro- *intestini* mouisset, intellexi mordaces, erodentesque *expurgan-* dolores, multo tempore ventriculum infe- *te medica-* stantes, fuisse in causa. coniectans itaque vi- *mento.*

- 10 *tium* fuisse à purgante medicamento inte-
stinum, ac dispositum ad fluxiones, vt facile
reciperet ex hepate redundantes humores,
qui deinde corrumpentur, cibum exhibui
haud ita facilè corruptibilè, & adstringen-
tè, vnde & mordaces dolores mitigati sunt,
& nihil postea excreuit, quum antea protin-
us, vt mordacitatem sentiebat, corrupta
quædam, & liquida, & foetentia excernere
cogeretur. Quumq; multò post mordica- *Ex mora*
20 *tionem* tempore ea deiiceret, ad superiora *deiectionis*
intestina dispositione ipsam pertinere conie- *indicatio.*
ci. Ita in alio quoque, vbi celeriter à mordi-
catione sequebatur excretio, dispositionem
ad inferiora rectuli intestina. Huc igitur inie-
cto clystere, illum verò dictis iam cibis exhi-
bitis, sanaui. quippe certò sciebam quòd
proximæ ventriculo partes, exhibitis super-
nè, tum cibis, tum potibus: quæ verò non
ita multum à sede distant, infernè iniectis

medicamentis, promptius adiuuantur. Nō simpliciter itaq; hoc solū cōsiderare conuenit, ventēne affectus sit, an aliquod intestinorum: sed quānā sit passio: tū quæ notæ propriæ sint passionū quæque locorū affectorū, distinguere oportet. Quemadmodū concoctio frustrata, ventriculi est accidens. at ciborum ac nidorosum, vel acidū ructū conuersio, ad causas & affectus ipsius referenda est. Sic autem de intestinis & tēpus exitus, 10 & excrementorū species, atq; accidentiū differentia, cum iis quæ præcesserunt [& nunc in experientiam ducuntur], simul & affectū ipsum & partem in qua consistit, ostendere possunt. Ergo age vt per ventrem excrementa quædam deiciantur, aliquando quidem ta intesti- ta quædam deiciantur, aliquando quidem num affe- ramenta, aut velutj membranarum rasura, Etum indi aut cruentum aliquid, ac aliquādo simul o- cantia. mnia: intestinum vlcere affectum nemo dubitauerit. At verò vtrum in exilibus intesti 20 nis, an crassis vlcus consistat, nondum manifestum est. Sed, vt nuper dicebamus, & ex rasuræ specie, & exitus tempore, & (vt tertiū addatur) ex mixtione cum stercore, vt modò magis, modò minus, interdum nequaquam misceatur, distinguere oportet. Quippe infimarum partiū vlcera, nullas omninò vlcenum habent notas alui excrementis admixtas. earum verò partiū, quæ paulò altius collo

collocatae sunt, vlcera, mixtas quidem cum stercore habent notas, sed id leuiter duntaxat. Quemadmodum si multò sint altiores, vehementior erit mixtura, præcipuè verò in supremis intestinis, vlceris notæ vehementer stercore videntur admixtae. Porro accidit *Quinque* penumerò, vt ex vno indicio, simul & lo- *modis lo-* cus, & dispositio, deprehendatur: aut locus, *cus depre-* vnà cū causa: veluti locorum notæ, & ab a- *henditur.*

10 ctione laesa, & excrementis, & positu, & do- *Quatuor* loris proprietate, & propriis accidētibus su- *modis affe-* muntur. Affectuū verò, & ab excrementorū *ctus depre-* specie, & loci natura, & doloris proprietate, *henditur.* & propriis accidētibus. Sanè actio laesa, affe- *Actio le-* ctam partem indicare potest: & quidem hoc *sa.* modo. si enim accidens aliquod circa cernē-

di officium euenerit, oculum affici constat: verum an proprio affectu, an per cōsensum, aut vtroque modo laboret, alia considera-

20 tione inquirendum est. Excrementorū spe- *Excremen-* cies, affectam partem indicat, veluti iam an- *ta.* tea dictum est, & per partium ipsius essen- *Positus.* tiam, & per cōtenta in ipsa. Ac positus quo- que, affectam partem nimirum cōmōstrare sufficienter potest, quippe durus in dextra præcordiorum parte tumor, non lienis, sed iecinoris affecti, nota est: quemadmodū si fuerit in sinistra, non hepatis, sed splenis affectum portendit. Ac positus, interdum, vbi

similiter se habent excrementa, affecta parte
Tunica commonstrat. Si enim membranosa tunice
frustulum frustulum excernatur, id vlcus esse alicubi
excretum. ostēdit: verūm in qua sit particula, ex positu
 discere poteris. Nam si vomendo fuerit re-
 iectum, aut gulæ, aut ventriculi: si tussiendo,
 gutturis, aut asperæ arteriæ: si screando, fau-
 cium: si cum vrina, eius fistulæ: si à sede, ali-
 cuius intestinorum: si per mulieris pudenda,
 vteri affectum portendit. At verò constat, 10
 quod singuli dolores, propositus varietate,
 affectum locū ostendere possunt. Hoc etiā
 pacto, ea quæ supra proposuimus distingue-
 Vlcerū no re oportet. Quippe apparentibus per vomī-
 ta per vo- tum vlceris notis, animaduertendū est, vtrū
 mitum ap anteriores partes circa præcordia, aut poste-
 parentes. riores circa dorsum, dolor aliquis infestet, di-
 τὸ μοχόν. gnoscemus autem id hac ratione. Etenim
 σίρον. qui in anterioribus percipitur, ventriculum:
 σὺμαχον. qui verò in posterioribus, gulam occupare 10
 ipsius distinguendū est: si deuoratis quibus-
 dam acribus, hoc quidē in ore ventriculi, aut
 parte inferiore mordicationē excitet, illud
 verò in trāsitu gulæ quæ secundū thoracem
 est. Omnia enim hæc positu distinguuntur,
 quemadmodum alia ex doloris specie. Ve-
 rūm de doloribus latius in secundo libro di-
 cemus. Sed nūc exemplum aliquod afferre,
 ope

operæpretium videtur, quomodo scilicet locus, ex propriis affectus accidentibus innotescat. Nam supra diximus, singula quæ vultu- *Affectus*
neribus adnascuntur, propriam ostensionem *cognitio*
habere, id verò in præsentia subiiciendum *ex propriis*
est. Ore quidem ventriculi affecto, fastidiū *accidentibus*
infestat. per hepatis verò imbecillitatem, excrementa per aluū deiecta, aquæ in qua carnes nuper mactatæ ablutæ fuerunt, similitur, item maxillæ rubræ apparēt in peripneumoniacis. Quin etiā propriæ affectuū ipsorū notæ, in excrementis deprehenduntur: vtrumque, vlceris: si in vrina sabulosum refidet lapidis: cucurbitæ verò seminibus similia excrementa, latorum vermium indicia sunt. Atq; à locis ipsis, morborum indicia sumuntur: eo quòd quibusdam solis, morbus hic accadat, quibusdam verò solis nunquam eueniat: quippe soli oculi, suffusione laborant: lapis in renibus. & vesica, duntaxat nascitur, atq; (vt nonnullis placet) etiam in collo. Lumbrici in intestinis gignuntur. Rursus impossibile est, vt abscessum cor sustineat: quæadmodū neq; pulmo, neq; ligamēta dolorem. Ab accidentium quoque proprietate, affectuum indicia oriuntur. Nam quibusdam per tabificos morbos vngues adunci quod tamen vidimus in vtero interiore, caluaria, & toto mesenterio.

†Καὶ ὡς additur in quibusdam codicibus, sed non est ne-
cesse addi. Rigor enim in ardenti febre criticum sudorem
viribus integre prænuntiat, iisdem infirmis mortem: in aliis
verò mor-

bis *crisim* euadunt: sine ratione inuadens rigor, vnà cū
trahenti- febre, † inflammationis ad suppurationem
bus nulla transeuntis, indicium est. Lingua nigricans,
ratioe ma ardentem febrim portēdit. Sic etiam coloris
nifesta cō in vniuerso corpore proprietates, alia quidem
motus ri- per hepatis, alia verò per splenis affectus ap- 10
gor vnà paret: ita vt doctum medicum haudquaquā
cum febre possit fallere, sicut ne color quidem quē hæ-
suppura- morrhoides induxerunt. Cæterum paucae
tionē de- admodum sunt ipsorū affectuum notæ, quæ
clarat. non simul locum affectū ostēdant. Etenim

vt actionis noxæ, affectam duntaxat parti-
culam: ita earum differentia, ipsius affectum
declarāt. Hæc ergo sola sunt affectuū pro-
pria signa, quæ per accidens ipsos sequuntur,
id verò clarius in vniuerso huius operis di- 20
scursu patebit. Necnon videbuntur commu-
nes quoque notæ, quæ simul & affectum, &
sedem affectam, aut duos affectus, aut duas
particulas indicare possint. Huic itaq; libro

Proprius in præsentia finem imponere statui, si de
affectus. propriis affectibus, & iis qui per consensum
Affectus eueniunt, aliquid addidero: admonens in pri-
per consen mis quod affectus, qui à reliquis medicis pri-
sum. marij vocatur, equidem commodius pro-
prios

prios affectus appellauerim, quāquam nihil refert, si eos primarios nominare volueris.

Quippe satius est rerum differentias intelligere, quā contendere de nominibus. Sanè quum vel vapores vitiosi, vel ipsi quoq; humores à ventriculo ad cerebrum ascendunt

†mens læditur: primogenio quidem affectu †Διὰ νοῦν cerebrum tum laborare, dicet nemo: quamquam omni affectu carere ipsum, haudqua-

10 quam defendi potest. Verū quod per ver- Per cēsen-
bum consentire de illis ipsis est in confessio, sum affi-
id omninò verissimum est. quippe ex verbo ci.

(per consensum affici) partem nō penitus ab affectu esse liberam, sed ipsam cū alia affici,

declaratur. Atqui melius, clariusq; enarraue-

ris, si eam partem quæ per consensum affici-

tur, ob alterā affici dixeris. Igitur quod mul-

20 ti medicorum veluti somniātes obscurè in-

tellexerūt, atq; ipsum vtpote nō intelligētes

haudquaquam clarè enūtiāuerūt, id equidē

veluti instituto operi perquam necessariū,

docere agredior, inde sumpto initio. Sūnt

nonnullæ actiones, †quæ idonea indigentes †ἐξ ἄλλης

materia, ipsam ab aliis partibus præparatam πικρῶς

accipiunt, qua de re interdum optima ratio- γένεσθαι

ne fit, vt nulla existente in actionis cuiuspiā Vox.

propriis instrumētis noxa, actionem ipsam

perire contingat, defectu scilicet materiæ,

ex qua fieri consuevit: veluti in voce res sese

habet. Nā in libro quem de ipsa conscripsi-
 † ἐκφύση- mus, ostēsum iam est, quod † flatus, materia
 οἷς, effla- quidem vocis est, & efficiūt eum contracto
 tio. thorace, intercostales muscoli. Igitur his ni-
 hil agentibus, animal vocem amittit, & qui-
 dem nullo interdum in propriis vocis par-
 ticularis, apparente affectu. Sunt verò huius-
 Vocis in- ticularis, apparente affectu. Sunt verò huius-
 strumēta. modi partes, summatim quidem loquendo,
 totus larynx. Si verò particulatim explicare
 volueris, sunt tres cartilagine, à tribus mo- 10
 tae musculis, quibus accedūt nerui à cerebro
 demissi. Est prætereà in gutture ligula (Græ-
 ci epiglottida vocant) hæc maximè propriū
 Vox vitia vocis instrumentum est. Etenim quum mo-
 ta. deratè & aperitur & committitur, vocem ef-
 ficat, quāquam vocem reddi impossibile est,
 nisi vehementer spiritus egrediatur. id verò,
 intercostales muscoli perficiūt. Cecidit qui-
 † κατὰ τῆς dam ab alto, † ita ut dorsi initium affligere-
 γῆς, sed fa tur, is tertio die exiguum admodum vocem
 cile intelli emisit, quarto deinde die omninò obmu- 20
 gitur. tuit resolutaque simul fuerunt crura, mani-
 bus omninò illæsis, sed neque spirationem
 amittebat, neque difficulter spirabat. Quum
 enim tota sub ceruice spina esse resoluta, ac-
 cidit thoraci, ut tum per septum & septum
 transversum, & musculos supernos, numero
 quidem sex, moueretur: quippe nerui ex spi-
 nali medulla, quæ in ceruice est, ipsis adue-
 niunt.

niūt. At intercostalium musculorum nervi, *Intercoſta*
per quos efflationē fieri diximus, omnes af- *les muscu*
fecti erāt. Quum itaq; frustra medici nego- *lileſi vocē*
tium subirēt, circa crura quidem, vtpote re- *vitiant.*
soluta: circa guttur verò, propter vocis affe-
ctum, equidē id interdixi, atq; affecto dunta-
xat loco curationem adhibui. Proinde fini-
ta tandē spinæ inflammatione: à septimo die
vox restituta est iuueni, & crura motionis
10 facultatem recuperauerūt. Huiusmodi ergo
noxæ speciem, magis propriè per cōsensum
euenire dixeris, quàm vbi ab humoribus in
ventriculo contentis, caput dolore tentatur.
quippe per huiusmodi dispositiones, eleua-
tur ad ipsum aliquid: sed in dictis nuper dis-
positionibus, nihil noxium ad crura defer-
tur. Nam contra, priuantur ea facultate, quā
anteà spinalis medulla ipsis suppeditabat.
Guttur verò, quum vox ablata est, non o-
20 mninò priuatur spiritu. quippe spirare ani-
mal per ipsum, etiamdum videmus. At verò
flatum amittit, qui quidem fieri solet, cum
affatim pluribus spiritus per guttur anima-
lis foras effertur. Sed de nominibus conten-
dere cæteris permittamus, nobis enim res,
quas illi penitus ignorant, pertractare satis-
fuerit. Quippe aliter dolet caput, vbi con-
tenti in ventriculo humores eleuantur, qui
simul & calfacere, & distendere caput
possunt

Suffusio. possunt: atq; aliter suffusorum apparent visa
quædã, neq; calfactis, neq; intētis oculis, sed
solo vapore per ipsos trãseũte. Prater à ali-
ter affici videtur is, cui meatus à cerebro de-
scendens obstructus est: aliter ille (quamuis
huic quodã modo sit similis) cui propter spi-
næ inflãmationem resoluta sunt crura: atq;
aliter is, cui vox aut periit, aut vitata est. Et
enim ad crura facultas quædã, sed citra essen-
tiam, descendere prohibita est, ad oculos ve- 10
rò cū essentia: verũ ad guttur, quãuis ma-
teria perueniat, sufficiens tamẽ ipsius quãti-
tas haudquaquã accedit. Qui verò ob inter-
costaliũ musculorũ perforationem obmu-
tuit is totã vocis materiã amisit. Porro quẽ
admodũ crura, per dictas spinæ dispositio-
nes resoluũtur, ita etiã guttur, vocalibus ner-
uis vel incis, vel laqueo interceptis. (Voca-
Vocales re autem vocales nervos consueui eos, quos
nervi. ipse inueni: nam præceptores mei eos dunta 20
xat qui ad arterias pertinent, cognoscebant)
atque ob horum quoque vitia, vox perire
solet. quoniam proprij gutturis nervi, quos
Nervi re- equidem recurrentes nominare sum soli-
currentes. tus, ipsorum essentia pars esse censentur.
Sed quum ad multas alias partes distribu-
ti perueniant, nullam habeo aliam magis
propriam appellationem, ea qua vocales
iplos nominavi. quippe ad instrumenta vo-
cem.

cem cōcinentia, propriè pertinēt. Atque idē est modus, quo gutturis muscoli læduntur, siue recurrētes nerui, siue hi qui iuxta artē-
 rias sunt, vitientur. vtrinq; enim animalis *Facultas*
 cultas desideratur, siue qua à consilio, & vo- *animalis.*
 luntatis imperio, moueri illos non cōtingit.

Et quidem incisus musculus, qui ligulā (id est epiglottida) mouent, animal penitus mutū euadit. sed neq; simili omninò modo, neq;
 10 etiam in totum diuerso, ab eo quo læsis neruis, vox perit. Nā vtriusq; noxa, hoc cū altera habet cōmune, quòd ligula continuitate, quàm admouens principiū habet, priuatur. id verò fieri solet siue neruus siue musculus incidatur, aut laqueo intercipiatur, aut contundatur, aut quomodolibet aliter vitietur. Equidē vocē vitiatā fuisse memini, adeò vt penè perderetur, in frigidatis vehementer neruis recurrentibus, quum per hyemem
 20 ceruix fuisset incisa quod quū intelligerem, caloricis remediis naturalē tēperaturam neruis restituens vocē reuocaui. Cēte- *Vox qui-*
 rum vt ob materiæ priuationem, perforato *bis affe-*
 thorace: ita etiam aspera arteria tota incisa, *ctibus pe-*
 vox perit, quòd nullus super sit spiritus, qui *rit.*
 ad proprium vocis instrumētū transmittatur. Idē efficit, sed alio modo, laqueus [toti]
 collo circumdatus. verū hic nō solū mutū reddit animal, sed etiā suffocat, tollēdo
 scilicet

scilicet spirationem. Arteria autem dissecta, voci quidem nocet, sed animal respiratione non priuat. Angina verò vocata, quum sit internarum gutturis partium inflammatio, strangulationi proportionem respondens, respirationem tollere potest, ipsius meatum obstruendo. Idcirco vocalis instrumenti, maxime proprius affectus est, ac deinceps externorum ipsius musculorum noxa est. Cæteras verò partes omnes quarum meminimus, non proprie, sed per consensum potius afficit.

Chæradides. Quum ex ceruice quidam chæradas (id est strumas) in profundo incubentes excideret, non scalpello diuidens membranas, ne vas aliquod dissecaret, sed unguibus eas euellens, imprudens ob ignorantiam simul recurrentes nervos distraxit, atque hoc pacto puerum liberavit à strumis, sed mutum reliquit. Quidam alius, in alio puero sectionem faciens, ipsum similiter semimutum reddidit, laeso videlicet altero duntaxat nervo. Mirabantur verò omnes, quo pacto neque aspera arteria, neque gutture affecto, vocem ladi contingeret, qui quum vocales nervos (me ostendente) conspicerent, admirari desierunt. Quibus igitur partibus, vel materiae, vel facultatis copia non transmittitur, actionem ladi probabiliter dixeris, parte ipsam faciente nequaquam laesa. At verò si vel à vaporibus, vel humoribus

ribus aliunde ad ipsam veniētibus, lædatur,
 eam nō rectè dixeris illæsam. Neque minus
 etiam probabile est, partem vel materia, vel
 facultate priuatam, lædi, vtique si officium
 suum, quum hæc reciperet, secundum natu-
 ram exercere posset. Proinde ex huiusmodi
 in vtranque + partem conatu, dialecticorum *+ πικρὰ*
 problematum consideratio, neque ad affe- *φθώρας,*
 ctuum notitiam, neque ad curationē, neque *sunt enim*
 10 etiam ad futurorum euentuum præfagia, *propria*
 quicquam vtilitatis afferre posse videtur. *epichere-*
 Animaduertas ergo velim, quomodo equi- *mata dia-*
 dem curationem ex affecti loci notitia in- *lecticorū.*
 uentam, hac cōsideratione neglecta, narra-
 re aggredior. Occurrit mihi quidam, medi-
 camentum tribus digitis adhibitum osten- *Digiti re-*
 dens, dixitq; triginta iam diebus, sensificam *soluti.*
 ipsorum facultatē se amisisse, illæsa seruata
 motione, sed nihil præsidij ab impositis me-
 20 dicamentis percipere. Ego verò id quod in
 huiusmodi casibus facere consueui, ne tunc
 quidem obliuioni tradidi. quippe vocato
 medico qui digitorum curationem susce-
 perat, interrogavi cuiusmodi remedia adhi-
 buisset: quæ quum intelligerem ad hanc rem
 esse idonea, causam inuestigare corpi, cur
 nullum ab ipsis homo præsidium cōsequu-
 tus fuisset. inquirens itaque quæ præcesse-
 rant accidentia, inueni, ipso dicēte, neq; in-
 flama

flammationem, neq; refrigerationem, neq;
ictum precessisse, sed ipsum paulatim sensum
perdidisse. Captus itaque admiratione, rur-
sus interrogavi, nū superiorū partiū aliqua
icta fuisset? Ille respondit, digitos quidē non
fuisse ictos, sed dorsi initium fuisse afflictū.
Deinde quomodo, & quando id accidisset
quum interrogarem, respōdit, se quum Ro-
mam proficisceretur, à vehiculo decidisse,
ac non multò post digitorū incepiſſe affe-

Nervorum à ctum: quocirca coniecturam feci, nervorum
cervice or- qui primi à septima vertebra procedūt, partē
torū pro- quampiā ob ictū fuisse inflammata, ac nūc
ductio & scirrhosam habere dispositionē. Id verò in-
confusio. tellexi, doctus ex arte secādi corpora, q̄ ner-
vi per propriā circumscriptionem, veluti ve-
næ, exoriri videntur, adeò vt vnūquemque
exquisite vnū esse putares, quemadmodum
& venam. Verūm protinus ab origine mul-
ti sunt simul concreti, & communibus inuo-
lucris contenti, quæ à cerebri mēbranis ex-
oriuntur. Ergo nervorū, qui à cervice pro-
deunt vltimi, humilior pars ad minores per-
uenit digitos, per cutē ipsos continentem, ac
prætereā per mediū digiti medietatem disper-
Parado- fa. Quod verò cæteros medicos in maximā
con. duxit admirationem, quòd media duntaxat
pars afficeretur, id mihi persuasit potissi-
mum, eam tantūm nervi partem quæ in cu-
bito

bito ab ipso egrediens, in iam propositis digitis finitur, esse affectam. Igitur adhibitum ei medicamentum abiicere iubens, illi præcipuè spinæ parti, quæ in affecta particula initium & originem obtinebat, ipsum adaptauit. Secutaq; est res, vt aspicientibus videbatur, & admirabilis, & inopinata, quod digiti manus adhibitis spinæ medicamentis essent curati. Verùm affectu omnino summoto orta est inter medicos quæstio, quænam sit eiusmodi neruorum dispositio, vt per ipsam seruato eorum motu, sensus pereat. E quidē id ipsum dicebā, quod priores medici dicere solebant, quod scilicet sensus per affici, motus verò perfacere aliquid, explicatur: quapropter vt quis moueatur, opus est robore: sed vt sentiat, vel minima facultas sufficit. Cum quæ recte me hunc dixisse sermonē putarēt: quid igitur (inquam) num vidistis aliquādo contra euenire, vt seruato sensu, motus periret? Tum cæteris omnibus se nunquam conspexisse dicentibus, vnus id cōfiteri audebat: ac nomine laborātis citato, testes quoque adhibere policebatur. Quamuis hoc cum proposita ratione pugnare videretur, in partibus motis illis quidem, non verò sentientibus (etenim quod ad hanc rationem pertinet, fieri haudquaquā potest, vt perduto sensu, motus à voluntatis imperio prodiens seruatus.

Sensus amissus illeso motu.

Alius moueat.

Motus voluntarius.

D

uetur) rursus orabāt, vt causam explicarem,
 quam obrem vtraque appareāt. Ea verò (vt
 planè intelligūt ij, qui neruorum dissec-
 tionem didicerūt) talis est: Omnis voluntarius
 motus, ad musculorum officium pertinet:
 quippe nullus neruorum per se, sine muscu-
 lo, vllam huiusmodi inanimantis particulis
 actionē efficere possunt, sed per musculos,
 omnes à consilio & voluntate prodeuntes
 motus perficiunt. ad partes verò mouendas, 10
 musculi ipsi aliquando quidem manifestè
Tendones: perueniunt, aliquādo verò per medios ten-
 dones, quos aponeuroses (id est deneruatio-
 nes) aliqui cognomināt. Atq; ex hoc gene-
 re sunt tendones, quibus digiti mouentur,
Toni, epi- haud ab similes his, qui toni ab Hippocrate
dem. lib. nominātur, rotundi scilicet. Si itaq; muscu-
 2. *sect. 4.* lorū neruos affici cōtingat, motus digitorū
Paralyfis. perit: si verò eos qui ad cutē perueniūt, tan-
 gendi sensus corrūpitur. Sed vbi tota resol- 20
 uuntur mēbra, cum videlicet cōmune prin-
 cipiū affectum est, simul & sensus & motus
 pereunt: atq; tum locū primario affectum,
 ex laforum neruorū multitudine dūtaxat,
 inuenire poteris, idq; si exquisitè cognoue-
 ris cōmunia ipforū principia, quæ in neruo-
 rum dissecctione perecurrimus, cū nullus ante
 me huiusmodi dissecctionē accuratè tracta-
 set, vtpote nemine non plus minus errante.

Igitur

Igitur solus ille, qui in ipsis fuerit exercita-
 tus, exquisitè cōsiderare poterit, in qua verte-
 bra, spina sit affecta: siue tota, siue altera eius
 pars afficiatur. Nā accidit, vt dextra pars dū- *Pars al-*
 taxat afficiatur, altera omnino illæsa: aut è *tera spi-*
 cōtrario, vt illa manēte integra, sola sinistra *ne affe-*
 affectum sustineat. Atq; hac ratione, inter- *cta.*
 dum tota pars sinistra resoluitur, dextra par-
 te manente illæsa: interdum contrā, dextra
 10 pars duntaxat & afficitur, & resoluitur. Vbi
 verò nō affecta spina, tantū vnus nervi pro-
 cessus læsus est, eas duntaxat partes resolutio
 consequitur, in quas nervus ille distributus
 est. Accidit enim interdum, vt duo, aut tres
 duntaxat nervorum processus afficiantur,
 quum interim spinam nulla noxa infestet.
 Sic affectus eratis, qui per reliquas quidem
 manus partes omnes, ita fuit resolutus, vt
 neque sentiret, neque moueretur, sed in tri-
 20 bus digitis sensum habebat integrum. Por-
 rò cuidam alteri, nō solum ii manserunt il-
 læsi, sed etiam eorum musculorum, in quos
 nervorū propago sub septima vertebra ex-
 orta distribuitur, motiōes seruatae sunt. Atq; *Nervorū*
 alius, ob casum ab alto vehementer effli- *spinæ af-*
 ctus, solos eos musculos resolutos habuit, *fectorum*
 qui huius nervi partes suscipiunt. Idē etiā in *notitia.*
 iis duntaxat cutis partibus sensum amisit, ad *τὰ πρὸς*
 quas prædicti nervi *μὴ κατὰ* *τὰς* *μυῖδας* demittūtur.

Igitur si scire desideras in qua vertebra sit affectus, vtrum in sola nerui cuiuspiam propagine, an in spinali quoque medulla, in neruorum dissectione te exercitatum esse oportet: communemque habere methodum, qua resolutos musculos, vnâ cum cute quæ sensum amiserit obserues. nā spinali medulla in aliqua vertebrarū affecta, omnes partes inferiores resoluuntur. Quod si in altera parte lædatur, altera manente illæsa, partes duntaxat quæ illi è directo respondēt, resolutio infestabit. Si verò nerui radix afficitur, reliquæ partes omnes affecto loco inferiores, nihil afficientur, sed solæ illæ partes resoluētur, in quas singuli nerui distribuūtur. Hæc si accuratè didiceris, circa resoluta mēbra, relicta spina, omnino occupaberis: huic enim adhibitis remediis, partē affectā curabis. Sic etiā si nō circa spinā, sed in regione illā sequente, neruus afficitur, partim ex musculis, par-

non *Musculi* tim ex cute, quærendæ sunt notæ. Cutē qui-
cognitio. de facile est cognoscere, nā oculis subiicitur: musculi verò, ex actione quæ periit deprehēduntur. Proinde necesse est, circa musculorū sectionem te exercites, vt cognoscas, cuius actionis quilibet sit instrumentum: sic enim duntaxat discernere poteris partes, quarum actio perit nullo morbo corporalē ipsarum essentiam infestante, aut in quibus præcedit mor

morbus, vel fiens, vel factus. Verū morborū
 genera & differentias omnes ex eo didicisti
 libro, qui de Morborum differentiis inscri- *Librorum*
 ptus est: atque similiter ex alio accidentium *de morb.*
 differentias. at de causis vtrorumque etiam *& sym-*
 separatim scriptum est. In vno quidem de *ptomatis*
 morbis, in tribus verò de accidentibus: in *utilitas.*
 quibus exercitari oportet eum qui facile vo-
 luerit inuenire, discernereque & causam, &
 10 affectum, & sedem affectā. Etenim fieri non
 potest, vt omnia per concursum doceantur
 quamuis eorum, qui ab experientia empirici
 vocantur, huiusmodi fuerit opinio. Qui ve- *Syndro-*
 rò accuratè & præcedentia, & præsentia co- *mas em-*
 gnouerit accidentia, atque sic ad curandorū *pirici fin-*
 morborū experientiam via & ratione per- *gunt ex*
 uenerit, inueniet & locum affectum & simul *proprijs*
 ipsam dispositionem. Sed id magna ex par- *accidenti-*
 te accidit partibus, quæ in intimo corpore *bus, com-*
 20 constituuntur, veluti paulo ante de his qui *munibus*
 sensum & motum perdiderunt, ostendimus. *& cau-*
 Atq; non ab re fortasse fuerit narrare quæ- *sis exter-*
 dam quæ iam facta fuerunt, cuiusmodi hæc *nis.*
 sunt. Puer annorum ferè sex, inuitus per aluū *Excremen-*
 excrementa deicere incoepit resolutio de- *ta sponte*
 repente circa sedem musculo. Quinetiam se *deiecta.*
 ni quondam huiusmodi euenit accidens, at-
 que rursus alius puer, ætatis ferè annorum
 quatuordecim excrementa inuitus per aluū

deiecit, infestāte simul vesicam dolore, atq;
 alteri vrina quoque fuit suppressa. Contrā,
 alius vrinam inuitus excreuit, atque alius nō
 solum vrinam, sed alui quoque excrementa
 inuitus deiecit. In iis omnibus, ea quæ præ-
 cesserunt, scrutari oportet. Nam in totū aut
 refrigeratam, aut ictam ipsorū spinam, arbi-
 trandum est. Sed frigus quidem, vni dunta-
 xat affecto musculo nocet: ictus verò, ma-
 gna ex parte pluribus noxā infert. Nā perra
 rum est, vt icta spina vnus afficiatur muscu-
 lus, quoniā nerui ex spina orti in plures mu-
 sculos diuiduntur. Verūm vbi ob ictū affe-
 ctus est musculus, si superueniens inflāmatiō
 ob negligentiam in scirrhū coierit, resol-
 ui ipsum contingit, quanquā id rarō acci-
 dere videatur. At verò frigus sæpenumero
 vnum lædit musculum, maximè cum qui in
 superficie sedis est, siue sederit quis super la-
 pidem frigidum, siue in aqua frigida supra
 modum fuerit versatus. Igitur puer cuius &
 vesica, & sedes lēdebatur, cū in fluuio pisces
 venaretur, sic fuit affectus. Nonnullis etiam
 in aqua frigida natantibus, itidē accidit. Hos
 itaque sic affectos, curare oportet, calorifica
 auxilia locis affectis adhibendo. Quibus ve-
 rō neruorum à dorsi spina ortorū quispiam
 fuerit affectus, eius principio adhibēda sunt
 remedia. Sæpenumero etiam vbi ab alto lo-
 co

*Musculi
circa spi-
nam af-
fecti.*

*Spinæ re-
frigeratiō.*

Curatio.

Et quis cecidit, aut vehementem fortemque
 ictum spina subiit, inflammatio ad plures par-
 tes extēsa, nō solū musculis, sed vesicæ quo-
 que noxam intulit, quibus ob vesicæ ipsius
 affectū, vrina supprimitur. Sunt quibus non *Vrinae*
 solum vrina, sed alui quoque excremēta pe- *suppres-*
 nitus retinentur, affectis scilicet intestinis. *sio.*
 Nam vt musculi affecti, actiones à consilio *Aluus*
 & voluntate pendentes: ita & vesica & inte- *astrieta.*
 stina, naturales actiones lædere possunt, eo
 10 quod ipsis cōtractis excernūt urea quæ con-
 tinent. Atque in hac re plurimū differūt na- *Natura-*
 turalia ab animalibus instrumētis: siquidem *lia instru-*
 naturalibus cognatam actionis vim esse, ani- *menta.*
 malibus verò instrumētis, à principio (velu- *Animalia*
 ti lumen à sole) ipsam defluere, iā ostensum *instrumē-*
 est. Ergo vt magneti lapidis vis inest, qua fer- *ta.*
 rum attrahere potest, ita naturalia quoque in-
 strumenta omnia, facultatē habēt, qua actio-
 nem suam perficiunt. Proinde si permanens
 20 fuisset ipsorum essentia, neque arteriis ne-
 que venis indigissent. verū quia nutrime-
 to egent, seruareque oporteat innati caloris
 temperiem, hanc ob causam, & venis indige-
 bant, & arteriis. Sic etiā musculi, vt essentiā
 suam seruare possint, non secus quā natu-
 ralium instrumēta, & venis & arteriis indigēt. *Musculo-*
 At quia cognatum sensus & motus princi- *rum com-*
 pium non habent, idcirco nervis [per quos] *positio.*

hoc ipsis influat] semper indigent, qui illis ea
suppeditare possint, quæadmodum sol omni-
bus rebus quas illuminat, splendorem affert.

Quamobrem solis partibus, quæ & sentien-
di, & mouendi vim habent, accidit, ut ipsis
interdum haudquaquam affectis, nihilo mi-

Natura- nuseorum actio pereat: id quod naturalibus
lia instru instrumentis accidere non solet. quoties enim
menta. horum actio læditur, semper primario affe-
Animalia ctu laborant. Verum animalibus instrumen-
instrumē tis omnibus, naturale quoque munus debe-
ta. tur: quippe & arteriarum, & venarum admi-
niculo indigent, ad essentiam ipsorum seruā-
dam. Ideo accuratissimè intueri, ac discer-
nere oportet, quæ accidentia eis, ea ratione
qua aut naturalia, aut animata sunt, soleant
euenire: veluti alterari (ut ita dicam) à vici-
nis, ipsis, ut naturalibus: alterationem verò
sentire ut animatis, euenit: Sic oculis quoque
sæpenumero contingit. Nam vapores à ven-
triculo elati, ipsos omnino alterant. verum
tam exigua alteratio non ab omnibus senti-
Synceris- tur, nisi syncerissimam habeant sensificam
sima vi- facultatem. voco autem syncerissimam, quæ
sio. minimas quasque res cernere potest.

LIBRI PRIMI

FINIS.

C L.

CL. GALENI

DE AFFECTORVM

LOCORVM NOTITIA

LIBER SECVN-

D V S.

*

10 In hoc libro totus ferè Galenus est contra Archigenem in proprietate, hoc est specie, & qualitate dolorum, unde non tam dispositiones quàm affectas partes inuenias. Fuit hic Archigenes insignis medicus, & testimonio Galeni probus. Excuius præcipuè commentariis de locis affectis, horum librorum partem Galenus transtulit. Inuenis quoque apud Galenum in libris de compositione pharmacorum κατὰ τόπους, & κατὰ γένη, qui ante Galenum hoc idem argumentum de locis affectis tractauerunt.

20



CORPVS est, iubente semper Erasistrato, exercere mentē cum in aliis artis operibus, tum verò in ea, quā nunc proposuimus, affectorū locorū notitia. Circa quam tres sunt exercitationis modi. Vnus circa singulas corporis partes, quas locos nomināt: Alter circa causas & dispositiones: Tertius est de accidentiū differētia. Igitur à locis sumptus modus, huiusmodi est: Affecto cerebro, huiusmodi

Exerci-
tationis
modi tres.
Locos.

D. s

separatim eueniunt accidentia: Ventriculo affecto, hæc sunt propria: Colo affecto, hæc: atq; in reliquis similiter. A dispositionibus, & causis, talis est: Inflammationis seorsum, huiusmodi sunt accidentia: Scirrhi, huiusmodi: Refrigerationis, hæc: Plenitudinis, hæc: *δια-*

διαφθο- *φθοράς* (id est corruptionis ciborum) hæc. *φ* est cū Ab accidentibus, vt hoc doloris genus, hæce humor dispositiones portendit, aut hosce locos: tuf- adeo vi- sis verò hæc: ita & vomitus, sanguinis pro- 10 tiosus est fluuium, fluor alui, conuulsio, rigor, quæ est vt nullo concussio totius corporis, horror, delirium. caloris Quum enim hæc omnia inter se hoc pacto & natu- distinguuntur, facile intelligetur, quid vel ræ opifi- bene, vel male dictum fuerit. Quod verò sic cio ali- sese res habeat, planè discas, si singula consi- mēti for- deraueris.

mam & De his quæ ab Archigene scripta sunt putan- te ex doloris specie sedem affectam posse discerni. 20

C A P. I.

Vale hoc sit quod statim initio pro- ponatur: quū in hoc genere multus sit Archigenes, qui ex dolorū dif- ferentiis, locos affectos significari existima- uit, exactè super his considerandū est. Nam stupidum quidē dolorē in neruis fieri dicit, sed planè peccat. quippe cum stupor à frigi- da dispositione oriatur, non neruorum dū-

tax

taxat, sed etiam venarum, arteriarum, carnis, membranarum, tunicarum, & cutis erit. Igitur si ob id, quod hæc omnia per nervos sensum habent, ad nervos dispositionem refert, cur non reliquas omnes dolorum differentias, propriè ad nervos pertinere dicit?

Quippe ut dolor, tristis sensus est: ita volu- *Dolor.*

ptas, blandus est sensus. Ergo non solum stu- *Voluptas*
por in nervis est, verum etiam reliquorum *vel dele-*

10 dolorum omnium, quos ipse quoque Ar. *Etatio.*

chigenes descripsit, unusquisque. Quod si rem accuratius inspexeris, haudquaquam doloris, species dicendus est stupor: veluti neque vlceris species, vlcus inflammatum. Sed

duarum potius rerum, in his quidem vlceris & inflammationis, in illis verò doloris & stuporis concursus est. Etenim stupor refri- *Stupor.*

geratio insignis est, idcirco corporibus ita dispositis, & sensus & motus difficultatem

20 inducit. Quemadmodum completa refrigeratio, & sensum & motum omnino tollit. Sed quod stupor dispositionis sit nomē, non sensus, aut doloris, sic dicente Hippocrate declaratur: Stupor enim mediocris, dolorem solvere potest. Nam stupor, ob refrigerationem fit, ut planè videre est in his, qui in hyeme per frigora proficiscuntur, atque in refrigerantibus quoque medicamentis: Nam si extrinsecus immodice adhibeantur,

par

Nimia
refrigera
tio.

particula ipsa stupida euadit: quæ deinde
sensum quoq; omnino amittit, si vehemen-
tissimè refrigeretur, idque nō solū à medica-
mēto, sed etiam à circūfuso nobis aëre. E qui-
dem noui quosdam adeo refrigeratis pedi-
bus, vt in primis quidem sensus periret sequē-
tibus verò deinde diebus, emortui pedes pu-
trescerent. Ergo vt perfectā refrigeratio, &
sensum penitus aufert & motum, sic mode-
rator, & sensus & motus difficultatem indu-
cit. 10

Paulus cit. Nominaturque (vt dixi) huiusmodi refri-
libro. 2. geratio, stupor. Itaque stupidum dolorē dis-
cap. 39. positio efficit frigida simul & dolorifica: in-
dicante id nomine, non doloris (vt dixi) dif-
ferentiam, sed dolorem simul, & frigidā dis-
positionem, aut ab ipsa inductam particulæ,
& sensus, & motus difficultatem. Constat au-

Torpedo. tem quòd constrictas vehemēter particulas,
4. de sym atque eos quoque, qui torpedinem animal,
pto. caus. dum adhuc viuit, tetigerint stupor infestare 20
solet. Et quibus membrū aliquod stupidum
fuerit, ii quicquid tetigerint, obscuro, & he-
beti sensu percipiunt, neque moueri possunt,
si verò moueri cogātur, dolent. At citra hoc
quòd moueri tentēt, affectum ipsum stupo-
ris haud obscurè sentiunt, sed tum nequaquā
dolent. Proinde male Archigenes enūtiavit,
stupidum dolorem ad neruos propriè perti-
nere. Stupor enim dispositionis, nō loci affe-

cti

Et indicium est. Atqui paulo post rursus Ar-
 chigenes propriè ipsum ad musculos perti- *Malè hic*
 nere ait, habet autem dictio vtraque adhuc *quoq; Ar-*
 modum: prior quidem, Nerui autem cōtor *chige. ad*
 ti, distenduntur, & indurantur, atque hi stu- *musculos*
 pidos inducunt dolores, atque dure inten- *nō dispo-*
 » dentes. Deinde paulo post, in hunc sermo- *sitionem*
 » nem prorumpit, Musculi carnis neruorumq; *stuporem*
 » mixtura, tanquam propria substantia consti- *retulit.*
 10 tuti, arteriarum quoq; in doloribus mixtio
 » nem præ se ferūt, stringentes (vt ita dixeris)
 » atq; latè distenti, ac stupidè pulsantes. In ho-
 » rum sermonum priore neruos ait stupidos
 » inferre dolores. In altero verò musculos stu-
 pide pulsare: stupidum non ad affectus, sed
 ad partes, referens. Sed vt dicebā: stupor non
 particulæ cuiuspiam proprius affectus est,
 sed dispositio: quæ quidem in omnibus cor-
 poribus fieri potest, sed non in omnibus sen-
 20 sibiliter apparere, quippe in his duntaxat ap-
 paret, quæ suos affectus sentire, & pro volun-
 tatis imperio moueri nata sunt. Cæterū his,
 quæ manifestè in musculis apparent sermo
 ipsius repugnat: quinetiam indistinctè prola-
 tus est, ac fortasse non intelligit, nusquam in
 corpore carnem ipsam per se inueniri. Nam Musculo-
 musculi quidē in plurimis vel capitibus, vel *rum com-*
 extremis partibus neruosi sunt, vbi etiam tē- *positio.*
 dones inueniuntur. Id verò quod in medio
 con

Caro. continetur, omnes homines carnem nominant, nemine intelligente, quā exquisitè dissectatur, non esse solam carnē, sed cū tenuissimis quibusdam veluti fibris, in quas nervo

Fibræ. sum genus resolutū est. Voco autem nervo

Vincula. sum genus, in vnicam appellationē cogens,

Tēdones. tum vincula, tum tēdones. quippe ex iis per carnem dispersis, musculorum ostendimus essentiam consistere: quæ ut permanere pos-

Arteriæ set, venis indigebat & arteriis. Caterūm ci- 10

pulsant tra dolorē pulsare, ad solas arterias pertinet,

sine dolo animali etiam dū bene valēte. Vbi verò in-

re. gēs oborta est inflāmatio, vel erysipelas, vel

Dolor ab abscessus, arteriarum pulsum cum dolore

inflāma- sentimus, quum antea per bonam valetudi-

tiōne. nem, neque cum dolore, neque sine dolore

ipsum sentiremus. Etenim res ad hunc mo-

dum se habet. Duabus præcipuè occasiōi-

bns, vehemens dolor inflammatis partibus

infertur: quum mouentur, aut quum à re 20

Inflāma- quapiam comprimuntur. Inflāmato igitur

tus mu- omnino musculo, duplici modo, dum attol-

sculus. luntur arteriæ, dolorē sentimus. Nā & mo-

uentur, & ab adiacente carne cōprimuntur,

Pulsus. & ipsam comprimunt. Atq; hac ratione par-

tes inflāmata pulsant, quem veterrimi qui-

que solum vocant pulsum: Posteriores verò

omnem arteriarum motum, quē sensus per-

cipere posset, similiter nominauerunt. Sed

non

non protinus stupidè pulsare, inseparabili-
 ter, aut omnino propriè, ad musculos [affe-
 ctos] pertinet: quū ne pulsare quidem pro-
 prium eorum omnino sit: si quidem pulsus
 (vt prius dictum est) dolorē quendam infi-
 nuat. Nam in scirrhis, & œdematis, proprie *Oī Anna*
 appellatis, atq; in intēperiebus, quæ sine tu- *enim a-*
 more cōsistunt, motus arteriarum dolorem *puḍ Hipp*
 haudquaquam excitat. Ac ne per inflāmatos *& vete-*
 affectus quidem, nisi quum maiores affecti *res omniā*
 sunt, dolor infestat. Quinetiā sine musculo, *tumorem*
 arteria ipsa per se inflammatorium sustinens *prater na-*
 affectum, cum dolore pulsat. Dico autē in- *turam no-*
 flammatoriū affectum, vt simul cū inflam- *tat.*
 matione, & erysipelas, & abscessus intelliga *Inflāma-*
 tur. Huiusmodi igitur affectuū, quū maio- *torius af-*
 res fuerint, pulsus accidēs esse cēsetur. Quod *fectus.*
 si aliquādo in iis pulsus, ipsi scilicet laboran-
 ti, stupidus esse videatur (hic enim stuporis
 affectum sentire potest (tum scire licet dispo-
 sitionem in musculi nervis cōsistere: sed ita
 consistere, vt ad paraly sim) id est resolutio-
 nem) tēdant. Quippe stuporis dispositio, in- *Paralyfis,*
 ter resolutionē, & integrā valetudinē me- *resolutio.*
 dia est. At pulsus cum dolore factus, sequi-
 tur inflammatorios affectu notatus dignos,
 idq; semper in ipsis arteriis, atque in conti-
 nentibus ipsas partibus, quas & ob angustia
 premunt, & quum attolluntur, modo pars
 affecta

Peripneumonia. affecta sentire nata sit, veluti percutiunt. *Er*
Pleuritis. go neque in peripneumonia, neque in pleu-
ritide dolor pulsatorius euenire potest, idq;
Alias ossibus. ob partium naturam. Namq; pulmo sensum
 non habet, pleuritis verò membranæ costas

succingentis, morbus est: quæ vbi costis qui-
 dem vicina est, necessariò comprimitur. At
 media ipsius pars comprimi non potest, sed

Media inflammationis duntaxat ratione dolet. At-
pars qua que in hoc spacio arteriæ sunt: quæ per in- *10*
musculis tercostalia vocata spacia, & per crassas, laxas-
interco- que laterû partes extenduntur, ac in profun-
stilib. as- do magis delitescunt, & succingentem costas
sedit non tunicam haudquaquam attingunt. Harum
costis. igitur arteriarû motus in pleuritide ab ægro

tante, sensu non percipitur, tantum abest vt
 ei dolorem inferat. Nam inflammatis inter-
 dum intercostalibus musculis arteriarum ele-
 uatione dolorem inferre necesse est. proin-
 de laborans, ipsum facile percipiet atque pro *20*
 inflammationis magnitudine, sentiet in par-
 te inflammata pulsationem. Ob hanc quo-
 que causam vbi vehemens fuerit pulsatio, sup-
 puratur inflammata particula, consequente
 suppuratione ingentes duntaxat inflamma-
 tiones. Constat igitur ex his quæ iam dixi-

Pulsato- mus, quòd pulsatorius siue pulsatiuus, à Me-
rius do- dicis vocatus dolor, per inflammatorios affe-
lor. ctus fiat, atq; in corporibus sensibilibus: idq;
 vel

vel per se, vel propriè, vel primario affectu
 in arteriis (nominet enim quilibet vt volue-
 rit) in reliquis verò partibus sensibilibus o-
 mnibus, per consensum, eo quòd à vicinorù
 contactu premantur. Quare neq; in hepate,
 neque in renibus vnquam huiusmodi pul-
 satio apparet: quoniam nullus per totù cor-
 pus ipsorum neruus dispersus est, neq; etiam
 per pulmonem. Quocirca grauitas in ipsis
 10 sentitur, quum tumoris præter naturam ge-
 nus aliquod, ea infestauerit. Nam in horum
 viscerum quolibet, adiacens membrana per
 quã neruus dispergitur, sensu potitur. Quia
 verò à tumore qui est in viscere, ipsa extēdi-
 tur, doloris speciem appellatione dotauit.
 Proinde Hippocrates primus omnium scri- Hippocr.
 pfit: In renem dolor grauis. Post hūc verò libr. epid.
 optimorum Medicorum nō pauci, nō acuti 6. par. 1.
 doloris, sed grauitatis sensum in prædictorū
 20 viscerum inflammationibus fieri dixerunt.
 Enim verò membranas vt quibus nullę sunt
 arteriæ, non pulsare rationi consentaneum
 est, quemadmodum neq; cutem, etiam si ve-
 hemens asit inflammatio: atque eādē ra-
 tiones, neque adenes, quibus nullæ sunt arte-
 riæ. Etenim huiusmodi partes, quum inflā-
 matae sunt, vnico dūtaxat doloris modo ve-
 xantur, extēsiōis. Quippe huiusmodi do- Extēsiōis
 loris species, à nullo sentientium corporum, dolor.

E

in inflammatoriis dispositionibus separari potest. Reliquæ verò doloris species, quibusdam partibus accidere possunt, quibusdam non possunt. Igitur meminisse eorū semper oportet, ac cognoscere singulorum locorū naturam: quin etiam intueri, quis unicuique *Doloris* parti modus doloris peculiariter conveniat, *modi.* quis verò contra. Proinde resumentes rursus ipsos dicamus. Quippe unus doloris modus est, qui per inæqualem intemperie in affecta ¹⁰ parte consistit, ut nulla re ipsam extrinsecus attingente. Alius qui ob tensionem fit, non solum affectæ parti proprius, ut qui vicinas partes interdum afficiat. Est item dolor qui à tangentibus dūtaxat, in affecta particula generatur, quum videlicet vel compressa, vel contusa, vel à re quapiam superueniente vulnerata dolet. Atque is doloris modus, qui à motu procedit, quemadmodum paulò ante de arteria dictum est, à re quadā media do- ²⁰ lorem efficiencie pendet, etenim quæ per se mouetur pars, tenditur: & ad vicinas accedens comprimitur interim, & contunditur, & vulneratur. Si verò nulli inciderit, eam sola tensione, dolere necesse est. Veluti partes omnes ab aliis motæ, si nihil extrinsecus ipsas tangat, nullo, præter eum qui necessarius est, dolore afficiuntur. Cæterum alibi me frequenter dixisse memini, primas doloris species

species duas esse: quum affatim temperies al- *vt libr. de*
 teratur, atque quum soluitur continuitas. *Que inæquali*
 cum iam dictis haudquaquam pugnare vi- *intemperie,*
 dentur. Nanque pars intenta, aut compressa, *et libro de*
 aut contusa, aut vulnerata, dolet ob conti- *sympt. 4.*
 nuitatis solutionem. Neque enim quum acu *et libr. de*
 quispiam vulneratur, alio affectu laborat, *q̄ victu a-*
 si ab acri humore facta fuisset erosio, vtpo- *cut. cō. I.*
 te per vtrunque affectum corrupta cōtinuita-
 te. Igitur non eandem doloris speciem exci-
 tant, mordax humor, & plurimus. Nam ille
 rodendo dolorem excitat, hic verò tenden-
 do, flatuosis spiritus exemplo, ac veluti vrina
 vesicam intendit quum nō redditur. Verum
 in erysipelate, & inflammatione, atq; in to-
 tum in affectibus inflammatoriis, nō solum
 quia intentæ sunt [ob repletionem] partes la-
 borant, verum etiam quia intemperie affectæ
 sunt, ac ne hac quidem exiguam, ad dolorē
 inducendum, vim habente. Id quod decla-
 rant hi, qui per vehementem hyemem profe-
 cti, manus ad ignem affatim calefacere ten-
 tant: intolerabilem nimirum sentiunt dolo-
 rem, & quidem maximè in vnguium radice.
 Porro nemini, mihi ipsi accidisse dolorē ve- *Galenī co-*
 hementissimum, vt mihi viderer in intimo *lica.*
 vtre terebro perforari, in eo potissimū spa-
 tio, per quod à renibus ad vesicam vieteras
 scimus extēdi. Iniecto deinde rutaceo oleo,

quum id paulò pòst excernere tentarem, ex-
 creui simul grauissimò cū dolore, humore
Vitreus vitreum à Praxagora appellatū, quippe vi-
humor. tro fuso, tum colore, tū substantia, haud ab-
 similis erat: atq; id aliis quoq; accidere cōspe-
 xi. Quòd verò hic tumor sit frigidissimus,
 iam à Praxagora dictum est, qui ob hoc vi-
 treī nomen ipsi imposuit. Id enim haud ob-
 scurè percipitur sensu tactus tum ipsoꝝ qui
 illum excernunt, tum alioꝝ si quis conse- 10
 ftim ipsum tāgere voluerit. Sed dignū vtiq;
 admiratione est, quomodo frigidus excide-
 re possit, neq; ab excretionis violentia quū
Galenus excidit, calidus euadat. Equidem putabā la-
deceptus. pidem in altero vreterum impactum, adeò
 erat, vt mihi videbatur, doloris ipsius species
 perforanti similis. Atqui vacuato humore,
 doloreq; sedato manifestè constabat, neq;
 lapidem fuisse causam, neque in vreteris, aut
 renibus, locum fuisse affectum, sed in intesti 20
 nis potius, præcipuè verò crassioribus. Neq;
 enim vt à tenui corpore, breui temporis spa-
 tio exire poterat, sed à profundo quodā &
 quidem crassiori corpore, quàm sit tenuium
 intestinorum tunica, ferebatur. Huiusmodi
Dolores dolores, omnes ferè medici colicos nomi-
colici. nare videntur, quanquam ab ea parte qua
 dolor sentitur, nullum indicium sumi po-
 test, quòd magis colon quàm tenue intesti-
 num

num dolor afficiat. Nam huiusmodi dolores, perinde ac si terebro partes perforentur, molestare solēt, narrātibus ita infirmis. Sunt alij dolores per quos palus videtur infixus, qui & ipsi corpus affectum crassum motu esse significant. differunt autem inter se, aut *Differen-* multitudine, aut crassitudine, aut motu, aut *tia doloris* rei dolorem faciētis potentiā siue ea humor *quadrifa-* fuerit, siue spiritus flatuosus. quippe paucus *ria sumi-* plurimo, & tenuis crassio, & permanens mo- *tur.* to, minorem dolorem excitare solet. Atque qui ad vehementem refrigerādi vim haudquaquam accedit, vehementissimè refrigerante minus cruciat. Verū hoc doloris genus, ad crassum intestinum referendum est, siue palum ibi infixum, siue terebro perforari locum quis putauerit. Atqui huiusmodi dolores, ab eo quo lapis impactus est, discerni nō possunt, nisi quis accidētia quæ post- *Lapidis re-* ea consequuntur expectauerit. Quamuis ob *nū, & co-* huiusmodi ignorantiam, quod ad doloris *lica inter-* mitigationem attinet, nullam laboranti no- *ta diagno-* xam inducamus. siquidem vtriusque do- *sis à prin-* loris præsidia, omnia communia sunt, & *cipio.* quidem calorifica in primis, siue ea extrinsecus adhibeantur, siue iniiciantur. Deinde nisi mitigatus dolor fuerit, eorum medicamentorum, quæ dolorem obtundere possunt, aliquod adhibendum est: cuiusmodi est

Philonis id quod à Philone institutum est. Verum si
 Antidotū. lapis dolorem excitauerit, ipse interdum so-
 Nephriti- lus, interdū vnā cum cruore excernitur. et-
 dis notæ. enim radit ea corpora per quæ trāsit, maxi-
 Vrina mē si vel asper, vel acutus fuerit lapis, ac si
 cruenta. postea vrinās inspexeris, fabulosa quædam
 Colica si- subidere inuenies. Quod si in colo affectus
 gna. constiterit, neque lapis, neq; cruor, neq; are-
 na, sed humor aliquis, qualis iam dictus est,
 subidere videtur. Atq; alia quæ ad affectū 10
 intestinū pertinent, apparēt accidentia. Pro-
 tinus enim inflatio quædā, & distētio, & fla-
 tus complures† præsertim postmodū, & tor-
 mina, & excrementa flatibus plena videbun-
 tur. Ea autem discernere licet, si super aqua
 natent, ac bubulo stercorei simulentur, quin
 etiam cibi tum cupiditas tum cōcoctio dete-
 rior, tum quæ præcedit morbū, tum quæ co-
 mitatum quæque cōsequitur, propter cōsen-
 sum ventriculi: qui simul cū ea parte quæ pri- 20
 mariò laborat afficitur. Insuper colicos no-
 minatos affectus, magna ex parte præcedit
 & cruditas & spiritus flatuosus, & vomitus,
 & nausea quæ multò tempore inanis perma-
 net, & in præcordiis mordacitas, &† fastidiū,
 & indigentia plurima. Igitur ex huiusmodi
 quibus quidem doloribus, ij qui vehementissimi
 sunt, haud ab re in crassis intestinis cōsistere
 putantur: qui verò mitiores sunt, ex duobus
 alterum

stidium cibi, quàm quod implacide & inconstanter habet,
omnemq; figuram corporis subinde variant, ut modo in
dextrum latus, modo in sinistrum decumbant, ac proinus
in dorsū,

alterum necessariū est: aut quòd in his ipsis aut ven-
sunt, sed à leuiori causa: aut q̄ in tenuibus trē iaceāt,
consistant intestinis, sed qui mordaces sunt, quod &
à mordaci humore intestinum erodente, sic ēuōtō-
ri solent. Vnde dysenteriam semper huius-
modi dolores præcedunt: utpote per quam & dūq̄
intestina exulcerantur, quam vel solam, tum siq̄ vo-
recentiores Medici, tū antiquorū non pau-
cant.

Ex his nonnulli
solum hanc, sed aliam quoque quæ cruen-
ta, ob excretorum speciem nominatur, dy-
senteriam appellant. Nam interdum synce-
rus plurimusq; sanguis, interdum veluti li-
mus & faeces ipsius non parue quantitatis
excernitur. Verum hæc affecti iecinoris acci-
dens esse censetur. Ea verò per quam synce-
rus multusq; sanguis excernitur, vniuersum
corpus plerunque euacuat, haud secus quàm
hæmorrhoides, aut muliebri profluuiū. Ve-
rùm de his posthac rursus nobis agere lice-
bit. Nunc ad dolorem species redire oportet,
eas enim in hoc libro persequi potissi-
mum proposuimus. Igitur iterum incipia-
mus ab eo dolore quem punctoriū vocant,
qui circa membranas potissimum consistit

Sanguis à
toto corpo-
re.

Hæmor-
rhoides.

Menstrua.

ipſius affectus veluti radice eo loco fixa, vbi membrana pungitur: dolore verò circa locum punctum, ad magnum ſpatium circulatim ſe fundente: atq; hoc modo in laterali

Dolor pun morbo dolorem punctoriũ eſſe, & in infla-
torius. matione pulſatiuum, apud omnes ferè medi-

Pulſati- cos in conſeſſo eſt. Non tamen hæmodiæ,
uus dolor. id eſt, dentiũ ſtupori, ſimile quid dolor mē-

Hæmodia branoforum corporũ habet (vt Archigenes
Stupor dē ſcripſit.) haud enim ignoramus ori dūtaxat,¹⁰

tuum. neq; toti tamen ori, eā accidere: ſed dentes,
gingiuasq; infeſtare ſolet affectus quidam,

quem hæmodiā vocamus, hāc verò oratio-
ne quidem enarrare impoſſibile eſt, ſed cū

quiſpiam & auſteros, & acidos cibos ingeſſe
rit, ita vt affectus aliqui ſequatur in dētibus,

& gingiuis, eū in omnibus eundem eſſe cre-
dimus, ſiquidē videmus nos magna ex parte

ſimiles eſſe in affectibus tolerandis, ita vt ab
iisdem cauſis, eadem ſuſtineamus. Talē qui-²⁰

dem dolorem in ore duntaxat fieri ſcimus.
Sunt alia dolorum genera ab Archigene

perſcripta, quæ neque dum ſunt cognoſci,
neque dum proferuntur intelligi poſſunt,

† *Gracè eſt* neque dum proferuntur intelligi poſſunt,
ἀγκύλον. veluti holciminos (id eſt tractorius.) auſterus,

Copus vi- dulcis, leuiter acutus, † ſaliſus viſcoſus, ferus,
deur le- ſtringens. Atque huiuſmodi nomina in li-

giſſe ἀλι- bro de Pulſibus ſcripta poſteritati reliquit,
κόν. quæ auditores nihilo doctiores reddere poſ-

ſunt,

sunt, eo quòd doctrina quęque propria desyderat nomina. Si enim de saporibus, aut o- *Nomina*
mninò de propriis quę lingua iudicantur dis *dolorum.*
feramus, dicemus utiq; austerum, & acerbū,
& stringentem, & mordacem, & falsum, &
dulcem, & amarum. Si verò de his quę tactu
iudicantur, humidum corpus, & aridum, &
calidum, & frigidum, & asperum, & leue, &
molle, & durum, & acutum, & obtusum.

- 10 Haud secus de his quę visu discernuntur, ru-
brum, flauum, nigrum, album, fuscum, aut
aliud quidpiā huiusmodi. Quòd si appella-
tiones ipsorum permutaueris, quid dicas au-
ditorum intelliget nemo, veluti de adstrin-
gente, aut austero dolore. quippe fieri non
potest: ut quid sit dulcis dolor, intelligatur.
Nā dolor semper molestare laborantem so-
let, atqui dulcia quęque iucunda sunt. Igitur
quam verissimū est, Archigenem circa medi-
cæ artis opera fuisse studiosum: quo pacto
20 tamen in huiusmodi nomina inciderit, quū
sæpenumero inuestigauerim, inuenire non
potui: Videamus ergo quid manifestè ex
ipsis colligere possimus, veluti paulò antè de
torpido labore iam fecisse videmur. Nam
iustū est ut obscura nomina in dubio dereli-
cta, inutilia reputētur, perinde ac si nūquam
scripta fuissent. Quę verò clara sunt, iudicē-
tur nō ratione dūtaxat, sed multò etiā præ-

E 5

Ineffabile cedente experimento, quāquam huiusmodi iudiciū perdifficile est. nā plerunq; aliis nos credere oportet, qui suos affectus ob animi mollitiem, neq; cōsequi planè, neq; si consequantur, eos enarrare possunt: aut quia oratione quid patiantur: declarare omninò nequeunt (quippe non paruae facultatis ea res existimatur) aut quia affectus ipse ineffabilis est. Ergo relinquitur, quòd nemo singulorum dolorum species cōscribere potest, nisi 10 ipsemet passus fuerit, sitq; Medicus, qui interpretādi aliis facultatē habeat, & qui prudēter, & sine mollitie, cōprehēdere possit suos affectus, dum laborat. Atqui nemo inuētus est qui per totū aetatis suae decursum, omnes affectus sustinuerit, etiā si perquā morbosus fuerit. Proinde nō possum nō mirari, quum eorum proprietates ab Archigene scriptas lego, ita scilicet ipso narrante, tāquam omnes passus fuisset quanquam non admodū mor- 20 bosus erat Archigenes. Si enim vnā aliquā partem, & infirmam, & morbidam habuit, nō protinus omnibus laborauit: veluti nec reliquorum mortaliū vllus. Neq; enim inuenire est hominem eundem, qui simul & caput habeat infirmum, & thoracē, & pulmonem, & hepar, & lienem, & vētriculū, & intestinum ieiunum, & colum, & vesicā, atq; reliquas id genus partes. Videtur itaq; Archi-
genes

genes propriis quibusdam consiliis, & quidem dialecticis potius, quàm affectuū ipsorum experiētiā fulcitus, pro viribus dolorum species explicare voluisse.

Quid ea quæ ab Archigene dicta sunt, aliqua verè, & absolutè, & clarè: alia omnino obscurè, imperfectè, indistinctè, & falsò dicta sunt.

CAPVT II.

- 10 **V**Erùm vt studiosi maiori à nobis copia dotati recedāt, propofita eius oratione, eos qui in arte exercitantur, moneo & hortor, vt quæ planè vera sunt, ea duntaxat eligant, ipsisq; credant: quæ verò ab iis abhorre videbuntur, ea præteriri oportet.
- Igitur Archigenes quū reprehendisset Asclepiadem dicentem in articulari morbo neruum affectum, dolore haudquaquam cruciari, quod nihil omnino sentiat: carnem autem, quanquam non affectam, dolere tamē, utpote à parte vicina compressam. Postea ad verbum ita scribit: Porro vasa vehementer compressa, capitis dolores sine inflammatione obortos arcent, veluti prohibita in ipsa incursione, id quod barbaricum vinculum tum maximè perficere potest. Sphacelodes verò altera capitis parte dolores dissectio eorum, sed maximè arteriæ circumscribit. Quæ primò affecta, pulsatorium
- Archigene-
nes.
Βασβασπ-
κός δια-
σπομδς.
Nā in re-
mediis ce-
phalal-
gias vin-
cula sunt
inducta
fronti &
tēporibus.
pene

penetrantemq; dolorem inducit, ac rotundā “
 euadit, horrorē planē excitās, quemadmodū “
 venæ quædā in varices degenerāt. Nerui ve “
 rō intorti distendūtur, ac indurantur, atque “
 hi torpentes inferūt dolores, dura distentio- “
 ne cruciātes, & profundos, & infixos, & an- “
 gustiæ plenos, & minimē fufos. Membranæ “
 in latum discurrentes, & inæquales dolores “
 excitant, atq; crebro ita laborant, vt hemo- “
 diæ, (id est dentium stupori) simile quidpiā 10
 habeant, trāsmiffionis videlicet asperitatem. “
 Ita superficies quoque & membranæ in me- “
 dia carne contentæ, quæ dilaniantes quoq; “
 dolores inferunt. Dolores verò à membra- “
 nis ossa circundantibus dependentes, perin- “
 de affligere comperiuntur, ac si in ossibus “
 † Καθ' ἑαυ- ipsis confisterent: A venis, graues & † descen- “
 † καὶ τῶν 20 dentibus, & æqualiter infixi dolores suscitā- “
 tur. A carne autem, & fusi & laxiores, qua- “
 propter non adeò extendi videntur, sed ar- 20
 bitratur laborans sensum asperis quibusdam “
 rebus impleri. Musculi carnis neruorum quæ “
 mixtura tanquam propria substantia consti- “
 tuti, arteriarum quoq; in doloribus mixtio- “
 nem præseferunt, stringentes (vt ita dixe- “
 ris) & cum capaci latitudine intenti & torpi- “
 dē salientes. Ex reliquis verò vlcerosus qui- “
 dem dolor, & in vlceribus leuiter acutus, “
 & maximē dulcis, & qui pruriginem indu- “
 cere

» cere potest, ad superficiē pertinere videtur.
 » Punctorius autem profundas partes infestat:
 » infixus autē, cum sinus accesserit. Stimulans
 » autem, partim eorum quæ in loco sunt, ali-
 » quid affectū esse declarat, partim contra, vt.
 » pote qui haudquaquā profundas partes oc-
 » cupat. Lacerans autē est, qui in sinu cōsistit.

Hic est primus Archigenis sermo ex libro
 primo de Locis affectis, quo docere cona-
 10 tur quomodo ex dolorū differentiis partes
 affectæ possint inueniri. Igitur rursus ab ini-
 tio ipsum examinemus, nō obiter & trascur-
 sim. Sphacelodes (inquit) hemicranias, va-
 forū dissectio intercipit. Igitur quos dolo-
 res nominet sphacelodes, inuentu difficile
 est. nō enim inter omnes cōuenit, quid hæc *Sphacelos.*
 vox (sphacelos) significet. Sunt enim qui di- *Vide Gal.*
 cūt ipsam vehementē dolorē declarare, alij *libro 7.*
 tantum inflammationis excessum: vt partē ad *aph. 51.*
 20 corruptionis periculū inducat, quæ dispo si-
 tio à nōnullis gāgrena appellatur. Alij par- *Gāgrena.*
 tis affectæ corruptionem ipsam, sphacelon
 dici volunt, Alij conuulsionē, Nōnulli non
 eam quæ sit conuulsionem, sed quæ ex in-
 flammationis magnitudine expectatur, Alij
 non simpliciter cōuulsionem, sed neruoso-
 rum corporum quæ inflammatione labo-
 rant, Alij simpliciter fortem tentionem, alij
 putredinem. Ergo vocabulum sphacelodes,

Circūscribere.

in iam proposita Archigenis oratione scriptum, ad tantam peruenit obscuritatem, vt nihil per ipsum explicari posse videatur, ipso nusquam in aliis libris Medicorum nominū enarrationem conscribente. Per verbum autem circūscribit, fortasse intelliget quispiā ab eo, veluti celeriter & ex toto sanari: ac subiiciamus vt ita dicatur. Nam quid facere poterit is, qui intelligere cupit ea, quæ ne is quidem qui scripsit, intelligi voluit? Deinde 10
 pulsatorium, & turgidum dolorem, arterias inferre dicit, cum ipsæ videlicet per sphacelo des altera capitis parte dolores primogenia affectione laborant. In primis itaque qualis
Pulsatus dolor. sit pulsatorius dolor enarrare tentemus, quamuis ante nostrā enarrationem, omnibus medicis notus sit: siquidem ingentium inflammationum accidens ipsum esse perhibent. Pertendens autem dolor est, qui à parte 20
Dolor pertendens. primario affecta, veluti à radice incipiens, celeriter in partes adiacentes transfertur. Id verò non solum in hemicrania vehementissima, vt Archigeni placuit, sed in cephalæa quoq; vocata, euenire solet. Etenim in hac nonnunquam arteriæ primario affectæ huiusmodi (qualem dixit Archigenes) dolore vexantur. Ita vt fateantur nonnulli, vasorum ipsorum se dolorem sentire, id interpretari tentans, arteriam subhorrentem, 21
 fieri

feri rotundam dixit. Igitur inquirendū est,
vtrū veluti per sphacelodes hemicranias, ar-
terias ita affici dicit, ad eūdē modum de ve-
nis eum sensisse existimandum sit, quòd per
hunc solum morbum, varicum exēplo ob-
tortæ sint, an commune sit accidēs venarū,
vel quomodolibet affectarū, vel duntaxat
inflammatarum. Ex eo enim quòd sermoni
de venis, iungit sermonem de arteriis: par
10 est, vt coniiciamus, de eodem affectu ipsum
fuisse loquutū. Ex eo autem quod mox in
vniuersum de neruis, atque de aliis huiusmo-
di partibus scribit, non adaptans vni mor-
bo sermonem, eadem ratione putandum
est, itidem de venis quoque fuisse dictum.
Itaque in hac ambiguitate satius fuerit, vt
existinemus in eo sermone quem de hemi-
crania conscripsit, simul cum arteriis, ipsum
venarum quoque mentionem fecisse, sim-
20 pliciter verò reliquorum instrumentorum
sine vllō distincto affectu, neque in neruis,
neque in iis partibus, quæ illos deinceps con-
sequuntur, in quibus dixit venas graues, ac
detrahentes, atque æqualiter informatos
dolores inferre. Verūm hæ non nihil ambi-
guitatis continent. Quòd verò deinceps se-
quitur, vbi dicit: Nerui verò distendūtur, &
manifestè contorti indurantur, recedit enim
ab hemicranica dispositione, definiens id,
in

in vniuersum ad nervos quomodolibet affectos pertinere, quod planè mendacium est. Neq; enim quilibet nervorū affectus, ipso-
rum essentiā indurat, atque intorquet. Sunt enim nōnulli, per quos laxiores euadūt nervi quemadmodū per atrophiam manifestè. Quinetiā saepenumero nullam sensu perceptibilem habent differentiā, ita vt exquisitè sani videantur, nihilominus neque sensum neque motū præstant subiectis corporibus. 10
Itaque in solis fortasse inflātionibus, aut inflammatoriis morbis, aut præter naturam tumoribus, dixit nervos & indurari, & intorqueri, quādo quidē in iis quidem manifestè apparet nervos intēdi. Nam & laborātibus ipsis, & nobis aspicientibus, intēti nervi apparent quapropter nisi curentur, & cōuulsiones & distensiones ad ipsos sequuntur. Atq;
omnium quæ in tumore attolluntur, commune accidens esse videtur vt intendantur. 20
Nam & arterias, & venas, inflātionē affectas manifestè intēdi vidimus: venas quidem, vbi per summa membra orta inflammatione, bubon exurgit. Plerunq; etiā totum vas intentū videtur, ac ruber magis, & calere, atq; maiori dolore (si tangatur) affectum, vt sit manifestum totum inflammari, incipiēdo ab ea parte quæ primario affecta est, vsque ad alas, & inguina. Proinde recte dixit

*Tensio cō-
mune sym-
ptoma eo-
rum quæ
extume-
scunt.*

dixerunt omnes ferè medici, inflammatis *Inflama-*
 partibus: accidit vterubescant, tendantur, re- *tionis ac-*
 nitantur, intumescant, & doleant. Verū (vt *cidentia.*
 diximus) non omnibus, sed his duntaxat ac-
 cidit pulsus, quæ arterias habent notatu di-
 gnas, & partem sensu præditā, aut vbi ad no-
 tabilem magnitudinem inflammatio attolli-
 tur: tunc enim pulsatorium dolorem sentiūt
 laborantes, vel nullo existente sensibili vase
 in affecto corpore. Sed interrogabis me for-
 10 tasse, quæ sint singulorum instrumentorum
 propria accidentia? Id verò iam antea neque
 semel duntaxat explicatū est quod videlicet
 propriæ actionis noxa, qualicūque sit spe-
 cie, cuiuslibet partis proprium est accidens,
 Neque enim aliud eis ex necessitate accidēs,
 neque etiā noxarū differentia existunt. Nā
 differentia quidem variant, pro affectus, tū
 specie, tum magnitudine: Accidentis verò ad
 20 vitiatā actionē pertinentis, siue genus, siue
 species, aut vtcunq; nominare volueris sem-
 per permanet. Cæterum satius fuisset Archi-
 genem, qui omnia, via & ratione se explica-
 turum professus erat, abundantius hæc perse-
 qui, præsertim cū ab aliis negligentius essent
 tradita: quorū non pauca, in plurimis aliis
 libris conscripsimus, quæadmodum & post
 hac deinceps dicentur: sed breuiori quidem
 compendio, ea quæ exactè alibi fuerunt

exarata: lōgiori verò disputatione hic tra-
 ctabuntur ea, quæ alibi breuiori, stylo per-
 currimus. Nunc verò reliquas dolorum dif-
 ferentias, quarum in præscripto sermone
 Archigenes mentionem fecit, persequamur.
 Quod enim peccauerit, dicens torpidos do-
 lores nervis euenire, quodque stupor non
 vnius cuiuspiam partis sit affectus, sed causæ
 potius, ac dispositionis rationem habeat,
 iam antea dictum est. Quod verò dolores ro-
 dure distendentes in ipsis fieri dicit, rectè di-
 ctum est: quanquam melius erat, si simplici-
 ter dixisset, distendentes nō addendo dure.
 Nam neruorū dolores, vtrique vehemen-
 ter distēdere possunt: quia ad vtraque extre-
 ma tenduntur, tum id à quo incipiunt, tum
 illud in quod finiuntur. Nō secus quàm chor-
 dæ in cithara quæ sæpenumero, vbi nimis
 intenduntur, disrūpi solēt. Quapropter ci-
 tharistæ, quum instrumenta sua post vsum 2a
 reponere voluerint, chordas relaxant. Nam
 Nervorū distentio. planè constat eas à cōtrariis, tum causis, tum
 dispositionibus intendi, siue humidus fuerit
 ambiens aër, vt rigare, ipsas & implere pos-
 sit, siue vehementer aridus: ab vtraque enim
 ambientis aëris temperie, ad vltimam tēfio-
 nem perueniunt, vnde nō mirum, si rumpā-
 Hippoc. libr. 6. a- tur. Proinde rectè dixit Hippocrates neruo-
 phor. 39. rum conuulsiones & à plenitudine & ab
 in

inanitione euenire vtpote per quas nerui im-
modicè scilicet tenduntur. Sed quod profun-
dos dixit esse dolores, id ab accidentibus,
quæ plurimis ex neruis eueniunt, sumptū est. *Dolor pro-*
Etenim quum venæ quidem semper prio- *fundus.*
res in superficie sint, deinde post eas arteriæ,
quibus postea nerui subduntur, ideo labo-
rantes tensionem in imo sentiunt: quāquam *Ordo ve-*
multi tendones (qui ob id, quod neruosa *forum.*

- 1.0 sunt corpora, à nonnullis plane nerui nomi-
nātur) non profundos, sed in superficie do-
lores habent, si quando ipsos quoque sic in-
tendi contigerit, vt sunt illi qui digitos ex-
tendunt, sunt autem & qui illos incuruant:
in superficie quidem, sed non similiter vt ex-
tendentes. Porro Archigenes neruorum do-
lores infixos esse dicit, quum huiusmodi do- *Dolor in-*
loris species, vt antea diximus, ad colon ma- *fibulatus.*
gis pertineat. Atque accidit etiam auri, cum *Archige-*
2.0 quadam pulsatione, atque dentibus molari-
bus, quinetiam oculis, sed infixus dolor ner-
uis minime euenire potest: etenim magna
ex parte vtroque extenduntur, & ad super-
nas, & inferiores animantis partes. Quod
verò deinceps ab Archigene dictum est,
neruos, angustia plenos habere dolores, in- *Dolor an-*
apte quidem dictum est. Nam nihil amplius *gustie*
declarat, quàm quū dicit & minimè fufos: *plenus.*
re vera enim minime fufos idē est, quod in-

latitudine porrectos dolores nervi non habent, sed magis quodāmodo circūscriptos, vtpote perueniente ipsorum tensione, & ad supernas, & ad inferiores partes, magis verò sursum vsque ad caput. Ac tum primū ipsos vniuersi corporis, & conuulsiones, & distē-
tiones comitantur, nulla nervi tentione hu-
iusmodi accidentium aliquod inducere po-
tēte, antea quā caput ipsum attingat. Post
hæc consequēter scripsit Archigenes de mē-
branis, quod in latitudinē perueniāt ipsis do-

Dolor cir lores quum afficiuntur, quod quidem verū
ca mem- esse fatemur: quòd verò aliquid hæmodiæ
branas. (id est dentium stupori) simile habeant, nō
est verum, vt antea dictum est. Neque etiam
in totum verum est, quòd membranarū do-
lores sint inæquales: si quidem contrarium
magis veritati consonat: quippe ex propria
ratione, videntur æquales inducere dolores,
eo quod vniuersum ipsarum corpus, æquale
est. Nam q̄ ob communicationem cum vi-
cinis, inæqualitatem quandam afferunt, id
interdum per accidens euenire solet. Quum
enim ad affectam ipsarum partem, circun-
cētes & ducuntur & tenduntur, dissimilem
fieri dolorem necesse est. Vbi enim intenta
particula acutiori sensu est, ibi dolore vehe-
mentiore cruciātur. Vbi verò sensum habet
hebetiorē, ibi minus dolēt. Atq; ex eo quo-
que

que quòd quæ tēditur membrana, os ipsum
vel attingit, vel nō attingit, nō ab re dolo-
rum differentia deprehēditur. Atque hac ra-
tione nonnulli pleuriticorū, iugulum do-
lent, porrecta in hūc locum membrana co- *Pleuri-*
stas succingente. Aliquando tamen nō ad iu *tici.*
gulum, sed ad præcordia dolor trāsit, perce-
pto ipsius sensu in septo transuerso, (vtpote
quod necessariò mouetur, quum pleuritici
10 respirant) magis, quam in cæteris thoracis
partibus. Quū enim veluti radix doloris in
latere cōsistit, tum laborantes, musculis qui
illic sunt, respirare pigritant: quare tum soli
septo transuerso, natura respirationis offi-
ciū cōmittit: quemadmodū in bene valen-
tibus, qui libera vtuntur respiratione, con-
tingere solet. Igitur quum in partibus late-
rum infernis, oritur inflāmatio, septum trās-
uersum intentum, magis dolet: quum verò
10 in partibus supèrnis, tum iugulum potius
dolor infestat. Cæterum septum transuer-
sum, quia mouetur: iugulum autem quia du-
rum est, dolorem efficit. Vbi verò ingens in
hepate oritur inflammatio, aut vbi ipsum
induratum est, dolor qui tum iugulum in
dextra parte infestat, concauæ venæ magis, *Videtur*
quàm membranarum tentionem sequitur. *hæc etiam*
Quum autem dixit, hoc modo sapenume- *Gal. sen-*
ro superficiē quoque separatim dolere, pla- *tentia.*

Quum autem dixit hoc modo sæpenumero superficiem quæque separatim dolore, ut in superficie qualitas atque proprietas doloris membranarum referatur, aperte ostendit unde commotus dixerat, membranas habere dolorem similem hæmodie.

nè declarat id esse, quum membranæ affectum Fallitur quempiam habent. Vnde Archigenes dixit Archige- ipsas, dolores habere hæmodie non dissimiles qui epilepsies. Quia enim simul cum hæmodiæ proprie dermidis rate, stuporis etiam sensus percipitur, perin- 10 et generis de ac si ab eadem causa uterque affectus fiat: membrana- membrana autem quæ in superficie cutis, sub- rum quæ strata est, sæpenumero stupeti dolore afficitur, utpote qui ab externis causis, & quidem intertex- frigidis, celerius noxam subit. Idcirco decetæ sunt eãptus Archigenes dispositionis communitate dem pro- ceteras membranas hæmodiæ simile quid- prietatem piam habere dixit, ac sæpenumero superficiæ doloris quoque, non secundum affectæ particulæ 20 qualitatē essentiam facto dolore sed ob membranarū faciat. ipsarum essentiam, quæ exanguis est, & frigida, quapropter facile à frigidis affectibus infestantur. Quia verò affectum ipsum huiusmodi dolores committantur, idcirco sæpenumero dixit fieri huiusmodi dolores, non veluti per affectæ particulæ essentiā sic enim inseparabiles essent, sed per accidēs superuenientes. Sustrata igitur cuti membrana, quæ cum ipsa simul exoriatur, dolores facit tenuos, &

& torpidos: membranæ verò quæ in media sunt carne, veluti diuellentes dolores excitant. sunt enim plurimæ & inæquabiliter insitæ, atque eam circundantes. Quumque aliquando ex contrariis secundum naturam tendi carnē contigerit, huiusmodi dolores evenire necesse est. Sanè à multis exercitationibus, aut tensui, aut ulcero si proueniunt dolores, qui totos musculos occupare consueverunt, inter quorum partes, carnes quoque numerantur. Verum de huiusmodi doloribus, satis in Salubribus præceptis iam dictum est. Sed quod membranarum quæ ossibus adiacent dolores, & profundi sunt (id est in intimis corpore sensum excitantes) & ossium adiacentium, veluti dolentium, inducunt imaginem, haudquaquam mirandum est. Nam istæ res. *Ostocopi* à quâ plurimis ostocopi (id est ossium labor copiosus) nominantur, & magna ex parte ab exercitationibus evenire solent. quamvis interdum vel à frigore, vel à plenitudine, fieri possint. Insuper venas dixit graves, & detrahentes & æquabiliter infarctos inferre dolores. Vide *Aëtiæ lib. 4. ca. 39.* Verum ab initio, ubi hemicranie mentionem lib. 3. de hoc solo fortasse accipere oportet, ipsum Gal. 3. de hoc dicere. Atqui scire licet proprium arteriæ *sanctæ* veræque dolorem, extensi secundum longitudinem corporis, veluti chordæ cuiusdam

speciem referre, nullavtique grauitate simul
 apparente. Aequabiliter autem infigi vena-
 rum dolores, admodum obscurum est: quip-
 pe infigi, ad nihil quod ipsis accidere solet,
 referri potest. Deinde de carnib⁹ dicit, quòd
 & fusos, & laxiores inducant dolores. Atqui
 in totum nullus dolor laxus est, nisi eos for-
 tasse, qui minus intenduntur, laxiores vocet:
 quoniã & vasorũ, & membranarũ do-
 lores, magis intendi videantur. Id enim con-
 fitetur, eos non adeo extensos conspici, ob
 hoc quòd carneæ musculorũ partes, breu-
 bus lineamentis continentur. Sed id quod
 deinceps scribit, videri tactum, veluti asper-
 tatibus quibusdam plenũ, an propriè ad do-
 lores, qui in carnibus consistunt, pertineat,
 inquirendum est. Nam quòd interdum al-
 quid huiusmodi per ipsarũ dolores eueniat, à
 veritate haudquaquã abhorret. At quia non
 semper euenit, sed facta ab ipsis vt plurimũ,
 certa quadam dispositione, non propriè ad
 substantiam earum referendum, neque sim-
 pliciter intelligendũ est, eam dispositionem
 esse affectum inflammatorium, sed qui cum
 humore fit, exasperare suapte natura potest.
 Porrò deinceps de musculis scribens Archi-
 genes, eos carnis neruorumque mixtã pro-
 prietatem referre dicit, tanquam peculiari
 ipsorum essentia ex his cõsistẽte. Addit re-
 rò

*Dolor la-
xus.*

*Dolor car-
nium.*

*Musculo-
rum com-
positio.*

rō arterias, quoniam in ipsis inueniuntur. At-
 qui hoc pacto, venas quoque dicere debuit,
 atque membranas. Vocabulū autem *†* *Σφύγ-*
γέτες, patrio sermone de his dicitur, qui quā *ῥᾶντες*,
 quam pleni sunt, à bono tamen habitu non *non οφίγ-*
 aberrant, atque idcirco de iunioribus dun- *ῥογες* ver
 taxat dici consuevit; de senibus verò mini- *βῦ* dictis
 mē, quòd non possit ipsorū corpus, boni ha- *de robusto*
 bitus, plenitudinem suscipere. At verò in *habitu, vò*
 10 quam rem hoc vocabulum Archigenes re- *gore* &
 ferre velit, inuenire non est facile, maxime *feruore a-*
 quia cōfundere, & corrūpere solet patriorū *tatis.*
 nomīnum significata. Quòd si astringētes,
 de iis dici intellexeris partibus, quæ à pleni-
 tudine intenduntur: non propriè ad muscu-
 los, sed cōmuniter ad omnia repleta corpo-
 ra pertinebit. Quum verò eos capaci cū spa-
 cio extendi dixit, puto ipsum hanc, à neruo-
 rum plenitudine voluisse seiungere. Torpi- *Torpidē*
 20 dē autem pulsare, haudquaquā fuisse recte *pulsare.*
 dictum, iam antea declaratum est. Reliquo- *Vlcerosas*
 rum verò dolorum, vlcerosus, inquit, leuiter *dolor.*
 acutus est. Est autē hæc quoque oratio ob-
 scura, neque per se quicquam docere potest,
 haud aliter quā cæteræ ipsius obscuræ ora-
 tiones, quas ne enarrare quidem possibile
 est: nisi quis rem ipsam per se intelligens,
 eam orationi adaptare conetur. Quum ita-
 que sciueris, tum medicos, tum gymnastas,

eos dolores vocare vlcerosos, per quos inter mouendum: vel tangendum, lassatis partibus sensus excitatur, qualis in vlceratis partibus percipi solet, facile intelliges per dolorem leuiter acutum, huiusmodi quampiam specie significari, qualis ab acutæ acus punctura fieri cōsuevit. Ergo cōstat ipsum, neque cōtinuū esse, neq; æqualiter per omnes partes porrectum. Hunc itaque dulciorem esse dicit, quum dicere deberet imbecillior, aut obtusior, aut non vehementem aut minus molestū, aut id genus aliud quidpiam. Nihil enim quod molestum est, propriè dulcius appellari potest. Id autē quod dicit, & pruriginem inducere potest, inarticulatè dictum est: quippe haud obscura est inter pruriginis sensum, & vlcerosam dispositionē differentia. Verū quia crebro pruriginosa dispositio vlcerosam antecedit, atque soluta quiescenteque vlcerosam, in pruriginosam transmutatio fieri solet: inde est quod de ipsis confusa, indefiniteque Archigenes scripsit: quemadmodum neque causas harum dispositionum exactè tractauit. Verū nos eas in libris Salubrium præceptorum perfectè exarauimus. Igitur vlcerosus dolor, nō solum ad cutem, sed ad imas quoque parte, vt ossa extenditur. Pruriginosus autem, reuera ad solam superficiem pertinet, non

Dolor leuiter acutus.

Dolor dulcis.

Prurigo.

Pruriginosus dolor.

non tamen primario, pro ratione ipsius propria, sed per accidens: eo quod densior subiectis sibi partibus, cutis est. Horum ergo dolorum uterque, propriæ dispositionis est accidens: sunt autem ob acres quosdam humores, atque tantum ipsi, quantum dispositiones ipsæ inter sese differunt. Sed ut dixi, satis de ipsis in libro Salubrium præceptorum definitum est. Punctorius verò (inquit) dolor, in Puncto-
 10 profundo est: sed non rectè, nam ad membranas, non ad internas partes, propriè pertinet. *lor.*
 † Infixus autem (ut inquit) quum sinus accesserit. Hic sermo non omnino absurdus esse videtur, quippe sinus, concavitas quæ-
 15 dam est, quum partium antea coniunctarum tæsse sum altera distat ab altera. Quum itaque fluxione pta ab ijs impletur, ita ut adiacentes partes distendant. qui in re-
 tur, tum tensionum dolorem sentiunt laborant aliquam-
 20 tius ex porrectum, sed propriis limitibus contentos continet. At ex creto quomodolibet è sinu hument.
 more, protinus dolor coquiescit, nisi ambiens † Deletur
 tia sinum corpora, adeò distendantur dilatatio
 tenturque, ut inflammatoria dispositione tor in qui-
 queatur. Hæc sunt quæ propriè ad sinus pertinet. Quod verò ab Archigene dictum est
 aliud ab his est. verum quid intellexerit, quum
 ita scriberet, haud facile inueniri potest. At
 quod deinceps scriptum est, non minorem
 la

Stimulans habet dubitationē. Nam stimulans (inquit)
dolor. dolor nō in imo subsistit. Hic enim sermo,
 cum eo quem in initio præmisit, pugnare vi-
 detur, quo in hunc modum scripsit: Stimu-
 lans autem, partim eorum quæ in loco sunt,
 quidpiam affectum esse declarat, partim cō-
 tra. Id enim fieri potest, secundū profundum
 in parte ossibus maxime vicina, & in cute, at-
 que omnino in medio, huiusmodi dolore
 facto ab humore mordaci, sensibiliū partiū 10

Lacerans aliquā erodente. Deinde quod in fine eius-
dolor. dem orationis sic scriptū est: Lacerans autem “
 est, qui in sinibus consistit, si lacerans quidē “
 idem significat, quod diuellens, mendacium “
 est. Nam illi qui in sinu est, id minimē con- “
 tingere solet. Quōd si non hoc, sed aliud
 quidpiā dicere voluerit, quomodo id pote-
 rit inueniri? Atq; huiuscemodi sunt quæ in
 præscripto sermone Archigenes posteris
 memorię prodidit. Igitur trāseamus ad aliū, 20
 qui & ipse ex dolorum differentia, affectas
 partes cognoscere docet. Est ipsius dictio
 huiusmodi. Hepatis verò dolor holcimos (id
 est tractorius) & inhærens & torpidus est,
 atque atrocius molestans. Splenis autē acu- “
 tus non est, sed & grauitatē simul, & exten- “
 sionem habet: atq; similis videtur ei, qui ad “
 elisionem quidem atq; expressionē, sed ex- “
 trinsecus incumbentem, renititur. Renes & “
auste

„ austeros dolores inducunt, & cū permanen *Austerus*
 „ te astrictione pungentes. Vesica vehemen- *dolor.*
 „ ter stringentibus utitur doloribus, atq; ten- *Stringens*
 „ sionibus punctoriis. Vterus autē acutis, per- *dolor.*
 „ tendentibus, pungentibus, distendentibus, *Vteri do-*
 „ torminatim incidentibus: quippe qui huius- *lores.*
 „ modi mixtione dolere natus est, quāobrem
 „ idiomatis quoq; ambiguitatem inducit. In
 hoc sermone iterum Archigenes protinus
 10 ab initio hepatis, dolorem holcimon (id est
 tractorium) esse dicit. Verū hoc vocabu-
 lum holcimos, apud Græcos in vsu non est *Holci-*
 proinde quid significet haud facile inuenire *mos.*
 est. Nam vocabulorum significationes ex
 longo vsu deprehēduntur. Atqui video eos,
 qui illo vtuntur, viscidum per ipsum velle si- *Viscidū.*
 gnificare, quale viscum esse videtur, vt cu-
 ius vna parte tracta, potest per ipsam reliqua
 illi continua simul attrahi. Sic pasta quoque
 20 ex frumento holcima dicitur, maximè si ac-
 curatissimè subacta fuerit. sed ex ordeis,
 aut milio pasta holcima non dicitur. Atqui
 sub hac significatione, hepatis dolor haud-
 quaquā holcimos euadet: proinde aliā si-
 gnificationem quarere oportet. Itaq; vnus
 ex his qui Archigenis sectam reliquis præpo-
 nere conantur, holcimon hepatis dolorem
 dici asserit, quum hepar vel induratum, vel
 inflammatum, detrahē iugulum videtur.

Alius

Alius quum diuturno morbo laborat. Alius
 quum mediocri dolore afficitur. Sunt qui tan-
 dum ipsum significare velint, utpote qui acu-
 to aduersetur. Atque vrgentem & adeo vehe-
 mentem, ut nullam admittat requiem, hunc
 acutum cum vocare solitum: contrarium ve-
 ro, nempe tardum, holcimon dixisse autu-
 mant. Nonnulli eum dolorem, holcimon vel
 grauem dicunt, qui grauitatis speciem refert:
 vsu enim receptum putant, ut de grauitate
 holce tractus dicatur. Multa insuper alia va-
 riè explicant, admirandi illi quidem enarra-
 tores, sed quæ intelligantur à nemine. Con-
 stat igitur hoc vocabulum holcimos, quod in
 propositæ orationis initio inuenitur, nihil
 nos posse docere. At verò deinceps confide-
 remus, quid utique sit dolor inherens. Nam
 hunc quoque hepatis proprium esse dixit. Mi-
 hi quidem facile persuasum est penetranti do-
 lori, inhaerentem per contrarietatem oppo-
 ni, ipsum dicere voluisse. Quid enim aliud
 coniectere quis posset? Etenim hepatis dolor,
 si quispiam alitus, vicina corpora ad consen-
 sum inducit. Nam & ad iugulum usque por-
 rigitur, & spirandi difficultatem creberrimè
 affert: atque interdum tussim quoque ac dy-
 sentenriam, neque raro notas costas infestat.
 Igitur quoniam pacto verè dicetur eodem in
 loco permanere? At fortasse satius fuerit pu-
 rare

Dolor in-
 harens.

Hepatis
 dolor.

tare, quòd inharentem dolorem dixerit, ve-
 luti infixum. Atqui hepatis dolor, vt. nuper.
 ostendimus, haudquaquã huiusmodi est. Si-
 militer antea iam declaratum est, ne torpi-
 dum quidem dolorem particulæ cuiusquam *Dolor tor-*
 proprium esse. Nam ad dispositionẽ potius *pidus.*
 referendus est hæc autem non iecinore, sed
 in nervosis potius corporibus inuenitur. Por-
 rò atrociter molestant, cum torpido pugnat *Dolor a-*
 10 vt pote qui violētus est, atq; continuus. Sed *trox.*
 nec huiusmodi quidem hepatis dolor est sed
 potius grauis. At ne grauis quidem exactè *Dolor gra-*
 proprius hepatis est, sed spleni quoq; ac reni- *uis.*
 bus inflammatis communis. Equidem non
 satis mirari possum, quo pacto Archigenes
 ad lienem dūtaxat, hanc doloris speciem re-
 ferre tentauerit. Nam vel Hippocratem au- *Hippoc.*
 dire debuit dicentem: Et in renem dolor gra- *lib. Epid.*
 uis. Verum hoc peccatum exiguũ fortè cen- *6. part. 1.*
 20 sebitur. At longe maximum est illud quod
 cõmittere solet, nomina scribens cæteris
 sensibus pecularia, quemadmodum nunc de
 renibus quidem, austeros scribit dolores, de
 vesica verò, astringentes. Hæc enim sapo- *Sapor au-*
 rum sunt nomina, qui lingua vt instrumen- *sterus.*
 to, & gustandi sensu dignoscuntur. Igitur res *Sapor a-*
 quædam declaratur, generatim quidem per *stringens.*
 hoc vocabulum stringens, sed magis par- *Austerũ.*
 ticulatim per austerum, & acerbum: quippe *Acerbum.*
 ambo

ambo astringunt, sed magis acerbum, qualis est omphacia vocata galla. Porro austera sunt multa, ut mali punici genera, atque cotonea mala, ac reliqua complura esui apta. Sanè acerbæ haudquaquam sunt iucundæ, nō solum ea quæ medicamentorum speciem referūt, veluti hypocistis, & balauſtium, & galla, & rhus. sed etiā illa quæ quum sint huiusmodi, recipiuntur tamen in cibos. Quapropter non excogitari quidē potest, quid vel 10 austerum, vel acerbum dolorem dicere voluerit Archigenes, non magis quā aut cæruleum, au rubrū, aut fuscum, aut alium aliquem, à coloribus nominatum. Nūc autem quid dixerit doctor quidam ex Archigenis

Dolorum qualitates similes explicari non possunt. familia, tempus est considerare. Nam dolorum proprietates Archigenē arrogātia motum interpretari voluisse censet. at quia reuera ineffabiles sunt eum in huiusmodi nomina absurda incidisse, nō intelligēs vnāquāq; 20 qualitatum, siue gustabilem, siue tāgibilem effari posse. Vbi verò multæ qualitates circa vnā essentiam apparent, ibi & proprietatē fieri contingit, idq; maxime in gustu videre est, cum verbi gratia & amaritudinem, &

Gustus proprietatis ineffabilis. dulcorem, & austeritatem, & acrimoniā, in vna essentia apparere contigerit. Sic enim in gustu proprietatis quædam oritur, ineffabilis illa quidē, si vnico nomine ipsam explicare

care tētaueris: sed quæ dici tamen potest, si per singulas qualitates discurras, eo addito, quòd & magis & minus declarare, haud impossibile est. Ita & herbas vniuersas, & reliquam quoque materiã, enarrauerunt medicorum non pauci: singulas qualitates, quæ enuntiatis rebus insunt, explicâtes. Ergo Archigenes, si vniuersam essentia proprietatē, vnico nomine cōprehendere voluerit, in do-
10 ctus omninò fuisset, id quod de Archigene nequaquam sentiendum est. Si autem simplices qualitates, ipsæ quidem ineffabiles nō sunt, earum verò quantitas, exacta quidem mensura, ineffabilis est: quanquam sub latitudine quadam explicari potest. Igitur lōgiori sermone vti non oportet, quum ea species ob oculos omnibus sit posita, qua vti debet is, qui quamlibet rerū sensibilibium interpretari aggreditur: quippe omnium tãgibiliū
20 qualitatum, propria habemus nomina, haud secus quàm gustabiliū, visibilibium, & audibilibium. Atque omnibus iis patrio more vti debemus, & neque stringentem neq; austerum nominare dolorem, vtpote quæ saporū proprię appellationes sunt. Plurimi enim medici ab Archigene stantes, quum dolorū differentias conscriberent, haudquaquam ausi sunt à consuetudine in nominum vsu recedere, quæ ab ipsis laborātibus audire li-

G

*Dolorum
vohat.*

cet, qui perinde se dolere interdū aiunt, qua-
si acu pungantur, ac rursus perinde ac si tere-
bro perforentur. Quinetiam videri sibi aiunt
contundi sese, & diuelli, & tendi, & retrahi,
& detrahi, & grauitatis cuiusdā sensum perci-
pere, qua interdum subiectarum partiū ali-
qua suspendi videtur, interdum verò circun-
dantibus incumbere. Igitur vt huiusmodi
nomina omnia facile intelliguntur, ita ad-
stringentes, & acerbī, & austeri, dolores in
telligi haudquaquā possunt, ac præterea ab
vfu omninò aberrāt. Hæc intelligere debuit
Archigenes, quū docere nos vellet, quomo-
do loci affecti possint cognosci. Nā omnis
qui de doloribus habetur sermo, vanus nu-
garumq; plenus esse censetur, nisi ex his, quæ
laborantes ipsi dicunt, eos cognouerimus.
Ergo si ab ipsis, quomodo dolent, discere
oportet, nunquam verò dicant, acerbum, aut
austerum, aut atrocem, aut horcimon dolo-
rem, rursus inutilis erit huiusmodi doctrina.
Præterea ex eo loco, quo dicunt Archigenē
interpretari velle dolorum proprietates, hæc
docendi ratio tum impossibilis, tum inutilis
esse planè videtur. Primū enim vel ipsis au-
toribus nō omnis ipsorum proprietas enun-
tiari potest: quod cum ita sit, omninò fieri
non potest, vt ad doctrinam aliquid con-
ferat, vtpote quam ij duntaxat qui sensi-
biliter

biliter ipsam percipiunt, noscere possunt. Deinde ea nobis ignota sit necesse est, qua nō laborauerimus, nisi fortasse Archigenes, omnes sui corporis partes habuerit affectas. quod licet concesserimus, fieri tamen non potest, vt credamus vnū hominem omnes singularum partium affectus, fuisse expertū. donemus tamen (si volueris) hoc quoque, quanquam impossibile est. Nam vteri saltē
10 affectus nunquam scilicet percepit Archigenes, nihilominus huius proprietates conscripserit, quæ à solis mulieribus expertis dignoscuntur. Itaque admirationem (ita dii me ament) sæpenuerò mihi induxit, ex qua tandem ratiocinatione tam absurdam hanc doctrinam collegerit: quam & si veram cōtendis, nihil tamen ex ea vtilitatis prouenire fateri cogeris, nullo infirmo suos affectus per Archigenica nomina interpretāte. Nam
20 quod nonnulli laborantium fastidire stomachum aiunt, id nobis eo quod aliquando ita fuimus affecti, planè notum est: sicut etiā mœstitia torqueri, quippe quosdam sic fuisse affectos satis constat. An verò austero dolore ab Archigene dicto quispiam fuerit affectus, intelligi non potest, vtpote nemine sciente, cui nam rei nomen hoc adaptauerit. Nam punctorium, & distendentē, atque eos qui conformiter nominantur, atq;

his multò magis vehementem, & fortem, &
violentũ, & continuũ, & intermittẽtẽ, ne-
mo est qui non nouerit: vtpote qui per no-
mina à consuetudine non abhorrentia, enar-
rantur, & quos quotidie euenire videmus.
Ad austerũ, & astringentẽ, & atrocẽ, & hol-
cimon, vt nemo profert, ita si quis fortassẽ
proferat, nemo intelliget. Cæterũ opor-
tet, & affectum esse communem: & appella-
tionem ipsum declarãtem, ab auditorũ con 10

Stomachi fuetudine nō aberrare: veluti quum stoma-
cōpressio. chum premi dicimus, id quod nemo non di-
Os vētri- cere solet. quippe tali sæpenumerò sensu affi-
culi. cimus, qualē extrinsecus onus aliquod incū-
 bens, inducere potest: idq; in nonnullis oris
 vētriculi dispositionibus, quod per abusio-
 nem non solum populares, sed probatissimi

Stoma- quoq; medici stomacho appellat. *Quinetia*
abus. inter vehementer respirandum, nonnunquam
Hepatis grauitatem in dextra praecordiorum parte
obstru- sentimus. id si citra febrim eueniat: aut ob-
ectio. structione, aut scirrhusa dispositione, hepar
Scirrhus laborare coniiciendum est. Veluti cum inflam-
hepatis. matione infestatur, febrim comitari necesse
est. Itaq; omnia huiusmodi & dici possunt,
& manifesta sunt omnibus medicis Archige-
ne prioribus, atq; sine absurdis illis nomini-
bus doceri possunt. Archigenis vero doctri-
na, hoc habet exacte proprium, ut non nouarum
rerum,

rerum, sed nominum rem nullam declarantium, enarrationi studeat. Nam librum de pulsibus, huiusmodi nominibus impleuit. quamuis ille, vt in commētariis de pulsibus ostendimus, haudquaquam impropriorum nominum metaphora indigeat.

De via & ratione, qua simul & sedes affecta, & ipsius dispositio possit cognosci.

CAP.

III.

- 10 **E**quidem voluissē Archigenem, tantorum medicorum successorē, aliquid lucis doctrinæ addidisse: sed eā ita obscurauit, vt ne nos quidem, qui in artis operibus iam senuimus, dicta ipsius intelligere valeamus. Quod igitur illiuserat officij, id nos prestare nitamur, docebimus enim in primis viā & rationē vniuersalem, cuius adminiculo, & ipse affectos locos inuenire, & cæteris *Methodus vniuersalis inueniē* viā ostēdere possis. Igitur vt in priore libro *lis inueniē* dictū iam est, via & ratio huiusmodi est. In *di locum,*
- 20 primis enim quærere oportet singulorū locorū propria signa, vt quomodo afficiātur, aut per singulos affectus alterētur, inuenire possis: Deinde utrū singulorum affectuum propria sint signa, an circa quamlibet partē varientur. Itaque oportet & loci, & affectus non inmemores, deinceps signa perstringere. Velutī si ita acciderit, vt pulmo inflammatione laboret, tanta inducetur spirā-

Peripneu- di difficultas, tantaq; angustia, vt suffocari
monia no laborantes videantur, ac recti sedere conen-
te. tur, quem affectum orthopnoeam nomi-
Orthop- nant. Quinetiam calidam sentiunt expira-
nea. tionem, idq; maximè si erysipelatis parti-
 ceptus fuerit inflammatio: quocirca vbi pluri-
 rimum efflant, iuuari videntur, ac multum
 aërem frigidum attrahere concupiscunt, at-
 que inter tussendum sputum expuunt: idq;
 modo hoc, aliàs alio colore infectum: vt in- 10
 terdum rubrum, interdum flauum, aut ru-
 fum, ac spumofum quoq; & nigrum, & liui-
 dum appareat. Insuper grauitatis cuiusdam
 thoraci incumbentis sensum sæpenumerò
 percipiunt, ac dolorem ex imo ad ipsum per-
 uenire, & ad pectus & ad spinam. Præterea
Libr. 4. de acuta est ipsis febris. Pulsus verò habent,
can. pul. qualem in libro de Pulsibus diximus. Sic
Lateralis vbi membrana costas succingēs inflamma-
morbino- ta est, acuta febris infestat, accedente pulsus 20
te. ea quam in commentariis de Pulsibus dixi-
 mus proprietate. est autem dolor puncto-
 rius, vnà cum spiritus difficultate: ac magna
 ex parte sputum colore infectum apparet
 haud secus quàm in peripneumonia. Igitur
 vtrosque affectus spirandi difficultas neces-
 sariò comitatur, eo quòd affecta particula
 spiritus sit instrumentum: oritur autem fe-
 bris, & propter affectum ipsum, & propter
 posu

positum. Nam & pulmo, & succingens costas membrana prope cor constituuntur. Inflammatio verò calidus affectus est, sic etiã tussis ipsis vt spiritalibus conuenit. Sed quòd aliquid expuitur, id ab affectu ipso procedit.

Quippe iam ostendimus, omnem inflãmationem, ex affluente fieri sanguine: quapropter si biliosus fuerit sanguis, flauum aut palidum erit sputum. Si pituitosus, & spumans

10 & candidum. Si melancholicus, aut nigrũ, aut liuidum. Si nihil horum sanguinem inferit, rubrum. Quinetiã in pleuritide sæpe numero magis biliosum: in peripneumonia verò magis pituitosum, sequi cõsuevit. Sed de hoc satis iam declaratum est. Quòd autẽ inflammatarum partiũ excrementa per aspera arteriam referuntur, eius rei causa, tum

ad positum, tum ad formationem referenda est, quippe quæ per solam hanc viam ef-

20 fluere possunt. Ad verò ventriculus duos habet meatus, [vnum per quem prauis in ipso humores euomuntur, alterum per quem humores ad inferiora delabuntur]. Verũ id quod in eo vitiosum inuenitur, supernatat magis, ac vomitione reiici consuevit: reliqua per intestina deiiciuntur. Veluti renum vesicæque excrementa, meiando excernuntur. Cerebri verò redundantia, per nares præcipuè, nonnunquam verò per palatum,

Affectu & aures vacuatur. Igitur sedes affectu dinoscuntur, & ab accidentibus, & ab actione la-
 neralis non fit, & excrementorum qualitate, & a tumori-
 te. bus praeter naturam, & doloribus, & a coloris
 vitio quod sequitur, vel in vniuerso corpo-
 Subtili esse, vel in vna quapiam parte, vel duabus, idque
 nim submaxime in oculis, & lingua: extra horum nu-
 stantia & merum sunt indicia, quae colliguntur secun-
 pellucida dum eam quae proprie sympathia, si ita ve-
 facile colo- lis, appellatur, veluti in priori libro iam di- 10
 res hos ra- ximus. At nunc tempus esse videtur, ut amicos,
 prius lege quorum petitioni obtemperans, hos comen-
 6. Epid. tarios scribere aggressus sum, ad exercitatio-
 Exercita- nem inducam: fit autem exercitatio omnis,
 tio haec lo- quum particularia sub eandem viam & ratio-
 gica ma- nem ducuntur. Huiusmodi autem doctri-
 xime con- nae specie, ut per sepe ostendimus, non aliud
 stat ratio- inuenitur utilius: quippe viae & rationes, vbi
 ne quam solae sine multifaria secundum ipsas exercita-
 mias op- tione cognoscuntur: haudquaquam possunt 20
 & ναλυτι- perfectos efficere discipulos. Altius igitur
 κέρ vocat, viam & rationem dicere aggressi, ad exerci-
 tum alte- tationis modum accedamus. In primis quidem
 ra quae in- intueri oportet, num actio aliqua sit laesa, quip-
 παρωγική pe cum ipsa proprium actionis instrumentum
 appella- affici necesse est, deinde vbi actionem lae-
 tur. sam esse perspexeris, ad modum laesionis acce-
 dendo, considera ad quam affectionem pro-
 prie pertineat. Postea affectum particulam nota-
 num

num tumore quopiā, aut dolore infestetur, *Τερον* & quidē accuratē cuiuslibet horum speciem *modus de-* inuestigādo: sic enim non solūm tumorū, *finitur p-* verūm etiam dolorum quoque, varios mo- *prietati-* dos addisces. Aspice subinde affectæ partis *bus*, id e- excrementa, per quem meatum vacuentur: *tiam χα-* ac vide, num aliquid essentia ab affecta par- *εαυτῆς ap-* te secernatur. Postea etiā vtrū omninō inco- *pellatur.* cta sint ipsius excrementa, an medio crite- co-
 10 cta: At tum cū ex eo vniuersum corpus, aut pars aliqua incōmodum rapiat quod partim ab actione laesa, partim à colore & figura deprehendet. Esto enim vt quispiā inter re- *Pleuritis.* spirandum in notharū costarū loco doleat, non protinus hūc esse pleureticum suspicari debes, sed in primis quidem, an tussiendo ali- quid expuat, intueri, id enim si coloratū, vt dictum est, videris, tum ipsum pleureticum esse dices. Quod si tussiendo nihil omninō
 20 expuat: fieri potest, vt nihilominus pleureti- cus sit ille quidem, sed inflammationem ha- beat, & incoctam & strictam, adeò vt nihil ab ea foraseici possit. Ac fieri quoq; potest, vt ob hepatis inflātionem, dolor in iam *Hepatis* dicta sede excitetur, intentis videlicet inter- *inflamma-* nis vinculis quibus nōnullorum iecur costis *tio.* alligatur, atq; sic dolor ad succingentem co- stas membranam perueniat. Verūm nequa- *Pulsus in-* quam similis est pulsus, in hepatis, & mem- *pleuriti-*

de durus branæ costas succingentis inflāmate: ac
tensus, a- ne alui quidem sedimenta similia sunt, quan-
per: in he quam non in qualibet iecinoris inflamma-
patide tione eadē sunt, sed in his affectibus qui pro-
mollis est. priē iecorarij nominantur. Igitur vt nihil
De his ex- excernitur, à quo indicatiū aliquod sumi pos-
crementis sit, satius fuerit præcordiorū dextrā partem
hepatidis tangere, quòd si nullus apparet tumor, ne sic
libr. 5. quidē delistere oportet: quippe fieri potest,
 vt in sola sima hepatis parte, sit inflāmatio, 10
 similiter etiam in gibbis partibus, sed non
 omnibus, verūm his duntaxat intumescunt,
 quæ à nothis costis conteguntur. Itaque la-
 borantem, vt vehementer respiret, monere
 oportet: deinde interrogare, num grauitatē
 sentiat, aut suspensam à superioribus, aut in-
 cumbentem vicinis. Accidit autem aliquan-
Inflamma do, vt in his haud secus quā in hepate, oria-
tio partiū tur tumor præter naturam, cuius occasione
continen- septum transuersum oppressum, respiratio- 20
tiū hepar. nem efficit difficiliorem: atque qui ita labo-
 rant, ab exigua tussi irritantur. Ergo in huius
 modi dispositionibus, solidum, firmumque
 discernendi indicium per omne tempus mor-
 bi, à pulsu sumendum est, deinde tractu tem-
 poris, reliqua quoque accidentia consideran-
 da sunt. Nam & linguæ, & vniuersi corpo-
 ris color alteratur, vbi hepar vitiatū est. Si-
 cut rursus thorace affecto, tussis increfcit,
 atque

atq; eo tempore omninò apparent, ea quæ
tusiendo expuuntur. Igitur quemadmodū
fieri nō potest, vt illæsis spirandi tum parti-
bus, tum instrumentis, difficilis fiat respira-
tio: accidit autem interdum, nullo existente
in ipsis proprio morbo, sed transuerso septo,
aut detracto, aut oppresso, vt homo difficul-
ter spiret: ita etiā vsu venire solet in ea sede,
quæ principē in se animæ facultatē cōtinet. *Princeps*

10 Nam cum & sciētia, & opinio, atque cogi- *animæ fa*
tatio omnis, in ipsa cōsistat, si harum aliqua *cultas.*

lædi videatur, protinus ipsam quoq; affectu
quopiam laborare arbitramur. Nā vbi vel
in pleuritide, vel peripneumonia delirium
incidit, nemo vel à costa, vel à pulmone, ac-
cidens hoc prouenisse dixerit. Quippe vni- *Sciētia cō-*

uersi eā partē, in qua deinceps animæ vis resi- *stans &*
det, simul affici putant, ac nititur quisque vt *firma co-*
modum consensus sectæ suæ conformem *gnitio cir-*

20 ostendat. Verū in aliis affectibus, non con- *ca ea quæ*
sentire, sed primogenio ipsam affectu labo- *eterna*

rare aiunt: veluti in lethargo, & phrenitide. *sunt, lubri*

At verò yndique affici, vbi propriarū ipsius *ca verò as*

actionum aliqua læditur. Proprias actiones *sensio cir-*
dico, quæ à nulla alia parte, vt instrumento *cares hu-*

funt. Nam reuera & videre illam, & audire *manas &*

caducas o-

pinio. Σιᾱροκοίς quæ à Platone δῖακοίς medium genus est
intelligentia circa mathemata.

haud

haudquaquam negandū est, sed videre oculis, & audire auribus. Atqui ut cogitet, & reminiscatur, & existimet, & eligat, neq; oculis, neque lingua, neq; alia quapiā parte utitur. Quod si hæc animæ pars, ita esset incontinente ipsam corpore, ut nos in domo aliqua, in primis fortasse, nullam ei noxā afferri putaremus à loco. quoniam verò ipsam legi videmus, quomodo lædatur, esset inuestigandum. Si verò veluti forma quædā corporis est ab ipso inseparabilis, eam lædi non inficiabimur, ob suscipientis ipsam corporis alterationem. At quia de hac re inter philosophos ingens pugna est, aliis eam veluti in domicilio contineri dicentibus, aliis verò ipsam corporis formam esse putantibus, idcirco quomodo lædatur, inuentu perdifficile est. Quod verò lædatur, ab experiētia discernere licet. Etenim ubi fracto capitis ossi, cerebrā adacta est, si quis vehementius comprimat, protinus sensum omnem amittit laborans: quinetiam si inflāmatio quædam oritur, nā & hanc interdum euenire videmus. mentem itaq; lædi minimè negandum est. Præterea nonnulli per vehementem capitis vstionem delirauerunt, atque per fortes ictus capiti adactos, sæpenuerò stupidum soporem sequi videre est: multi quoque affectus in capite consistentes, mentem haud obscure

Pars animæ quomodo lædatur.

Calvarie fractura.

Capitis vstio.

obscurè vitiant: adeo vt etiam populares, quum aut delirare aliquem, aut mentē quomodolibet affici cōspiciunt, capiti remedia adhibenda esse censeant. Verū enim uero quod principiū sensus & motionis ab impetu prodeūtis, sedem in cerebro habeat, & quod hoc à membranīs (Græci meninges vocant) contegatur, id in alijs cōmentarijs, quā verissimum esse declaratū est. Nunc

10 verò quomodo distinguantur affectus primitiui ab his qui per consensum eueniunt, *Affectus primiti-* considerandum est. Nam huiusmodi speculatio propriè ad hoc nostrum institutū per-

tinere videtur, & quidem non sine manifesta vtilitate: quippe quod ad curādi rationē imprimis pertinet, cuiusnam parti remedia sint adaptāda cognouisse. Nam per solum con-

sensum læso cerebro, si ea pars quæ primitiuo affectu laborat fuerit curata, prius quā *Affectus per consensum.*

20 cerebro propria aliqua eueniat dispositio, nullum in ipso relinquitur accidens. Quod si ex consensu, permanens aliqua fiat in ipso dispositio, tum non solum parti quæ primitiuo affectu laborat, sed capiti quoq; remedia adhibere oportet. Quapropter exactè definire, vtrum cerebrum, an membranæ ipsius primitiuè afficiātur, haud magnā vtilitatem afferre potest. In vtraque enim dispositione, capiti succurritur. Igitur huic rei

non

Dolor ex læso cerebro.

non ita vehemēs studiū adhibere, sed mor-
 bi potius essentiā, qualis sit inuenire: quippe
 humidum exiccare, aridū humectare, frigi-
 dum calfacere, calidum refrigerare, oportet.
Curatio Ac si cōiugatus fuerit affectus, per contrariā
affectuū coniugationē ipsum curare: vt calidum &
capitis. siccum, humectare & refrigerare: humidum
 frigidumq; , exiccare & calfacere, atque in
 reliquis duabus cōiugationibus ad portio-
 nem, ac in cæteris morbis omnibus, eadem 10
 ratione similiter facere cōuenit. At vniuscū-
 iusque speciē, in libro de morborū differen-
 tiis persecuti sumus. Quum itaq; & cerebri,
 & membranarum eius, iidem morbi simili
 curatione indigeāt, logica magis, quam ad
 curationem utilis esse videtur quæstio, in
 utrolibet illorū cōtineatur princeps animæ
 facultas. Verūm an in corde sit ea facultas,
 longè diuersa atque omnino differens est
 quæstio. Esto enim vt à flaua bile in corde 20
 & accumulata, & putredine affecta, phreni-
 tis sit excitata, nonne delirare videbitur is,
 qui caput oxyrhodino (id est oleo rosaceo
 cum aceto) perfundere iusserit? Nam si hoc
 præsidio phrenitidis causa sanari possit, non
 capiti, sed thoraci, ipsum adhibere poterat.
 Neq; tamē vniuerso thoraci, sed illi dūtaxat
 parti, in qua cor continetur. Hactenus hæc
 explicasse sufficiat, hoc addito, quòd nō [so-
 lum

lūm] affectum locū, verūmetiā causam illi
 noxam inferentem, considerare oportet: vt
 exēpli gratia: Deliriū est accidēs eius actio. *Deliriū.*
 nis quæ à loco mentis impote prodit: simi-
 liter † sopor stupidus, sed à contrariis causis † ἡ καὶ μὲν
 oriuntur. Quippe & vigiliam, & delirium καὶ, ὁ καὶ
 causa potestate calida efficit. At quotquot εἰς.
 somnolēti & soporosi sunt affectus, omnes Paraphro
 à frigida causa proueniunt. Id quod ex me. *sine.*
 10 dicamentorum natura, planè discere licet.
 Quippe frigida stuporē soporemq; calida
 verò vigiliās & varias mōtiones inducunt. *Sopor stu-*
 Sed quid opus est fortia medicamenta enu- *pidus.*
 merare, cum quotidie videamus & lactucas,
 & potabiliū, calidarumq; aquarū balneas, &
 vinum modicè dilutum, somnum inducere?
 reliquorū medicamētorum exemplo, quæ
 & humectare & refrigerare possunt. Quæ
 verò iis cōtraria sunt, vigiliās excitare. Itaq;
 20 tenuis ratio victus, & vinū meracius, vigi-
 liās inducunt: idq; multo magis, cum vinum
 meracum, aut suapte natura fuerit calidum,
 aut valide antiquum, veluti apud nostros
 Pergami olim accidisse, memoriæ proditū
 est. Neque absurda videtur historiæ ipsius *Historia*
 narratio. Grāmaticus quidam, singulis die- *de vino.*
 bus balneum petens, vnū ex pueris secū du-
 cebat, altero domi relicto, qui rem familia-
 rem seruaret, atque ea quæ ad victum essent
 neces

necessaria, præpararet. Puer itaque domum
custodiens, quū vehementi siti cruciaretur,
nec esset ei aquæ copia, vinū antiquū libe-
raliter potavit, atq; ex reliquo tēpore vigil
omnino permanfit. Postea correptus febre,
vnā cum vigiliis oborto delirio periit. Cæ-

Animalia terū animātia quæ frigidiori sunt natura,
Latentia. per hyemem ob frigoris vim, perinde ac si
Viperæ. mortua essent, latitare solent. Atq; tum vi-
peras quoque videres, si manibus tractentur ¹⁰
deferāturq; , haudquaquam mordere. Nam
per æstatē, tum hoc animal, tum serpētes re-
liqui omnes, maximè sub caniculæ feruore,
quum vehementer æstuant, furorem præ se
ferre vidētur, adeo vt ne exiguo quidē mo-
mento quiescere possint. Quod intelligens

Cenchrus. Nicander sic de Cenchride cecinit:

Nicāder. Non temerè offendas calcando Cenchridis artus.

Lege 13. Dum furij agitur.

Aët. Verūm de iis alibi pleniorē inuenies & ²⁰
enarrationē & demōstrationē. Siquidē cali-
da causa motū excitat, atq; idcirco vigilias
affert: frigus autē ociosum & ad motiones
pigrum reddit animal, ob idq; somnum so-
poremq; inducit. Igitur qui hæc intelligit,
quum per ardentium febriliū vigorē homi-
nem viderit & vigilare, & delirare, deinde

Vigilie inclināte iam febre, & dormire, & rectē sa-
Deliriū, pere, in capite nullam propriā esse disposi-
tionem,

tionem, sed à febris abundanti calore, delirium fieri existimabit. Sic etiam in peripneumonia, & laterali morbo, quū ad vigorem febris peruenerit, delirium sequi solet, nullo existente in capite proprio affectu. Quippe tum affectus proprius esse putandus est, cum *Proprius affectus.* permanere in parte quāpiam conspicitur. Vnde si in laterali morbo, permanēs eueniat delirium, caput propriū habere morbū perpende, ita vt quāuis lateris morbus quiescat, possit tamen capitis morbus permanere. Sæpenumero enim vidimus panū ob vlceris aliquod abortū, vlcere curato, deinde diutius infestare. Ergo quum pars aliqua simul cum alia sic afficitur, vt irritata quidem vna, altera vehemētius molestetur, remissa verò irritatione quiescat, eam per consensum affici putandum est. Hæc enim vna coniectura *Affectus communis est.* Sed de cerebro, vt dictū est, per consensum. *sensum.* proprium sumitur indicium, si non assiduè delirium permaneat, sed auctam febrem sequatur. Atque eadem ratione fieri solet, vt quum febrim accessiones irruere incipiūt, sopor in *Sopor in febrim accessionibus.* sopore laborantes grauentur, quòd hoc tempore cerebrum vehemēter sit refrigeratum: quippe quod alioqui paratissimū est, vt noxam huiusmodi subeat, quum intemperiem habeat frigidam, non verò tantam, vt hæc sola prædictorum accidentium possit esse.

H

† Κατα-
φασαν, ἢ
καρπον.

causa, sed quum accessio ab initio processerit, frigus adeo increfcit vt † soporem queat inducere. Id verò, vt dixi, fieri consuevit, vel ab intemperie frigida, vel à pituita in cerebro exuperante.

LIBRI SECYNDI
FINIS.

CL. GALENI 10
DE AFFECTORVM
LOCORVM NOTITIA
LIBER TER-
TIVS.

sequitur hoc libro exercitatio particularis vniuersalis methodi: & primum quidem ab actione laesa: deinde accidentibus tum propriis tum communibus principis animæ affectiones requirit, à cerebro ad olfactum progrediens.

20

Quod actionum noxe, ipsarum actionum instrumenta affecta esse declarant, aut primitiue aut per accidens.

CAPVT I.

Locus.



E affectis locis, sic enim vocant corporis partes, pauci admodum medici scribere aggressi sunt, ac multo plura quàm attigerint, omise

miserunt. Itaque cæteris silentio præteritis,
vnius Archigenis haud indigni qui omni-
bus præferretur, meminimus diximus enim
eum sermonem, quo asserit actiones quasdã
laxi illaxa ea corporis particula, quæ ipsis
deputata est, distinctione egere. Defendi
enim potest, si pars per alterius consensum
laxa, nondum permanentem habeat dispo-
sitionem, sed veluti umbra quædam (vt ipse
dicebat,) insit hæc ei affectio. Nam si ad
ignem quis propius accesserit, vt ferè com-
buri videatur, citra tamẽ vstionem, dolebit
quidem vehementer, sed calfacta parte nihil
adhuc patiente. Sic etiam vbi ambiens aër
vehementer frigidus, aut aqua exactè frigi-
da, aut nix infestat, grauis admodum dolor
excitatur. Atqui ablata re quæ nocuit, pro-
tinus conquiescit affectio. Quamobrem fa-
ctius fuerit, vt dicamus, nomine id ipsum in-
dicante, affici quodammodo eam partem,
quæ alteri consentit. Neque enim pars quæ
nihil patitur, sed ea quæ cū alia patitur, con-
sentiētis vocabulo significatur. Itaq; quum
affecto stomacho, oculi similibus infestan-
tur casibus, quales in suffusionibus apparere
solent, dicendum est illos pati, elato ad cere-
brum ab humoribus in ventriculo cōtentis,
fumoso quopiam vapore: non tamen adeo
afficiuntur, vt ablata re quæ molestiã intulit:

propria curatione egeant. Verum huiusmodi disputatio, ut dixi, ad dialecticam potius pertinet. Quaecumque enim quaestiones usum *Quaestio-* transcendent, qualis sit rerum natura secundum propriam essentiam indagantes, haud *nes logicae.* dubie logicae esse censentur. Sic etiam Chrysippus philosophus de animi aegritudinibus *Chrysip-* scripsit. Vnum quidem de curandi ratione *pus.* librum, quo scilicet maxime ad earum curationem utimur, cui tres alios subiunxit, qui *10* logicas continent quaestiones.

Quod laesarum actionum modos cognovisse sit utile.

C A P. II.

Archigenes.

QUOD autem melius fuerat, & huic nostro instituto commodius, Archigenes parum exacte declaravit. Quod certe modis actio laedi possit. Sic enim, & primo affectae partes, & proprio vitio laborantes, aut quomodocumque quis nominare voluerit, deprehendantur, & curandi ratio abunde nobis suppeditari possit. Ego vero in vocalibus instrumentis id iam exposui, ac in eo quoque, qui in manu sensum amisit digitorum, ipsis non affectis, quippe inuenta in dorso initio pars, quae primo afficiebatur, idoneam curationem ostendit.

Vocalia instrumenta.

Digitia affecti.

Tri

Triplex lesionis modus per consensum.

CAPVT III.

SEd aliter eueniunt suffusionis acciden-
 tia, affecto vetriculo: atque aliter ei, qui *Suffusio.*
 ab alto decedit, nullo existente in vocalibus
 instrumentis vitio, vox offensa est. Denique
 alia cōsensus specie laborabat is, cuius digiti
 sensum amiserant. Siquidem oculi vexaban-
 tur quod ascenderet ad eos aliquid, vox au-
 tem quod materia eius esset oblæsa. Sed di-
 giti idcirco torpebant, quòd sentiendi facul-
 tas ad ipsos non descendebat: proinde satius
 fortasse fuerit, vt existimes, tum vocalia in-
 strumenta, tum digitos nulla affectione la-
 borasse, id quod de oculis haudquaquam
 dixeris. Nam his vt fumoso vapore imple-
 tis, affectus ipse inest. Vocaliũ verò instru- *Officium*
 mentorũ, atq; digitorũ officiũ læditur, nō *vocalium*
 quòd veniat ad eos quippiam præter natu- *instrumẽ*
 20 ram, sed quòd careant eo quod secundum *torũ quan*
 naturam ad ipsos venire debet. Sanè secun- *do lædi-*
 dum dorsi spinam læsa nerui origine, vis sen- *tur.*
 tiendi digitis non influit. Neque guttur re-
 solutis intercostalibus musculis efflatũ spi-
 ritum recipit. Nihilominus rectè dixeris, in
 ipsis hanc esse passionem, quòd non perue-
 niant ad ipsas partes ea, quæ antea quum se-
 cundum naturam se haberent, venire sole-
 bant. Etenim fontes affici haud absurdè pu-

taueris, si non perueniat ad ipsos aqua. Sic
Analo- Cerealium quoque frugum è terra prodeun
gia. tiū, squalor immodicus, passio est, & anima-
Affecta lium, cibi potionisq; penuria. Quoties enim
pars quā alicui deest illud, sine quo secundum naturā
do dica- munere suo fungi nō potest, ipsum optimo
tur. iure affectum esse putandum est. Sed huius-
 modi quæstiones (vt iam dixi) ad dialecti-
 can potius pertinent. Cæterum magna me-
 dicorum pars negligit eas considerationes, ro-
 que vel læsis, vel deperditis actionibus neces-
 sariæ sunt. Quum enim duæ trēsve fuerint
Disposi- aliquando huiusmodi actiones, accidit in-
tio hecti- terdum, vt vna particula affecta, reliquæ illi
ca. consentientes in suis actionibus simul ledā-
Disposi- tur: interdum verò, vt omnes eodem modo
tio cata- afficiantur. Atque accidit interdū, vt harum
schesin. aliqua dispositionem habeant (vt ita dicā)
De ijs co- aliqua dispositionem habeant (vt ita dicā)
prosc. 8. hecticā, id est, quæ tenaciter hæret, reliquæ
Method. verò (vt sic dixeris) catasthesin, id est, quæ fa-
sub mi- cile discutitur. de quibus. 2. libro de Viuorū
tium. dissectione, atque in eo qui hunc præcedit,
 † Διοφισ- iam diximus, ac nonnihil in sequētibus quo
 μδς me- que dicemus, vt videlicet futurum sermonē,
thodus est qui sine huiusmodi † definitionibus explica-
 que simi- ri non potest, perficiamus. Sed iam enarrare
lia, dissi-
 milia: eadem, diuersa: propria denique & cōmunia separat,
 in qua tota vis Logice ferè sita est.

aggie

aggrediamur id, quod admodum utile fuerit prædixisse, propter eos, qui verbo quidē demonstrare nituntur, affectorum locorum investigationem. Medicis esse necessariam, opere verò illam evertunt. Atque vñum aliquem affectum pro exemplo sumamus, sitq; is pleuritis, in qua, latus esse affectum, dolor ipsius declarat. Sed vtrū quæ succingens appellari solet siue mēbrana, siue tunica (nihil enim refert) inflammetur in pleuriticis, an alia quædam lateris particula, præterea vtrū pulmo secūdum fibras necessariò afficiatur, an omnino affectionis sit expers, scire nihil ad rem pertinere autumant ij, qui vñum & experimenta præferunt: dicunt enim multos se vidisse pleuriticos, tum à præceptoribus, tum à se curatos, obseruati, iis præceptis, quæ ab Hippocrate in libro de Ratione victus in acutis morbis, præscripta sunt: item quid ipsis pro sit, & quid noceat noscerē, euidētia signa habere, quibus discant cui venā secare oporteat. Insuper de fomentis, cataplasmatis, victus ratione, alui dictione, nihil sibi ad completam notitiam deesse, idq; ex longa experientia. Sed quid vel Hippocratem, vel alium quempiam illo priorem induxerit, vt hæc inueniret auxilia, se penit⁹ ignorare: satis ipsis esse, si iam dictis remediis cōmodè ytantur: id quod alios quoq; artifices

Pleuritis.

Empiricorum defensio.
Lib. 2.

Lege Celsum lib. 1.

Gale. de-
 liberatio
 de empi-
 ricis &
 dogmati-
 cis.
 Dogma-
 tici.

Gale. ia-
 stantia.

facere videmus. Neq; enim faber, siue ligna-
 rius, siue ararius, neque cerdo, quo pacto
 artes suæ fuerint inuentæ, inquirunt: sed à
 præceptoribus edocti, vfu eas probant, &
 confirmant, atque sic clarū nomē assequun-
 tur. Equidem, vt verū fatear, quū medicos
 qui se empiricos ab experientia nomināt, ta-
 lia proferentes audio, inducor certē vt pro-
 babiles putem eorum rationes, videnturque
 mihi, qui rationalem medicinam profiten- 10
 tur, contra illos parum idonea se respōsione
 tueri. Proinde vt cæteris in rebus omnibus
 tenerariū ascēsum semper refugi: ita in inue-
 stigādis singulorū morborū remediis, diu
 multumq; apud me cogitavi, an logica de-
 mōstratione indigerē, an sufficerent ea præ-
 cepta, quæ ab experientia, & præceptoribus,
 atq; ex me ipso didicerā. Igitur ea quæ diu-
 tina inquisitione longē optima iudicaui, ita
 me diu amant, veritatis amatores docere non 20
 grauabor. Nihil enim causæ est, quā obrem
 mentiar: quod facere solent ij, qui vni sectæ
 addicti, omnem ex ipsa gloriam quærunt,
 quippe contentiosē eos defendere oportet,
 eam sectam veram esse, quam vnicam noue-
 runt: nam ex nullo alio disciplinarum gene-
 re gloriā sperare possunt. Ego verò re ipsa,
 & publicē, & priuatim, apud eos videlicet
 qui sectam quālibet à me discere cupiebant,
 osten

ostendi in omniū sectarum scientia (ne maius quicquam dixero) me esse posthabendū nemini. Quòd si vni sectarum patrociniū ferre velim, quamuis ex tempore ac pro renata dicendum fuerit, haud tamen facilè ab aliquo conuinci me, rationū penuriā, patiar. Non enim (vt nonnulli faciunt) ex libris eas didici, sed praestantissimis in vnaquaque secta praeceptoribus vsus sum: neq; sanè odisse possim empiricos, quorum praeceptis sum institutus, vel dogmaticos: pari enim studio omnibus dedi operam, versatusq; sum cum praestantissimis in vnaquaque secta praeceptoribus. Itaque innotui Romae, tū primoribus eius vrbiſ ciuibus, tum imperatoribus deinceps omnibus, & quidē ob artis opera, non ob sophisticas rationes: quamobrē nihil prohibet, quo minus de vnaquaq; secta verè dicā ea quae sentio. Igitur per artis exercitationem comperi, eam remediorum in- Cōclusio.

20 uentionē quae ex vera demonstratione procedit, in his quae rarò accidunt, experientiae longè praeſtare. Vnde multos morbos curauī, maximè contrariis praeſidiis: interdum & iis quae experientiā & vsu cognita sunt, quae quidem in libro de curādi via & ratione latius explicauī. Nūc verò ea dūtaxat perſtrigram, quae nostro proposito magis accōmo- Laeſe actiones.

data videbuntur. Nam cōperi laeſas actiones

H 1

non solum ob similes, à quibus aduntur,
 ægrotantes: verumetiam ob alias quasdam
 particulas, quæ licet actionem non habeant,
 usum tamen quendam præstare videntur.
 Sic etiam instrumentalium partiū morbos,
 actioni nocentes deprehendi, quibus præ-
 cognitīs, inueni deinceps morbos quosdam,
 continenter plurimos homines infestantes,
 alios verò rarò accidentes. Atqui experimen-
 ta tantum spectantes Medici, non ea quæ ra- 10
 rò, sed quæ crebrò accidunt, memoria & imi-
 tatione assequuntur. Quocirca dispositionū
 rarò euenientium, non solum curationem,
 verum etiam præuenientes ipsarum notio-
 nes negligunt. Proinde primū inuestigauī
 quomodo cognoscendæ sunt, inueni q; ea-
 rum quasdam scientifica deprehendi posse
 notitia, nonnullas verò artificiosa vocata cō-
 iectura, atque idcirco ipsas magna ex parte
 rectas. Eiusmodi enim est artificiosæ conie- 20
 cturæ vis. Verum & has ipsas, & dispositiōes
 eis priores, quæ videlicet scientificam noti-
 tiam admittunt, indigere semper inueni affe-
 ctarum partium notione. Itaq; medicinam
 professus, usque ad senectutem, nullam in
 hodiernum usque diem calumniam subii,
 neq; curando, neque præfagiendo, id quod
 celeberrimis quibusdam medicis interdum
 accidere memini. Quod si quis gloriam ab
 artis

Artificio-
 sa conie-
 ctura.
 Gale. glo-
 ria.

¶ Via hac & ratione, & si fieri possit, ea periodo, quæ vocatur *τεκμηρίωδης*, morbos cognoscas, & remedia inuenias, vtrumque quidem *ἐπιστημονικῶς* scientificè, aut certè

σοφῶς—

artis operibus, non à sophisticis sermonibus *καὶ ὡς συνέ* coniectura
 assequi voluerit, is nullo negotio facili com
 pendio colligere poterit ea quæ per omnem *quadam*
 ferè ætatem diligentī inquisitione inueni. *ἣν sit παρ-*
 10 Id quæ sibi persuasum habeat, † hac via & ra *τις ἀρχὴ ἀρ-*
 tione, medicamenta me inuenisse, quibus *τις ἐργασίας*
 morbos rarò eueniētes curarē, cū antea ne
 que præceptorem vidissem huiusmodi mor
 bos curantem, neque ipse aliquod expertum
 haberem remediū: id quod per deos immor *Methodus*
 tales affirmare nequaquam timeo. Quippe *Galen. in*
 vitiosa actione, semper inuestigare studebā, *morbos*
 quānam sedes, vel ipse afficeretur, vel alte *curat.*
 ri consentiret: quum quæ eam inuenisse per
 suasum mihi esset, tum dispositionem ipsam
 20 quarere, atque ex vtrisque totius curatiui
 generis indicationem sumere, simul reme
 diorum & quantitatem, & qualitatem, &
 idoneam materiam inuenire. Præterea cum
 prædictis, & ætatem, & naturam laboran
 tis, tum anni tempus, & terram: & id genus *Affecto-*
 alia, quorum in Hippocraticorum librorum *ἢν τοῦ*
 enarratione memini, perpendere operapre *quintu-*
 tium ducebam. Verū superioribus duo *plex de-*
 bus libris hunc præcedentibus, nisi fluxa *prehen-*
 admo

admodum fuit memoria, didicistis affectas
 sedes quinque; modis posse deprehendi. Nem-
 † *ἡπιον* pe ab excrementis, atque iis quæ affectis
φομίνων partibus † adnascuntur, item actione læsa
 quæ antea quibus connumerantur & color præter na-
 vocabat turam, & figura. Sed excrementa trifariam
ἡπιον diuiduntur: aliquando enim affectarum se-
μεν dium partes, ipsarum videlicet essentia vel
 Excreme- soluta vel disiecta excernuntur, interdum
 ta tripli- ea quæ in ipsis continentur, nonnunquam
 cia. aliquid quod morbosas dispositiones se-
 † *ὡς* *ὡς* *ὡς* quitur: id quod; vel † solas, vel semper vel ma-
 licet repu- gna ex parte. Cum itaque; in quibusdam affe-
 dies quæ ctibus, nulla alia mihi pateret via, sola actio-
 philosophi nis læsio, satis conducebar ad affectarum
 appellant partium inuentionem.

ἐν τῇ μνήμῃ De memoria perditā, de quā; alijs affectibus
ἡ γὰρ αἰσθητικὴ qui circa principem animæ facul-
ἐκ τῆς φύσεως tatem euenire possunt.

ex quibus

CAP. IIII.

20

neque sciē- **I**gitur cum deperditam cuiusdam memo-
 tia sit, ne- riam restituere oporteret, essem quod; adhuc
 que conie- iunior, ac neque præceptorem vnquam vi-
 ctura ar- dissem, qui huiusmodi affectionē curasset,
 tificialis. neque apud vllum antiquorum curationem
 Memoria legissem. Primum quidem apud me ipsum in-
 læsa. uestigavi quænam pars esset affecta, cui to-
 Topica re- pica, id est localia vocata remedia adhibe-
 media. rem, prius videlicet vniuersi corporis cura-
 tione

tione præmissa. Id enim commune præce- *Vniuersi*
 ptum est, quod in omnibus morbis obser- *corporis*
 uare oportet. Deinde quâ via, ratione, reme- *curatio*
 diorum singula inuenirem. Cæterum affe- *præmit-*
 ctam sedem eam ipsam existimaui, qua prin- *tenda.*
 ceps animæ vis cōtinetur. Medicamenta au-
 tem ea adhibenda esse, quæ huius sedis di-
 spositioni aduersarentur. Interim oratos ha-
 bere velim omnes, qui in horum commen-
 10 tiorū lectionem inciderint, vt pruritum,
 † rabiem, vel insaniam, quam de sectis con- † *Vel (vt*
 ceperunt, deponant, deinde sic vt probos *vetus in-*
 viros decet, dicendorum seriem confide- *terpres)*
 rent. Equidē quum ea quæ iam supra pro- *rabiosam*
 posui, perpenderem, accepi Archigenem li- *litē, Græ.*
 brum quendā, de oblata memoria restau- *est, τῆς*
 ratione edidisse, quocirca omnes bibliothec- *ἱστορίας*
 casillico percurri, conuenique bibliopolas *ἀνθρῶπων,*
 omnes, atque Medicos quoque, quos & vi- *μανίας.*
 20 ri & scriptorum eius studiosos esse sciebam,
 quò eius libri copia mihi daretur, sperans in
 eo remedia me inuenturum, locum autem
 affectum minimè, quòd planè scirem nul-
 lam aliam à corde sedem huic affectioni
 ipsum destinasse, secta ipsius constanter de-
 fendente, principem animæ vim in ea par-
 te sedem sibi vindicare. Porro intelligere
 cupiebam quod intemperantiæ genus, eius
 affectionis causam esse putaret: neque enim
 dubi

Intempe-
rantie ge-
nera.

dubitabam, quin distemperantiam aliquam
pro causa afferret, vtpote qui sectam eius
non ignorarem. Sciens itaque octo intem-
perantiae genera in qualibet particula pos-
se consistere, quatuor simplices, & quatuor
compositas, noscere cupiebam, quod intem-
perantiae genus Archigenes laxae actionis
causam esse declararet: frigusne, an humi-
ditatem spiritus in corde, an compositum
ex frigore & humiditate, aut ariditatem cum
frigore, putaret huiusmodi posse affectio-
nem producere. Etenim manifestum erat,
eum in hac re nihil tribuisse calori. Sed quid
demum mihi acciderit, iis qui huius sectae in-
faniam absterferint, iam narrare aggredior.
Sanè primò eius libri sermones scripsi, ubi
videlicet Archigenes curationem scribere
aggreditur deletae recordationis, siue obli-
uionis, siue memoriae amissionis, aut laxae, vel
utcumque eam, quam supra proposui affectio-
nem nominare volueris: aut si non affectio-
nem, sed morbum, aut accidens, aut infirmi-
tatem appellaueris. talia enim à sophistis tra-
ctantur, quae ne minimam quidem utilitatem
ad curationis rationem afferunt. Verum quo
clariora reddantur ea quae posthac dicemus,
hoc praedicere necesse erat, Archigenis vn-
decim libro epistolarum scripsisse, in quorum
primo extat ad Marsum epistola, qua consu-
lit

Archige-
nis episto-
la.

lit, vt patri memoriam restituere nitatur, atque ab initio statim post pro cœmiũ, vbi curationem tractare incipit, ita ad verbum ferè scriptum est: Itaque modici sanguinis iterata detractio, incipiente etiamdum malo, meo quidem iudicio, non parum conferre videtur, nisi laborantis fortè imbecillitas ob stiterit. Deinde rursus inquit: Consultum mihi videtur, vniuerso quidẽ corpori, & irrigationes, & fomenta: deraſo verò capiti cucurbitulas adhibere. His ita lectis (vt verũ fatear) †fastidio affectus sum. idq; non ab re, quòd †ἐκκοτῶ-
 spe quam de viro conceperam, frustratũ me †διυίωσα, viderem. quippe qui millies, in multis com- centurba-
 mētariis suis, affectorum locorum, atq; dis- tus sum,
 positionis ipsorum sciētiam, necessariam ad perinde
 rectam curationẽ esse dixisset. Sed quid vt acqui ver-
 litatis inde cõsequemur, nisi ab ipsis ad reme tigne te-
 diorum iuuẽtionem dirigamur? Qua igitur nebricosa
 20 ò Archigenes probabili ratione persuasi, ca- conturbã-
 put aggrediemur relicto corde: cuius conge tur.
 nitum quoddam opus memoria est, affectus
 verò actionis, eius est deperditio? Quam dis-
 positionẽ sanãdo, cucurbitula capiti adhibi-
 ta, memoriam reuocat? qua ratione huiusmo-
 di suades remedia? ita nunc quoque inter visi-
 tandum ægros, per communes consultatio-
 nes, video Medicos adinuicem interrogãtes,
 quã ratione hoc potius quàm illud adhibere
 sua

suaferit: atque ii ne minima quidem negli-
 gunt, tantum abest, ut tam grādia, qualis est
 cucurbitula capiti adhibita prætereant. Neq;
 video, si pectori è regione cordis fuisset ad-
 hibita, qua ratione Marfi patrem iuuare po-
 tuisset Præterea proposita iam verborū se-
 ries non explicat, utrum concisa antè scalpel-
 lo, an integrā cute, cucurbitulam thoraci a-
 ptare voluerit. Si enim forte fortuna, ut nō-
 nunquam euenire solet, frigida aridaq; fue-
 rit dispositio, sanguinis quidē detractio ad
 extremum ducit periculū, solæ verò cucur-
 bitulæ, non alio nomine, quā calorise exci-
 tandi gratia, vtiles esse cēsentur. Cucurbitu-
 lā enim attrahūt ad sese humorem ex imo,
 id quod aridæ dispositioni maximè aduer-
 satur. Ignota itaq; dispositione, quæ vel ca-
 put, vel mēbranas ipsi afficit, haudquaquā
 tutum fuerit, in exteriores caluariæ partes
 materiam retrahere. Sic enim prædicere de-
 buerat, si frigida humidaq; affectio fuerit,
 capite hoc modo disposito, curationis sum-
 mam in calfaciendo exiccandoq; statuere,
 atque præsidiorū materiam, quæ huiusmo-
 di habeant facultatem, adhibere oportet.
 Quūq; vix ex obscura me vertigine recolle-
 gissem, sequentia etiā legere aggressus sum:
 inuenire me posse sperans, si non per ordinē,
 saltem sine ordine, huiusmodi aliquem ser-
 monem,

Cucurbi-
 tula.
 Phleboto-
 mia.

Σκοτοδι-
 υα quasi
 offusiste-
 nebris na-
 ta verti-

monem, qualis is erat, quē nuper exēpli cau- go. atque
 sa percurrimus, apprehendi itaq; vniuersum hic locus
 præsidiorum catalogum, vehementer calfa satis osten-
 cientem & exiccantem, adeò vt totum ca- dit quomo-
 put, sinapismo ab ipso vocato, calfaceret, do prius
 quauis vehementissimum sit medicamen- verti de-
 tum. Deinde ablato sinapi, caput nitro con- buerit i-
 spergere, mox aqua † calida rigare iubet, σκοτος δ i-
 quo medicamine nullū in arte medica violē viοοα
 10 tius inuenies: siquidem dolorem veluti cau- quod vel
 terium excitat, sed diutius durat eius opera- conturba-
 tio. Itaque Archigenes inferens, inquit: Igi- tus sum,
 tur † intolerabilem habet dolorem, neque vl vel percul-
 li vel maximorum præsidiorum cedit hoc sus verti
 medicamentum. At verò ex sinapi, nastur- potest.
 tio, grano gnidio, vua taminea (staphida- † θερμω.
 gram Græci vocant) apophlegmatismos † δουρη-
 instituit, ac sternutamenta mouere, & po- μόντον.
 20 tiones propinare iubet: vtraque ex vehe- Apophle-
 menter calidis aridisq; medicamentis com- gmatif-
 ponens. Vt facilè cōstet ipsum credidisse, ad mus Ar-
 humiditatem & frigiditatē, vel cerebri, vel chigenis.
 membranarum, hanc dispositionem perti-
 nere. Huiusmodi enim dispositio, si calua-
 riam tantūm affecerit, hominem memoriā
 haudquaquam priuabit. Verūm hæc obiter
 propterea dixerim, quòd exiccantia calori-
 ficaq; remedia inducit: quanquā nusquam
 ab ipso explicatum est, humore frigoreque

obliuionem cōstare. Sed quis nō indignabitur, vidēs caput tātis vexari negotiis, alia videlicet parte affecta? Caterū id quod de cucurbitulis ab initio indeterminatē protulit, postea pergens huiusmodi verborum serie manifestissimē declarat: Atq; irritationes (inquit) quas sinapi, cucurbitula q; lenes intulerunt, leuare oportet. Sunt autem interdū mitiores, interdū vehemētiores esse solent. Atq; efficaciones sunt illę, quę concisā prius 10 cute, adaptantur. Verūm ō clarissimē Archi-

Remedia genes, nulla tibi suffragari ratio potest, quā-
alia ra- obrem capiti ista adhibeas, si affectio confi-
tione, alia stat in corde. Neq; ab experimēto, vt inte-
experien- rim empiricos alloquamur, talia possunt in-
tia, quę ueniri. Aestuas quispiā sub ardente febris, fri-
dam vtra gidam aquam per intemperantiam ingessit,
que via & nonnihil præsidiij expertus, medicis ini-
inuenta tationis viā sine rationali indicatione ape-
sunt, & ruit. Cucurbitula verò, nulla occasione du- 20
experien- ce, sed sola indicāte ratione adhibetur. Neq;
tia eorum enim sua sponte cucurbitula sese adaptare,
est quę neque etiam si hoc detur, per occasionem
plurimum

& certa ratione fiunt, vel eorum quę casu aliquo vel raro quidem & sponte sua accidunt κατὰ τὴν ἐξουσίαν. Itaque complexionem quam Philosophi κατὰ διάνεσιν appellant, persequitur Archigenes, vt ostendat nullo modo inuenta remedia si memoria sedes in corde est.

aliquam

aliquam capiti adhiberi potest, præsertim in ea affectione, quæ rarò euenire solet. Interroganti verò mihi nostræ tempestatis. Medicos, præcipuè senes, & exercitatos, curassent ne vnquam huiusmodi affectû? omnes penè responderunt, nunquam id se tentasse, vno duntaxat excepto, qui diceret curationem quidam aliquando se aggressum, nihil verò profecisse. Quo pacto igitur eorum, 10 quæ casu quodam accidunt, auxilia, vel experimento vel imitatione cognoscemus, cum rarò eueniat huiusmodi affectus: neque fieri possit, vt cucurbitula per occasionem capiti adaptetur? Frigidæ enim potio, *Frigidæ potio.* cæteraq; id genus remedia, quorum quoti-
die in multis creberrimum facimus periculum, per experimenta inueniri possunt: sed cucurbitulæ appositio, siue concisa prius cute, siue ea integra fiat ab experiētia occasio-
nem accipere non potuit. Quum enim reliquarum actionum sedes quamuis non exactè ad inuētionem tamen remediorum, factis sensibus dignoscantur, in memoria id cōceditur minimè. Reliquas voco affectiones, vt lateralem morbum, peripneumoniā, nephritidem, dispositionem colicam, hepaticam, splenicam, aut vesicæ, aut vteri affectus, atque id genus cæterarum partium. In quibus omnibus, & dolores, & ea quæ per

Catoche.
Catale-
psis.

meatus excernuntur, & si non exactissimè saltē in latitudine sedem affectū declarāt. In laterali enim morbo, facilè est vniuerso lateri adhibere quicquid volueris, similiter ventri in colica, quemadmodum si hepar aut lienis inflāmetur, prae cordiis, atq; haud secus in cæteris partibus. Deperdita verò memoria, nullum affecti loci signū, neq; tumor præter naturā, neq; dolor aliquis, neq; excretio, neq; aliud quidpiā extat. Quemadmodū neq; in 10
melancholia, phrenitide, mania, morbo comitiali, lethargo, sopore, & in ea affectione quam recētiore medici catochen, id est vigilantem soporem nomināt, atq; catalepsi, id est occupatione: ac ne in iis affectibus, qui vel toto corpore resident, vt spasmis, & saltibus: vel altera dūtaxat medietate, vt paralyfi: nullū enim signū ab his tanquā ex radice prodit. quippe neq; tumor præter naturam, neq; dolor neq; color à priori mutatus, neq; 20
excrementa, vnde Archigenes potuisset inuenire remedia: si quidem nugaces sunt empiricorum occasiones, atq; Archigenis sermo nos ducit ad cor. Verū si concedamus ab experientia, dictarū affectionū auxilia prodiiſſe, nūquid manifestè deprehendetur falsa illorum arrogātia qui dogmatici vocātur? ac ne simplex quidē illa reprehensio erit, sed gemina, atque vtraque fortis. Si enim vsque adeò

adeò vtile est experimentũ, vt nō solũ ci-
tra rationē inueniat remedia, verũ etiam
coarguat rationē tanquã apertè falsam, tan-
tũ abest, vt ratio dogmaticis medicis sit
vsi, vt etiã nocere videatur. Sed (vt aiũt) sa-
tis reprehẽditur id quod inutile esse ostẽdi-
tur. Quòd si ratio aliquãdo etiã nocere vi-
deatur, quod maius argumentũ desideras,
quo rationis vitiũ ostẽdatur? Porro multas

- 10 de principe vi animę ratiões, dialectico mo-
re interrogãdo inductas, vnã cũ affectorũ
locorum vñ, quibus euincere possis, in ani-
malibus affectibus, auxilia cordi adhibenda
esse, ita subitò contempsit Archigenes, alio-
qui in curãdi ratione exercitissimus, vt ne-
glecto pectore, capiti cucurbitulas adapta-
ret: ipsumq; licet haudquaquam affectum &
incideret & vreret. Num igitur per Iouem
mẽritus sum paulo antè, cũ dicerem ratio-
20 nalem viam, quod ad remediorũ inuentio-
nem pertinet, omnino prodi ab his scilicet
qui patriæ, quã sectæ suæ prodicionem
æquiori ferrẽt animo? quippe prodicionem
essẽ arbitrantur, si vera dicendo, dissiẽtien-
dum sit iis, quibus ea secta defenditur. Igitur
vt in præsentia turpem contentionem mani-
festè declarant, sic etiam haud obscurè de-
mentiam suam produnt: cũ putant omnia
sua decreta turbari, si aliquando vel in vno

Variorum reprehendantur. Placitorum enim alia, mu-
philosopho tuâ consequentia cohaerent, alia inter se pu-
rum *placi* gnant, alia neque consequuntur sese, neque
torum enu- pugnant necessariò: ut in hac ipsa de princi-
meratio. pali animæ potestate, quæstione: siue enim
 in corde, siue in capite sedem ei statueris, po-
 teris de naturæ elementis, quancunq; volue-
 ris eligere opinionem, cum priore sententia
 neque pugnando, neque cõsequens aliquod
 adducendo: haud secus de generatione quo- 10
 que & corruptione, de animæ essentia, de
 diis, de prouidentia, de fato: item genitus ne
 sit mundus, an ingenus, finitus, an infini-
 tus: præterea an plures sint mundi, numeroq;
 incomprehensibiles, an vnus duntaxat. quip-
 pe nulli iam dictorum placitorum repugnat,
 neque ad vllum ipsorum sequitur, ea quæ de
 animæ vi principali habetur opinio, siue in
 corde, siue in cerebro eam contineri dixe-
 ris. Itaque vniuersam suam sectam dogma- 20
Sedes ani- tici produnt, qui huiusmodi scribunt cura-
ma præci- tiones, cum de præcipua animi vi adeò ma-
phæ. nifestæ sint demonstrationes, ut omnibus
 ferè hominibus nota sit pars in qua residet,
 solis Medicis summisque philosophis qui
 in corde eam collocant, non appareat. De-
 monstrationes verò ipsas, in commentariis
 quos de Hippocratis Platonisque decretis
 edidi, iam dixi. Porro rationalem animæ
 vim

vim in cerebro, virilem verò atque irascibilem in corde, concupiscibilem in iecore sita esse, nemini nō persuasum est. Id quod quotidie dicentes audiendo, discere licet. Quippe fatuum aiunt cerebrum non habere: timido & pusillanimum, corde esse. Tityo verò ic *Tityus à curab* *taquila* erosum, non solum poëtæ, ve *vulture* rum etiam pictores sculptoresque fingunt. *Verg.*

Sed tempus est ut ad propositum redeamus.

10 Sanè in confesso est omnibus Medicis, si opera spectes quæ rationali potestate affecta laborantes faciunt, caput propriam ratio- *Caput p-* nis esse sedem. proinde consideremus oportet, qualis sit in vnaquaque affectione dispositionis *pria ra-* *tionis se-* sitio, de læsa memoria principium facientes: *des.*

siquidem de ipsa loqui statuimus, hæc autem *Memoria* affecto cerebro nobis occurrit, vitata simul *læsa.*

quodammodo ratione. Quemadmodum si ratio lædatur, memoriam quoque lædi

20 contingit, utriusque noxâ ab eadem dispositione procedente, quæ ubi vehementius intenditur, simul cum memoria ratio quoque deperditur: quæ affectio, stultitia nomi- *stultitia.*

natur. Sic in lethargo etiam, atque omnibus *Sopor.*

soporosis affectionibus, utræque pereunt. *Lethar-*

Atque dispositionem ipsam, secundum pri- *gus.*

imum genus, similem esse necesse est, nempe intemperiem. Iam enim explicauimus eam simularium partium, quæ primo operantur

Anima- communem esse dispositionē. Secundū ve-
 lia laten- rò alterū genus, frigida omninò intēperies
 tia. est: hæc enim animales actiones torpidas ef-
 † κατὰ πο- ficit: id quod animalia quæ per frigora late-
 ρις. re cogūtur, haud obscurè declarant. Id etiā
 Lactuca. in frigidis medicamentis videre est, ac frigi-
 Capitis dis quoq; cibis: siquidē lactuca† graues indu-
 grauitas. cit somnos, si multā ipsius quantitatem quis
 Apophle- ingesserit. Verūm etiā capitis grauitates, quæ
 gmatif- videlicet sine mordaci infestant dolore, so- 10
 mi. mnium, soporēq; afferunt, quibus apophle-
 Vigiliæ. gmatismi magnificè opitulari videntur. Ad
 Sopor. hæc non mediocri argumento sunt, capitis
 Balneæ. & ardor & refrigeratio, siquidē ardor, vigi-
 Vini mo- lias: refrigeratio, soporē inducit. Itē biliosi
 derata po- calidiq; morbi, vigilias, deliria, phrenitides:
 tio. contrā, pituitosi frigidiq;, ignauiam, sopo-
 Humidi- remq; efficiunt. Quippe quod ad vigilias so-
 tas & fri- poresq; per morbos pertinet, calida frigida-
 giditas que intemperies, primam sibi facultatē ven- 20
 præter na- dicat: altera verò ab hac, ad humiditatem ari-
 turam. ditatemq; refertur. Nam balneæ, eò quòd ca-
 † τρυφε- put madefaciunt, soporiferæ sunt. haud secus
 α, alias tes: atque† ex ætatibus pueritia quidem, ob
 ἀρετα. humorem somnolenta est. Senes verò, ob
 † 3. Apho. ariditatem, vigiliis vexantur. Igitur omnia
 24. in cō- hæc argumento esse possunt, ad animi
 men. Gal. ignauiam inducendam, humiditatem præter
 naturam

naturam, secundas partes obtinere: frigiditas De sen-
tem verò priores. Proinde ut humiditas ab *bus. 3. A-*
dans, vel sola, longos profundosq; somnos: *pho. 3.*
ita & ariditas quoque sola, vigilias efficit. de
quibus dispositionibus ab Hippocrate di-
ctū est: Somnus aut vigilia, si alterutrū mo-
dum excessit, malū est. Quod si frigus cū hu-
more vehementer intendatur, soporem, stu-
poremq; constituit: sine hoc verò, memorię
10 nocet, stultitiāq; inducit. Quum itaq; nō
solū in frigiditate humiditateq;, verū etiā
in ariditate, & calore, non paruum, secun-
dum magis & minus, sit discrimen: nihil
mirum si multifarię inueniantur causę, quę
animales actiones lædere possint. Cæterū *Actiones*
clarioris doctrinę gratiam, rationalis animę *principa-*
actiones, principales: irrationalis verò, mo- *les.*
rales vocentur: sed has in præsentia silentio *Actiones*
præterire decreuimus, nondū enim vel cor- *morales.*
20 dis, vel iecoris affectus tractare proponimus.
Igitur quemadmodum somnus, & vigilia,
si modum exceßerint, ille ob humiditatem,
hęc verò ob intemperantiam fit aridam: ita
& in his ipsis, & magis, & minus, tum in
sommis, tum vigiliis, sequitur maiorem
aut minorem, vel humiditatem vel siccita-
tem. Cumque bifariam (ut iam declara-
tum est) fiant huiusmodi intemperies, du-
plex quoque erit vtriusque dispositionis

modus : vnus quidem in humidis ficcis-
 que humoribus, alter verò in corporibus so-
 lidis, si aliquando in easdem intemperies so-
 lidæ partes atque humidæ inciderint. Præ-
 terea quamuis iam dictæ temperies sint con-
 trariæ, fit tamen ex ipsis mixtum quoddam
Vigilās so temperamentum, vt in vigilanti sopore,
por. quum pituitosus biliosusque humor abun-
 dauerit. Ita in calidi frigidiq; contrarietate,
 eosdem quoque modos inuenire licet, tum 10
 simplicibus intemperantiis, tum ex amba-
 bus compositis. Pituitæ enim si bilis mi-
*Mixta dis*fficeatur, flauam dico, mixta fit ex calido fri-
positiones. gidoque dispositio. Quod si in solidis cor-
*Qualis ty*poris partibus mixtam in contrariis dispo-
*phomania*sitionem fieri fateamur, tres ab ipsa prodi-
*primo pr-*bunt ex vtraque contrarietate intemperies.
rhetic. Igitur huiusmodi affectus omnes cerebro
 aduenire solent, sed inter se differunt, non
 solum mixtionis varietate, aut eo quod 20
 magis minusve intenduntur, tum in sim-
 plicibus, tum mixtis dispositionibus: ve-
 rum etiam quod ventriculi cerebri inter-
 dum afficiuntur huiusmodi intemperan-
 tiis, interdum vniuersa eius vasa, aut humi-
 ditas quæ per corpus cerebri dispersa est.
 Accedit ad hæc quartus quoque modus,
 quum videlicet ipsummet corpus cerebri
 intemperatum redditur.

De

De stultitia, sopore, lethargo, phrenitide, mania, & convulsione.

CAPVT

V.

QVorum itaque vel memoria, vel intellectus perit, somnos obseruare oportet (quippe intellectus amissio stultitia est) *In stultitia som-*
 vtrum vehementer, an modicè somnolenti *nus obser-*
 sint, aut omninò non somnolenti, sed quan *uandus.*
 tum ad somnum pertinet, secundum naturã
 10 sese habeant. Sic enim vincentem inuenies
 intemperiem. Præterea considerandum est,
 vtrum excernat quippiã, vel ex naribus, vel
 ab ore, quòd à capite defluat, an aridæ huius
 modi partes sint: quippe ex iis dispositionẽ
 ipsam coniecturã cõsequi poterimus. Quẽ
 admodum in destillatione & grauedine vsu *Destilla-*
 venit: siquidem in iis, & qualitas & quantitas *tio.*
 excrementorum, atque causarum quæ præ- *Grauedo.*
 cesserunt contemplatio, capitis dispositio-
 20 nem declarat: siue calida fuerit, vt in vstio-
 ne: siue frigida, vt in refrigeratione. Nisi
 enim omnia hæc discretè cognoueris, ido-
 neam dispositioni curationem haudqua-
 quàm inuenies. Cùm igitur vel perit, vel *Amissa*
 grauitèr lasa est memoriã, frigida omninò *memoria.*
 intemperies est: quocirca calefacere ipsam
 oportet: at verò exiccare, aut humectare, nõ
 necessarium est: sed si humiditati copule-
 tur, arefacere: si ariditati, madefacere. Cæ-
 terum

terum si inter has mediū ob tinet, ipsum con-
seruare oportet. Equidē noui quendam, qui
ob laborem in studiis atque vigilias, memo-
riam penē amiserat, laesa etiam ratione. Item
agricolam, qui ob labores quos vites colen-
do subierat, ac tenuem victum, eodem mo-
do affectus est, atq; ij certum est quod exic-
cantibus, calorificisq; lædebantur, madesa-
cientia verò, quæ calefaciendi quoque vini
haberent, haud mediocri ipsi serāt præsidio. 10

Lethar- Itaque læduntur etiam cū febris principa-
gus. les animæ functiones, vt in phrenitide, & le-
Phrenitis. thargo: interdum sine febris vitium est, vt in
Mania. mania, & melancholia: id quod modò per
Melancho- consensum, modò primaria affectione cere-
lia. bro laborāte accidit. Quum igitur propriis
accidentibus exactē discernuntur huiusmo-
di vitia, & perpetua sunt, neque aliis præce-
Primoge- dentibus superuenerunt, primogenia affe-
nus affe- ctione: quū verò propriis accidentibus discer 20
ctus. ni non possunt, neque perpetuè permanent,
Affectus atque ad alias affectiones consequuntur, per
per consen- consensum ipsa constare dicimus. Neque
sum. latere nos debet vbi per consensum quis af-
ficitur, fiatque adhuc affectio, quod deletis
efficientibus ipsam causis, ipsa quoque si-
mul deletur. Si verò consentientes partes
permanentem iam habeant dispositionem,
quamuis quiescat causa efficiens, ipsa ta-
men

men permanebit affectio. Igitur quòd in cerebro cōsistant omnes principaliū animæ virium affectus, in confesso habent omnes Medici, nisi quis vni fortasse sectæ addictus, aliter in animo sentiat, aliter depromat ex ore. At qualis sit intemperies, nō sine negotio inuenitur, medicūq; requirit, non qui laboret quomodò antiquis cōtradicat de animæ principatu, re adeò aperta, & perspicua,
¹⁰ vt eam in cerebro esse, etiam inter priuatos conueniat: sed qui laboriosus sit, & inquirendo non defatigetur. Sed philosophis fortasse, vtpote in angulo sedentibus, facilius pro hoc errore quis veniam dederit. Medicis verò, qui iam in operibus ad senectutem vsque versati sunt, ignosci sua contendendi libido, vel dicam veriùs impudentia, nō debet: quippe qui vigilantibus, delirantibus, phreniticis, lethargicis, caput irrigare consueuerunt.
²⁰ Nam & Archigenes quoque, vbi vitiata memoria medicanda est, aut stultum medicari aggreditur, capiti remedia adhibet. Quis vnquam exercitatus Medicus apoplexiam, morbum comitiale, opisthotonon, emprosthotonon, tetanon, aliter curauit? quis denique mediam partem corporis resolutam? Nunquid verò vbi nerui conuulsione afficiuntur, omnes Medici vel experimenta etiā professi, summā curationis
esse

esse censent, primis vertebris remedia adhibere? quemadmodū vbi media quoq; vniuersi corporis pars resoluta est. Porro cerebrum quoque calfaciunt, quemadmodum apoplecticos quoque curare consueuerunt. Sic etiā per morbum comitiale. At quum vel in stomacho, vel in alia quapiam parte affectio consistit, eam maximè & in primis curare præcipiunt. Cerebrum verò ita præparant, vt nō ita facilè afficiatur. Hæc itaque 10

Hi Ari-
stote. se-
quantur
lib. 3. cap.
5. de hist.
animal.

potissimū inquirenda sunt, non principa-
lis animæ vis, quam nemo, nisi peruersa fue-
rit mente, non apertissimè cognoscit. Ne-
que neruorum originem, diuinātiū mo-
re, à diis petere, sed ab experto dissecatore
discere oportet. † Sunt enim nonnulli qui
sibi iam persuaserunt, neruos à corde oriri,
eo quòd nequeunt inter syndesmium, ner-
uumque discernere: quibus nonnihil etiam
suffragari videtur ipsa homonymia: quippe
copulæ, à multis medicorum, colligantes
nerui appellantur. Verū nulla vexabimur
nominis inuidia, si modò non syndesmos
ipsos, sed voluntarios (vt ipsi aiunt) neruos
intelligent, quos scilicet à cerebro initium
accipere dicimus. Neque enim illi, aut con-
gamenta

Et quicquid aliud ex angue membranosūmve veteri r sur-
patione comprehendit. 6. Epid.

uulso

uulsionem, aut paralyfin, ad syndesmos re-
ferunt: sed eorum neruorum qui voluntatis
imperio obediūt, affectionem esse dicunt.

Contuulsio enim vniuerso corpore, omnes *Contuulsio.*
quidem autumant affici talem quampiam
partem, quæ vt in arbore caudex ramorum,
sic ipsa sit omnium neruorum communis
origo: idq; veluti caudex, nō paucorum in
vna parte, quemadmodum ramus, vt si vel
10 crus, vel altera manus fortè fortuna conuel-
latur, totius membri cōuulsio, neruorū qui
ad ipsum proueniūt, originē affectam fuisse
declarat, rami cuiuspiā exemplo in arbore.
Quod si vniuersum corpus afficiatur, com-
munem originem omniū infra faciem ner-
uorū, quæ arboris caudici proportionē re-
spondet, affectam esse putandum est: quæ
sunt primæ spinalis medullæ partes. Proin-
de exercitatisimi quiq; medici huic reme-
20 dia adaptant: cordis verò in hac affectione
nullam omnino mentionem fecerūt. Si ve-
rò simul cum vniuerso corpore, facies quo-
que conuulsa videatur: nō solū eam par-
tem quæ ex spina procedit, verū etiā ce-
rebrum ipsum curamus: etenim labra quo-
que sæpenumero conuulsa videmus, item
oculos, frontis cutem, totā mandibulam, si-
militer & linguæ radicē. At quia omnes iam
dictas partes, à musculis ex cerebro ner-

uos

uos suscipientibus, moueri ex anatomica di-
 dicimus, cerebrum, ipsis sic laborantibus, cre-
 dimus esse affectum: vbi verò ipsis illæsis, ce-
 teras partes conuelli viderimus, spinæ initiū
 affectum esse fatemur. Hæc igitur sunt quæ
 promptè discere, mox ipsorū dispositiones
 cōsiderare oportet. Sed sunt nōnulli medi-
 ci, qui dispositiones ipsas ne aggrediuntur
 † *2^a Ep.* quidem [disquirere] sed certant super rebus
 manifestè apparentibus, iacturamq; tempo- 10
 ris nos facere cogunt, quod non erat consu-
 mendum respōdendo iis, qui recta medico-
 rum [veterum] decreta euertunt, sed inueniē-
 do potiùs ea, quæ illi silentio præterierunt:
 & vel haudquaquàm res ipsas definierunt,
 aut eas sine demonstratione aut sine idonea
 definitione, aut non satis abundè explicaue-
 runt. Quemadmodū Hippocrates, vbi ner-
 conuulsio. uorum conuulsionem, vel ob plenitudinem
 Lib. 6. A. vel vacuitatem fieri dicit. Etenim verus est 20
 † *pho. 39.* sermo eius, quibus verò rationibus fulcia-
 tur, vt fides ei adhibenda sit nō popularibus,
 sed doctis dūtaxat viris, & qui diligenter pri-
 ma Medicinæ rudimēta didicerunt, notum
 est. Hæc igitur quum didicissem, facile mihi
 persuasi, conuulsionem fieri ob eas causas,
 quæ ab Hippocrate dictæ sunt. quippe si o-
 mnis motus qui à voluntate procedit, at-
 tractis musculis in eas quibus innascuntur
 partes,

partes, fieri videtur, neque possit fieri attractio, nisi ad suam originem retrahatur musculus: constat conuulsionem in conuulsis partibus factam, hac sola ratione à motu naturali differre, quòd præter voluntatem [nostram] fit. Itaque quemadmodum in eo, qui secundum naturam habet, voluntas in cerebro iuxta neruorum originem ordinata, motionis principium primis dat neruis, ac per ipsos musculis, ita si sine huiusmodi principio inuenerimus, quæ causa neruos conuelle-
 10 re possit, modum quo conuulsio fiat, nos iam scire non temerè profitebimur. Etenim si videris aliquando neruosa corpora, vt lyræ chordas, ob ambientis aëris immodicam intemperiem, adeò vehementer, vt rumpantur, intentas, haud difficulter intelliges, idem in animantium quoque neruis posse contingere. Sed quomodo affecto aëre téduntur chordæ vt rumpantur, si vel nimis aridus, vel admodum humidus sit? Nempe humor madefacit ipsas, vt in tumore præter naturam attollantur, qui mox eas extendit: ac veluti sol tergora arefaciens contrahit, ita siccitas, chordas & trahit, & extendit. Sic lora quoque
 20 quum ad ignem exiccantur, contrahi tendique videntur. His ita præcognitis, haud difficile inuentu fuerit, vtrum ab ariditate, quæ est humidæ essentiae defectus, & vacua

Voluntas

in cere-

bro, mo-

tionis prin-

cipiū ner-

uis præ-

bet.

Compara-

tio neruo-

rum ad

fides lyri-

cas & lo-

ra.

K

Ariditas. tione, an ab humoris plenitudine, quæ ege-
Repletio. stati aduersatur, & ab Hippocrate repletio
nominata est, affectus ipse prodierit. quippe
quum conuulsio fit vel à labore, vel vigilijs,
vel fame, vel sollicitudine, vel arida æstuan-
teque febri, qualem in phreniticis videre est,
causam eius esse ariditatem, vacuationem-
que rectè putaueris. Si verò remulento cui-
piam ac omnino pleno homini, qui videli-
cet in otio degit, id euenire conspexeris: non 10
abs re à contraria causa conuulsionem or-
tum habuisse iudicabis. Atqui euacuationi
contraria est repletio. Atque morbus quoq;
Morbus comitialis, conuulsio est omnium corporis
comitia- partium nō perpetua, vt in emprosthotono,
lis. & opisthotono: atque tetano (id est, neruo-
Epilepsia. rum rigore) videre est, sed quæ ex temporū
Nervorū accidit interuallis: neque solum hac re, sed
rigor. mentis quoque, ac sensuum oblesione, à iam
dictis conuulsionum generibus differt: vn- 20
de constat in supremis corporis partibus, ce-
rebro videlicet, hunc affectum consistere.
Cæterum velox eius discussio, crassum hu-
morem spiritus meatum in cerebri ventricu-
lis obstruentem, hunc maximè affectum pe-
perisse declarat, neruorū principio seipsum
quatientem, quo excutiat id quod noxium
est. Ac fortassis per morbum comitiale
conuulsio haud adfimilis est his quæ à spi-
nali

nali medulla incipiunt convulsionibus, sin-
 gulorum neruorum irrigatis processibus.
 Verum non ab ariditate vacuationeque, sed *A crasso*
 à crasso semper humore, hanc affectionem *humore,*
 induci, argumento est, quod & subito fit, & *morbis*
 soluitur confestim: nam subitariam mea- *comitia-*
 tuum obstructionem, à crasso viscoso que *lis.*
 humore fieri constat. Etenim breui tem-
 pore fieri non potest, ut vel cerebrum, vel
 10 tenuior ipsius membrana, ad tantam perue-
 niat ariditatem, ut corio simile quippiam
 pati videatur. Accedit ad hæc, ut is qui sic
 laborat, neque videat, neque audiat, neque
 ullo sensu quicquam percipiat, ac ne con-
 sequi quidem possit, quid factum sit. Si-
 quidem cum memoriæ viribus ratio quo-
 que læditur. Ex his igitur omnibus planè
 constat, in cerebro hanc affectionem consi-
 stere, impediende humore animalem spiri-
 20 tum qui in ventriculis eius continetur, quo-
 minus possit exire. Porro quamobrem hic
 spiritus vocetur animalis, aut quæ sit eius *Spiritus*
 potentia, in eo commentario, quem de *animalis.*
 Hippocratis Platonisque placitis scripsi-
 mus, iam demonstratum est. Sanè quum ea,
 quæ per dissectiones apparere solent, accu-
 ratè consideraremus, rationi consonum vi-
 debatur, animam in cerebri corpore sedem *Anima*
 obtinere, atque in ipso & rationis vim, & *sedes.*

sensibilium imaginum memoriã residere, ac primum ipsius instrumentũ, tum in sensibus actionibus omnibus, tum in his quæ à consilio & voluntate prodeunt, spiritum esse qui in ipsius ventriculis maximeq; postremo, continetur, quamuis non contemnendus sit medius ventriculus, perinde quasi non valentissimus sit: multis enim rationibus inducimur, vt hunc amplectamur, duos verò anteriores deferamus. Verũ exacta 10 horum notitia ad curationis inuentionem nihil ferè conducit. Nam satis fuerit ad probè curandum, nosse sedem affectam esse cerebri, atque in eius ventriculis humorem crassum & viscidum comprehendi. Igitur quemadmodum hæc ad curationes quarum gratiã, & affectas sedes, & earum dispositiones inquirimus, sunt vtilia: sic crassorũ quoque humorum differentia, vtrum videlicet

Pituita. pituita, an atra bilis naturã habeant, haud 20

Atra bilis. mediocriter ad curationem conferre videntur. Si tamen in præsentia nõ obliuiscamur pituitosos quidem eos nominari, quũ simpliciter ita dicimus, in quibus humiditas frigidaque: melancholicos verò in quibus siccitas atque frigiditas dominantur, quam-

Pituita differens. uis magnæ peculiareq; interim differentia, tum pituita, tum atra bilis inueniantur.

vis. Pituita quidem vnũ genus est, quod quotidie

tidie vel screando, vel vomendo, vel emun-
gendo educitur, vaporoso scilicet spiritu ple-
num, vt ne sensum quidem lateat, ipsum esse
dissimulare. Alia verò pituita, similis qui-
dem videtur, licet fortasse non sit similis,
qualis est crudus humor qui in vniuersis substat
tum is qui à Praxagora vitreus appellatur. *Vitreus*
Atque ex hoc genere esse videtur saliuua, quæ *humor.*
neque fluida admodum est neque aquosa. *saluua.*

- 10 Verùm saliuua non vnica duntaxat qualitate
gustum afficit, nedum vniuersa pituita. Sæ-
penuerò enim & acrem & acidam, & † sal- † *salsam,*
sam in ore saliuam, manifestè deprehendi- *vel à pu-*
mus, veluti cùm sani degimus, nulla qualita- *tredine,*
te infecta, sed perinde quasi aquosa, saliuua *vel à sal-*
gustui offertur. Sic atra bilis quoque secun- *se humi-*
dum substantiæ varietatem non obscuras *ditatis se-*
habet differentias. Nam alia est veluti fæx *rose mi-*
sanguinis, quæ admodum spissa est, facibus *xtione.*
10 vini haud ab similis. Alia verò, quā superior *Atræ bilis*
essentiæ est multo tenuioris, atq; vomenti- *differe-*
bus eam, & olfacientibus acida videtur, quæ *tia.*
etiam terram radit, attollit, & fermentat at-
que ampullas quales feruentibus iusculis su-
pernatate videmus, excitat. Sed ea quam
crassæ feci similem esse dixi, in terram effu-
sa, non inducit fermentationem, nisi fortè
in ardente feбри ipsam præassari contingat,
neque vlla etiam acida qualitate participat,

quando quidem & ipsam nominare cōsue-
 ui melancholicum succum, aut melancholi-
 cum sanguinem. Hæc enim, meo quidem iu-
 dicio, non rectè atra bilis appellari potest.
 Prouenit autem huiusmodi humor in qui-
 busdam plurimus, vel à temperie ab initio
 cōparata, vel à cibis, qui (quum inuenis con-
 coquūtur) in huiusmodi humorē transmu-
 tari solent. Igitur vt crassius pituitæ succus,
 ita hic quoque comitiale morbum solet 10
 efficere, vbi in meatibus ventriculorum ce-
 rebri retinetur, siue is medius sit, siue po-
 strems. Vbi verò in ipso cerebri corpore
 abundat, eam insanix speciem, quam Græci
 melancholiam vocant, efficit. Quemadmo-
 dum alter atræ bilis succus, qui præassata fla-
 ua bile nascitur, ferina deliramenta inducit,
 modò sine febre, modò cum febre, in cere-
 bri corpore abundans. Atque hanc ob cau-
 sam phrenitis nonnunquam mitior est, quū 20
 videlicet à pallida bile ortum contraxit: in-
 terdum vehementior, quum flaua bilis eam
 peperit: atque insuper alia nonnunquam de-
 ¶ Παρά- mentia occurrit ferina & melancholica, fla-
 πᾶσι, ua bile præassata. Deliria autem, quæ per fe-
 ψασι, brium vigores accidunt, non propria cere-
 ψονῶσι, bri affectione, sed per consensum fiūt: pro-
 ψασι, inde eos † delirare & desipere, non solūm
 κῶσι. Medici, sed priuati quoque dicere consue-
 uerunt.

uerunt. Verùm ita affectos non nominant
 phreniticos, eo quòd phreniticorum in-
 sania non quiescit, mitigato febrium vi-
 gore. Igitur quemadmodum phreniticis, fe-
 bris vnum quoddam accidens dispositio-
 num cerebri censetur: sic [è conuerso] in
 ardentium Febrium dementia, multis elatis
 ad ipsum vaporibus. Haud secus fit ea affe-
 ctio quæ suffusioni in accidentibus simila-
 10 tur, à ventriculi dispositionibus ortum tra-
 hens. Nam cerebrum ventriculo, & ventri
 culus cerebro, suas affectiones transmittit,
 idque propter nervorū à cerebro ad os ven-
 triculi descendendum magnitudinem, per
 quos etiam sensus huic particulæ, quàm vlli
 reliquarum corporis partium, acutior est.
 Quocirca capitis fracturas, quum ad mem-
 branas vsque perueniunt, biliosus vomitus,
 ac interdum dolores capitis quomodocun-
 20 que fiant, nausea, stomachique morsio co-
 mitatur. Hypochondriacas verò & flatuo-
 sas vocatas affectiones melancholica tristitia
 sequitur, haud secus quàm acutā febrem de-
 mentia, & quibusdam oris ventriculi dispo-
 sitiones, ea quæ in accidentibus suffusioni
 similatur affectio. Sic nervosis partibus in-
 flammatis, promptiùs quàm reliquis, deli-
 rium superuenire solet, idque ascendente ad
 caput interdum per continuas partes solo

Suffusio.

Sympa-

thia ven-

triculi cū

cerebro.

Capitis

fractura.

Hypochon-

driacæ

affectio-

nes.

Vapor. calore, interdum verò spiritu vaporoso, vel
Fumus. fumoso, aut fuliginoso.

Fuligo.

Multa ac ferè omnia quæ hoc capite dicuntur, in opusculo de melancholia scripta sunt, quod alij Hippocrati, quidam Galeno, nonnulli Ruffo & Possidonio attribuerunt.

De melancholia.

CAP. VI.

Porrò quæadmodum hæ passionēs, quibus caput per consensum afficitur, ita illæ quoque quæ primogeniæ ipsius affectiones sunt: non parum inter se differunt. Igitur crassi humores, qui in cerebri substantia abundant, interdum ei ut instrumentali, interdum ut similari parti nocent. Quum enim meatus obstruuntur, ut instrumentali: quum verò temperamentum alteratur, ut similari. Proinde totus hic sermo in fine 20
Hippocrati sexti libri de Vulgaribus morbis præscriptus est: Melancholici magna ex parte comitiali morbo afficiuntur, & contra morbo comitiali laborantes, efficiuntur melancholici. Atque horum utrumlibet magis accidit, prout vel in hanc, vel in illam partem, infirmitas repit: si enim in corpus, epileptici: si verò in mentem, melancholici redduntur. Hoc sermone primum quidem declaravit, quod

Crassi humores in cerebro.

Hippocrates libro Epide. 6. par. 8.

Epileptici.

Melancholici.

quod non semper, sed magna ex parte horum affectuum alter in alterum transit. Quippe non solum melancholicus succus, verum etiam pituita morbum comitalem committit. Igitur ea quam melancholicus succus constituit, in melancholiam transit: quæ verò à pituita parta est, in aliam affectionem, de qua paulò post dicturus sum, permutatur, melancholiam verò haudquaquam efficit. Altera verò Hippocratici sermonis pars, non paruum contemplandi locum desiderat. quippe quum anima sit aut temperamentum activarum qualitatum, aut ab ipsarum temperamento permutetur: Bilem, quum cerebro veluti parti instrumentali nocet, ad cerebri corpus conuerti ait, id quod in obstructionibus fieri constat. Quum verò temperamentum mutando, ei ut simili nocet, ad mentem eam repere dicit. Verum hoc quod medici dereliquerunt, definire in primis necessarium esse Morbus videtur. Nempe ut in manifestis corporis regius. partibus, interdum omnibus, eadem apparet temperies, ut in morbo regio, & elephante sic vocato, & aqua inter cutem, & aqua in malo habitu, quæ à Græcis cachexia dicitur. Cachexia. Insuper in his quæ ab hepate, atque splene pendent, colorum vitiis. Interdum Coloris verò vnius duntaxat partis, quæ videlicet vitium.

aut biliosum aut pituitosum [aut melancholicum] humorem suscipit, temperies permuat. Ita etiam cerebro accidit, ut nonnunquam vniuerso in venis sanguine melancholico effecto, ob commune vitium, ipsum quoque laedatur. Nonnunquam verò, reliqui corporis sanguine prorsus innocuo, solus is qui in cerebro contentus est, alteratur. idque bifariam fit. Aut enim aliunde in ipsum deriuatur, aut in ipso met melancholicus humor genitus est, quum videlicet internus calor aut flauam bilem, aut crassum atrumque sanguinem superassauit. At hæc distinctio non paruum habet in curatione momentū: siquidem vbi vniuersum corpus sanguinem melancholicum continet, curationem à venæ sectione incipere oportet. Vbi verò solum cerebrum, infirmus (quod ad hanc dispositionem attinet) sanguinis detractione non indiget, quamuis ob aliam quampiam causam sanguis mitti possit. Vtrum verò melancholicus sanguis vniuersum corpus, an solum cerebrum occupet, ita discernendum est. In primis vniuersi corporis habitū, qualis sit, consideres velim: meminerisq; quod molles, & candidi, & obesi nequaquam humorem habent melancholicum. Macri verò, & nigri, & hirsuti, & quibus latæ sunt venæ, aptissimi sunt, ut huiusmodi in ipsis humor

Sanguinis missio in melancholia.

Melancholici sanguinis nota.

† ἰσχυροὶ prærubri, hic enim ἰσ particula auget Galen^o
interprete, atque hoc maximè si tristi & meticulosa natu-
ra sunt,

mor cumuletur, sitque interdum vt † rufo non solum
colore homines, affatim in melancholicam in melan-
temperiem decidant: atque post hos flauī, choliam
idque maximè, quando & vigiliis, & multis incidunt,
laboribus, & sollicitudine, & tenui victu sue sed ele-
rint educati. Quibus hæ quoque notæ con-phantia-
10 ueniunt, an hæmorrhoidis aliqua restricta sit, sim, quæ
aut alia quæpiam consueta sanguinis vacua- tamen le-
tio, aut mulierum menstrua. Insuper quibus nior est.
cibis quis fuerit vsus, vtrum iis qui suapte na- Cibi me-
tura melancholicum sanguinem pariunt, an lancholi-
è diuerso. Porrò qui melancholicum sangui ci.
nem efficiunt, hi ferè sunt: caprina bubula-
que caro magisque hircinæ & taurinæ, sed
maximè asinorum camelorumque carnes,
nam & his nonnulli vescuntur: item vulpi-
20 næ caninæque carnes: atque magnam in
huiusmodi sanguinis generatione vim ob- Lib. 3. ali-
tinet ex lepore cibus, sed multo magis ex ment.
apris: ac limaces quoque melancholicū san-
guinem pariunt, si frequens sit eorum vsus:
præterea omnes terrenorum animalium car-
nes sale conditæ, aquatiliū quoque carnes,
vt thunni, balenæ, vituli marini, delphini, ca-
nis, atque cetaceorum omniū. Ex oleribus
autem, brassica ferè sola, huiusmodi san-
guinem

Lentiscū guinem gignere cōsuevit, quemadmodūm
 gignit Ita & arborum germina, vbi vel muria, vel oxy-
 lia, cuius halme cōdiuntur, præcipuè lentisci, terebin-
 resina ma thi, rubi, canirubi. Leguminum verò omniū
 stiche di maximè lentes, inter melācholicos cibos nu-
 situr. merantur, mox panis furfuraceus, & qui ex
 tipha, aque vitiatas seminibus factus est, quo-
 rum apud quasdam nationes vsus loco fru-
 menti habetur. Verūm de iis in primo libro
 de Ciborum facultatibus iam dictum est. 10
 Præterea vina crassa nigraq; aptissima sunt,
 vt ex ipsis melancholicus humor fiat, præ-
 fertim si quis abundè ipsa in gerens, obla-
 ta occasione in multo corpus calore conti-
 neat. Vetus denique caseus, vbi forte for-
 tuna in corpore fuerit supercalefactus, fa-
 cilè huiusmodi parit humorem. Igitur si
 quis antea quàm in morbū inciderit huius-
 modi victus ratione fuerit educatus, maiore
 quandam inde licet facere coniecturam. Si 20
 verò boni succi cibis vsus fuerit considerare
 oportet exercitationes ipsius, mœstitiam,
 vigilias, sollicitudines. Sunt etiam nonnulli
 Melancho qui per febriles (vt dictum est) morbos me-
 licus mor lancholicum humorem contraxerunt: atque
 bus per fe ad edificatiore notitiam nō parum confert
 briles mor anni tempus, ac præterita præsensque con-
 bus cōtra- stitutio, item terra, ac laborantis atas. His
 Etus. itaque omnibus præmeditatis, quum spera-
 ueris

neris in vniuersi corporis venis melancholice. Vena mel-
 licum sanguinem contineri, quo certiore dia in me
 habeas notitiam, cubiti venam seca, præci- melancholicis
 pueq; mediam, quæ cõmunis est, & ei quæ secunda.
 humeralis nominatur, & ei quæ per axillam
 ad manũ fertur. Quòd si tum fluens sanguis † Statim
 nō videatur melancholicus, † statim suppri- quidẽ, hoc
 matur. Si verò talis appareat, vacua quātum est detra-
 pro laborantis corporis habitu satis esse cõie- Etis fere
 10 ceris. Est prætereà tertiũ melancholiæ ge- vncijs
 nus, morbi comitialis exemplo, quũ ortum duabus,
 à vètriculo habuerit. Solentq; Medicorum quia ali-
 aliqui hãc dispositionẽ hypochondriacum quãdo ef-
 flatuosumq; morbum nominare. Verũ sa- fluit pri-
 tis mihi fuerit ea accidentia percurrere, quæ mum te-
 à Diocle præscripta sunt illi assidere, in libro nus, sta-
 cui titulus est, Affectio, causa, curatio, in timq; cras
 „ quo Diocles ad verbum ita scripsit: Porro sior san-
 „ alius oritur à ventriculo morbus, qui suprã gus conse-
 20 „ propositis non dissimilis est: nominaturq; quitur.
 „ ab aliis melancholicus, ab aliis flatuosus, Melancho
 „ quem sumpto cibo maximè coctũ difficili, lia à ven-
 „ & caustico, sputum humidum, idemq; mul- triculo
 „ tum comitatur: item ructus acidus, flatus, orta.
 „ æstus, in præcordiis fluctuatio nō illico, sed Hipochon-
 „ quum retinuerint, interdum vètriculi quo- driacus
 „ que vehementes dolores, qui nonnullis ad flatuosusq;
 „ dorsum vsque procedunt, concoctis deinde morbus.
 „ cibus quiescunt, mox aliis ingestis eadem Diocles.
 rursus

rursus reuertuntur accidentia: quæ interdum “
ieiunos, interdum etiam à cœna molestant, “
atque euomunt crudos cibos, & pituitā, vel “
subamaram, vel calidam, vel acidam: adeò “
vt nōnunquam dentes torpedine affician- “
tur. Atque horum plurima ab ineunte statim “
ætate eueniunt. Vtunque tamē acciderint, “
omnibus in tempus produciuntur. His præ- ”

Causæ fla ita scribit: Cæterum flatuosas vocatas su- 10
tuosæ me- spicandum est, plus caloris quàm decet ha- “
tanchole. bere in his venis, quæ alimentum à ventri- “
culo excipiunt, sanguinemq; in ipsis crassio- “
rem factum. quippe constat has venas esse “
obstructas, vel hoc argumento, quòd ali- “
mentum corpori nō distribuitur, sed in ven- “
triculo manet incoctum, quum ipsum mea- “
tus antea susciperent, magnam ipsius partem “
in imum ventrem excernerent, tum quòd “
postero die vomitu reiciantur, vtpote non 20
digestis per corpus cibis. Sed quòd calor id “
quod secundum naturam est excedat, facil- “
limè intelliges, tum ab æstu, qui ipsis acci- “
dit, tum ab his quæ ingeruntur, siquidem iu- “
uari videntur à refrigerantibus cibis, qui vi- “
delicet calorē refrigerare extinguereq; so- “
lent. Deinde alia quoque Diocles iam pro-
positis in hoc sermone addidit: Aiunt au- “
tem nonnulli, os ventriculi quod intestinis “
con

„ continuantur, in huiusmodi passionibus in-
„ flammari, ac ob inflammationem ipsam &
„ obstrui & prohibere, ne alimenta statuto
„ tēpore ad intestinū descēdant: quamobrem
„ diutius quā decet, in ventriculo manen-
„ tia, & tumores, & æstus, atque reliqua quæ
„ prædicta sunt efficiunt. Hæc sunt quæ Dio-
cles quidem literis prodidit. verū in hoc
symptomatū catalogo præcipua totius cō-
10 cursus accidentia silentio præteriit, quæ vi-
delicet & melancholiam, & flatuosam hy-
pochondriacamq; affectionē, tanquam cha-
ractere quodam designant. atqui omisit (ut
puto) huiuscemodi accidentia, eo quod ex
„ morbi ipsius nomine manifestè declarātur.
„ Etenim ab Hippocrate didicimus: Si metus Hippocr.
„ & mœstitia longo tempore tenent, melan- li. 6. aph.
cholicus est huiusmodi affectus. Verū 23. & 7.
haud absurda quæstio est, quare Diocles aph. 42.
20 quū causas aliorū accidētū redderet, quam
ob causam mens lædatur, non scripsit? siue
enim venarum, quæ ventriculo contiguæ
sunt, calor exuperat, siue partes quæ iuxta
portā sunt (Græci pyloron vocant) inflam- Pylorus.
matione laborāt, quid causæ sit, cur melan-
cholica comitentur accidentia derelictum
est. Etenim quod vter flatuoso spiritu im-
pleatur, ac deinde eructando ipsum leue-
tur, ac præter ea quæ dicta sunt, vomitione
quoque

quoque inueter, vel nihil dicente Diocle,
manifestum est. At propria melancholice
accidentia simul cum dicta ventriculi dispo-
sitione scribere, haud ita facile ei fuit. Id
itaque addere, ac simul qualis sit in huiusce-
modi affectibus ventriculi dispositio, ma-
nifesta interpretatione enarrare aggredia-
mur. Atque videtur quidem in ipso inflam-
matio esse. Sanguis autem in parte inflam-
mata contentus, & crassior, & atræ bili ma- 10
gis cōformis. Itaque quemadmodum elata
ex vētriculo ad oculos fuliginoso quodam
aut fumoso halitu aut crassis quoque vapo-
ribus similia, vt in suffusione accidentia cō-
tingunt: eadem ratione sublata ad cerebrū
ab atra bile euaporatione veluti fuligino-
sa fumosaq; melancholica eueniēt in men-
te accidentia. Quinetiam quā frequentif-
simè videmus, flaua in ventriculo bile con-
tenta, caput dolore affici, mox ea per vom- 20
tum eiecta, illico dolorem mitigari. Atque
huiusmodi dolorū genera mordendo exe-
dendoq; infestant, quemadmodum alia gra-
uitate, alia tensione, alia cum mētis delatio-
ne molestare videntur. Atq; inter optimos
medicos conuenit, non solū hanc acciden-
tia, verū etiam morbum comitalem ca-
piti à ventriculo procedere. Igitur vt melan-
cholicos timor nunquam deserit, ita præter
natu

naturam eis per imaginationē vīsa, non semper eodem genere cōtinentur. Siquidē alius testam se factum putavit, atque idcirco obuiantibus cedebat, ne collideretur: Alter gallos cantare audiens, vt hi alarum ante cantum, sic ille brachiorum plausu latera quatens, animantium sonum imitatus est. Fuit item alter, timens ne Atlas, qui mundum sustinere dicitur, grauatus sub tanto onere ipsum à se excuteret, atq; ipse cū illo collideretur, ac nos quoq; cū ipso periremus. Sunt alia huiusmodi infinita eorū vīsa differunt autem inter se melancholici. Nam omnes timement, mœrent, vitam damnant, odio habēt homines, sed non omnes mori cupiunt. Et enim hoc ipsum nonnullis melancholiæ caput est, quod mortem pertimescunt. Quodam etiam alieno admodū atq; extraneo videbis animo, vtpote qui simul & mortem metuant, & tamen mortem sibi consciscant. Proinde rectē videtur Hippocrates omnia ipsorum symptomata in duo hæc coëgisse, metum & mœstitiam. Mœstitia nimirū eos inducit, vt odio prosequantur omnes quotquot viderint, nunquā nō tristitiam præ se ferentes, ac terrentur, vt in tenebris profundis pueri, & atque ex adultis indocti. Cur me Sanē quemadmodū externæ tenebræ omnibus ferē hominibus pauorem inducūt, timeant.

L

† *πρω* nisi vel audaces admodum, † vel edocti fuerint, sic atræ bilis color mentis sedem tenebris similem reddens timorē efficit. Etenim summis tum medicis tum philosophis in cōfesso est, & humores, & omnino corporis temperaturam animæ actiones in alterare seu mutare posse. id quod nos quoque unico commentario docuimus, quo demonstratum est, quod animæ potentia corporis temperaturam sequuntur. Quocirca humo- 10

Erasistr. Erasistratus est, ne scribere quidem de melancholia quicquam ausi sunt. Neque indignum est admirari tum cōmunes hominū sententias, tum plurima quoque dogmata, quæ & philosophi & medici per ignorantia præterierunt. Igitur ab omnibus affectus ipse melancholia vocitatur, indicante nomine humorem qui ipsius causa est: quumque circa ventriculum prima inceperint acciden- 20
tia, ipsisq; auctis melancholica sequatur affectio, deinde alui deiectione, & vomitu, & proba concoctione, ructibusque leuetur is qui laborat, hypochondriacum flatuosumque morbum ipsum nominabimus. Accidentia verò ipsius dicemus, & mæstitiam, & metum. Quum autem propria melancholia accidentia auctiora videntur, circa ventriculum verò aut nulla aut parua ad

admodum sunt, haud abs re existimaueris
 primitiuam in cerebro affectionem cōsiste-
 re, ob atram bilem in ipso congestam. Cæ-
 terum quibus signis discernatur, vtrum in so-
 lo cerebro, an in vniuerso corpore huiusce-
 modi humor contineatur, paulò antè di-
 ctum est. Interim monendi sunt mihi ami- *Quomodo*
 ci, qui me curantem viderunt, frequentibus *melancho-*
 balneis, victuque humido, bonique succi, *liam cu-*
 10 nullo alio adhibito præsidio huiusmodi *rauerit*
 me morbum curasse, ubi nondum ob lon- *Galenus.*
 gum temporis tractum nocuus humor mul-
 tum vacuationi resisteret. quum enim diu-
 turnus iam factus est morbus, fortiora præ-
 dictis oportet adhibere remedia. fit autè hu-
 iusmodi melancholiæ species, affecto prius
 calidis dispositionibus cerebro, aut æstua-
 tiõe, aut inflàmatione, aut phrenitide quoq;
 ipsum afficiente, interdum à solitudine,
 20 mœstitia, vigiliis. verum satis fuerit hæc de
 melancholia dixisse.

De morbo comitali.

CAPVT VII.

ATq; de morbo comitali deinceps di- *Morbi co-*
 cendū est, quando quidem hic quoq; *mitialis*
 interdum ipsomet affecto, interdum aliis cō differen-
 sentiente cerebro euenire solet. vt enim *tia ex spe*
 tria melancholiæ genera, ita hunc quoque *cies.*

morbum tribus contentum differentiis, omnes ferè Medici distinguere neglexerunt. Verum omnibus comune est, quod cerebrum afficitur, vel consistente in ipso affectu, id quod pluribus epilepticis accidit, aut à ventriculi ore (quod stomachum vocare solent Medici) ad cerebrum per consensum ascendente. Atque hoc genus proportionè respondet accidentibus, quæ oculis à stomacho adueniunt, veluti in suffusionibus. Fit etiã sed 10
rarò, tertia morbi comitialis species. Nec refert siue genus siue differentiam nominaueris, cum à parte aliqua cui id fortè fortuna accidit, incipit affectus, qui deinde sentiente

Humoris aegro ad cerebrum vsque ascendit. Hoc genus
ad caput nus primum vidi in puero, qui decimum tertium
in epile- tium ætatis annum agebat, quum equidem
psia ascen- adolescens etiam dum cum optimis eius tem
pus. pestatis medicis conuenissem, ad idoneam
† *Al. ilia.* ipsius curationem inueniendam: audiui 20
Cuidam tum narrante puero, dispositionem ipsam
à parte pe ex tibia initium capere, mox illinc rectà ad
dis superio scendere per femur, & imminentes illi lum-
re, quæ ob- bos, ac per latera ad ceruicem, donec ad ca-
uertitur

plantæ, aura frigida ad os ventriculi euadebat: ubi ille epilepticus concidebat. Postea vehementer curuato in ventres corpore, doctus est aura cursum intercipere, atque ita sese casu liberare.

put

- put perueniret, quod quum primùm tangeret, ipsum haudquaquàm sibi constare. Interrogantibus autem medicis, quale esset id quod ferebatur ad caput, nihil habuit puer quod responderet. Alius deinde adolescens compos mentis (quippe qui satis poterat & sentire quod fiebat, & alteri enarrare) dicebat veluti frigidam quandam auram esse id quod ascendebat. Vnde ex duobus alterum
- 10 Pelopi præceptori placuit, aut quòd qualitas quædam alteratis per continuationem partibus, aut spiritalis quædam substantia transmitteretur. neque mirandum esse dicebat, tam validam vim esse humori, qui in affecta parte præter naturam genitus fuisset, vt perniciosarum ferarum venenis possit cõparari. Quisenim crederet vel à scorpionibus infixò aculeo, vel à phalangiorum ictibus totum corpus ingēti & inusitata mutatione
- 20 affici? nisi sæpenuerò id accidere videret. præsertim minimam quandam rem feris in ipsum demittentibus. Quum itaque phalan- *Phalan-*
gium aliquem momordit, quamuis paruum *gium.*
fit animal, existimare tamen debemus, ve- *Turtur*
nenum ex ipsius ore in ictum corpus de- *marina*
scēdisse. Porro marinæ turturis, quemadmo *venenosa*
dum & terreni scorpionis aculeus in par- *acuto fir-*
tem extremam acutissimam illam quidem *moq; acu-*
finitur, vbi nullum foramen est, per quod *leo pūgit.*

Scorpio. venenum deiici possit: necesse tamen est, vt excogitemus substantiã quandã esse aut spiritalẽ, aut fluidã, quã vt mole minima, ita facultate quã maxima est. Etenim quum nuper ictus quidã esset à scorpione, videor mihi videre (inquit) quòd grandine percussus sim: eratq; omninò frigidus, sudore etiã frigido accedente, sed tandem debitis adhibitis remediis non sine negotio seruatus est.

Causa morbi comitialis ex Pelopis sententia. Itaque Pelops, non impossibile est (inquit) in corpore similem aliquam essentiam generari, nò accedente causa extranea: quã vbi neruofam aliquam partem occupauerit, per continuas partes vsque ad neruorum principium vim suam transmittit, siue id per alterationem (vt ipse dicebat) fiat, siue spiritali essentia, veluti aura, ad ipsum elata. Sæpenu-
merò enim infigente aculeũ scorpione, aut in neruum, aut in venam, aut arteriam manifestè videmus percussos, vehementissimis infestari accidentibus. Atqui scorpionis aculeus totam cutem penetrando ad profundũ vsque potest peruenire. Phalangiorum vero paruorum ictus solam afficit superficiẽ. vnde constat interdum à sola cute venenĩ vim ad totum corpus deferri, quippe tota cutis & continua est & neruosa. proinde haudquaquã impossibile est, quum ex icta parte per totam ipsam celeriter distributa

buta fuerit veneni vis, eam inde eodē rursus
 contactu in singulas subiectarum ei partiū
 recipi, mox ex illis in alias continuas, atque
 iterum ex his, quæ afficiuntur, in alias: quū-
 que ad dominantium partium aliquam per-
 uenerit, tum mortis periculū homini insta-
 re. Ad hanc rem in primi, conferunt vincu- *Vincula*
 la superioribus partibus iniecta, ab iis enim *superiori-*
 præsentaneum præsidium expectatur: id quod *bus parti-*
 10 in viperarum scorpionumque ictibus, item *bus inie-*
 aspidum quoque (quod propter imminens *cta, vene-*
 subitariae mortis periculum, magis incredi- *nis reme-*
 bile est) expertus sum. Etenim quum Alexā *dū præ-*
 driæ essem, rusticus quidam non longē ab *sentaneū*
 vrbe in vno manus digitorum ictus, eius ra- *adferunt.*
 dicem apud palmam validissimo vinculo li- *† Græcè*
 gavit, accurrensq; ad urbem ad familiarem *enim est,*
 sibi medicum, totum digitum ab ipsa *† arti-*
 culi iunctura ad palmam abscindendum *διαρρη-*
 20 præbuit, sperans inde nihil se mali passu- *σας, quā-*
 rum. Neque frustratus est sua spe, quip- *quam Co-*
 pe nihil aliud faciens saluus euasit. Sinai- *pus videat*
 liter alium noui, qui epoto ex viperis *tur διαδι-*
 medicamento, rescisso prius digito, à peri- *σας legis*
 culo liberatus est. Vidi prætereā rusticum, *se, sed ma-*
lè.
 cuius totum digitum vipera momorderat, *Theriaca*
 qui falce quam tūc fortē habebat (erat enim *aduersus*
 vinitor) ab ultimo articulo ictam partem *venena-*
 resecans, deinde inducta vſitatis pharmacis

Medicamē in digito cicatrice, nullo sumpto medicamē
cōtra mor ne sanatus est. Sed puerum quoq; cuius mor
bum comi bus comitalis à tibia oriri cōsueuerat, medi
tialem.

ci qui tūc ad curationem eius cōuenerant, sa
 nare sperabant, si in primis vacuato vniuer
 so corpore, medicamen ex tapfia aut sinapi
 parti adhiberēt: ligato in medio membro, su
 pra eam videlicet partem, quæ primaria dis
 positione erat affecta, atque hoc pacto acces
 sionem reuerti prohibuerūt, quamuis antea 10
 quotidie puerum infestare consueuisset. Ve
 rùm hæc obiter, atque ex abundantia dicta
 sint, ne quis miretur, quo pacto ab ignobili
 aliqua parte tantus morbus ortum cōtrahe
 re possit. Superest vt causam inuestigemus,
 quamobrem in huiusmodi per consensum
 affectionibus epilepticæ fiant cōuulsiones.

Nam ne Pelops quidem vllam ad hanc rem

Quare in attulit probabilem persuasionem. Neq; etiā
comitali alius quisquam, cum quo nobis aliqua fue- 20
morbo fiāt rit consuetudo. Mihi verò per huiusmodi
epileptica consensum videnti aliquando laborantem
conuulsio sine vehementi conuulsione concidere, si
nes.

mul quòd per interualla breuib; quibuscūq;
 motibus quateretur, probabile visum est,
Singultus quemadmodum frequentissimè singultum
ex affecto fieri cernimus affecto stomacho, ita hanc
stomacho. quoque dispositionem euenire. Etenim
 me ipsum quoq; singultus illicò inuadere so
 let,

let, si piperis aliquando immodicā quantita-
tem ingessero. Id quod aliis quibusdā non
paucis, quibus scilicet facilis erat oris ventri- *Os vētri-*
culi sensus, accidisse meminimus. Atqui iam *culi stoma-*
suprà memoratum est, id non solūm Medi- *chus.*
cis, verūm etiam vniuersis hominibus sto-
machum appellari. Itaq; quum cecidissent,
qui nō ex propria cerebri affectione sed per
consensum comitali morbo laborabāt, eos
10 citra perpetuam conuulsionem † veluti pal- † *ὄσιον*
pitando per interualla concuti videbam. *παλμῶ-*
Proinde existimaui, similem aliquē cerebro *δι τινὰ*
motum euenire, qualis stomacho interdum *κλόνον.*
à re quapiam molestato accidere solet.
quippe quum à ciborum mole grauatur, aut
vbi corruptis cibis mordicūs infestatur, tum
singultu affici conspicitur. Atq; acrem quo- *Acris hu-*
que humorem, non singultū modò, verūm *mor sin-*
etiam conuulsionem per vniuersum corpus *gultū &*
20 efficere sæpenuerò consideramus: deinde *cōuulsionē*
vomitu eiecto eo, quod mordicabat, illicò *efficit.*
quiescere. Quo minus mirandum est, si ner-
uorum principium huiuscemodi motu con-
cutiatur, vt à se expellat, quidquid fuerit id,
quod à parte primò affecta ad ipsum effer-
tur. Ad hunc modum reliqua quoque acci-
dentia omnia quibus neruosum genus con-
cutitur, fieri putauerim vbi verò deperdi-
to sensu quis conciderit, non accidente mo-

Lethargus à vehementi frigore. Posteriori & medio ventriculo principatum visus est attribuisse, & intercepta via quæ ad spi-

nā est, & tu, quo vel cōuelli, vel palpitare videatur, id qua hæc à vehementi frigore ortum trahere censeo, postremo quo in genere lethargus quoq; continetur. ventricu- Apoplexiæ autem quod subito eueniat, aut lo commit frigidum, aut crassum, aut viscidum quid- titur, epilepiam, quod princeps cerebri ventriculos aff- p-rius fieri fatim implet, non totius substantiæ intem- & apople periem causam esse manifestum est: veluti le- 10 xius, scri- thargi, phrenitidis, mania, melancholie, stul- bit 6. E- titiæ, amissæ memoriæ, sensuum hebetatio- pid. nis, resoluti motus. Porro in omnibus his af-

Spiratio.

fectibus, in quorū numero apoplexia quoq; continetur, periculi magnitudinem ex anhelitus nocumento conicere oportet. Sanè quemadmodum dormientes spirant, quamuis nulla alia accidente actione, quæ à consilio prodeat, nimirum quum supini iaceant 20 in cubili: ita in soporosis affectibus omnibus quanquam neque sentiat corpus, neque moueatur, tamen sola spiratio, quæ musculorum pectus mouentium munus est, saluatur. cuius rei firmam ac demonstratiua lege stabilitam habemus scientiam: quemadmodum quod musculis etiam omnibus

Nervorum motus principium ab innatis ipsis nervis accedit. Atqui ex anatomice didicimus, ner-

uos

vos omnes à cerebro primarium sumere initium, neque simpliciter initium, sed primarium dixi, id quod spinalis medullæ gratiâ orationi adieci. Quâvis enim p multi ex ea nerui prodire videantur, vim tamen omnem quam habet, cerebrum ipsi suppetit. Quum itaque spirationem vehementer impeditam *Spiratio impedita.* difficulterq; procedentem videris, non par- uam in cerebro morbidam dispositionem esse, coniiicere debes, idq; in soporiferis morbis quos nimirum omnes in cerebro fieri manifestum est.

De vertiginosis.

CAP. VIII.

Affectus autem qui scotomaticus (id *Scotomati* est vertiginosus) vocatus est, ex ipsa *ci affectus* appellatione, qualis sit, manifestatur. quip- *nota.* pe à parua occasione † hebetantur hi qui † *† Scotomati* sic laborant, adeò vt interdum cadant, ma- *tas.*

20 ximè si aliquando in circum rotentur. si- quidem ipsis ab vna rotatione euenit, id quod cæteris à pluribus accidere solet: proinde hebescent, siue alium quempiam, siue rotam, aut id genus aliud quidpiam, aut ipsos quoque quos vocant, in aquis vortices circumagi viderint. Id verò maximè, quum vel sub sole æstuaauerint, vel aliam ob causam calefacto fuerint, capite. Nam quod aliis, quum in circo frequenter vertuntur, accidit.

cidit, hoc ipsis citra circuitione euenire videmus. Atqui vbi quis crebro vertitur, inaequalem, & turbuletum, & inordinatum motum, tum humorum, tum spiritus in eo fieri in confesso est. Rationi igitur consonum est, huiusmodi accidentia vertigine affectis itidem euenire. Quamobrem nonnulli horum

Arteriarum ab arteriarum sectione praesidium petierunt, *sectio vertiginosis* totas arterias pone aures ad tantam scilicet altitudinem secantes, ut medius inter duas *indicta apud antiquos.* partes locus cicatrice induceretur. Sed constat non omnes huius auxilij beneficio fuisse curatos. Etenim aliae arteriae iis maiores ad

cerebrum ex ipsius basi per retiformem plexum ascendunt, per quas huiusmodi affectionem fieri rationi consentaneum est, elato per ipsas vaporoso calidoque spiritu, atque implente cerebrum. Atque fieri etiam potest, ut inaequalis cerebri intemperies huiusmodi spiritum producat. Igitur hanc affectionem ad cerebrum pertinere ex ipso vertiginosorum

Origo vertiginosi affectus. sensu manifestum est. Oritur vero interdum, cerebro primogenio affectu laborante: interdum vero, quum ori ventriculi consentit, id quod Archigenes quoque fatetur, qui libro primo de Longarum affectionum notitia ita scribit: Porro ea bifariam oritur, aut enim in ipso capite, aut in his partibus quae circa praecordia sunt. Mox genera eius distinguere

stinguere aggreditur. Nam ubi exprimaria cerebri affectione, vertigo depēdet, aurium sonos, & capitis dolorē, grauitatemq; præcedere dicit: item olfactus, atq; alterius cuiusque sensus inde prodeuntis oblæfionem (hoc enim sermoni illi adnexuit, inde prodeuntis) eos sensus (vt equidem puto) significare volens, qui à capite initium sumunt. Vbi verò ab ore ventriculi oritur, cordis ^{IO} morsionem, nauseamq; præsentiri. Verùm vt iam antea sæpenumero monuimus, licet caput per alterius partis consensum afficiatur, affectio tamen nihilominus ipsi ascribenda est.

De cephalæa & hemicrania.

CAPVT IX.

ATque de ea quoque quæ cephalæa à *Cephalæa* medicis nominatur, nemo dubitauit. *definitio*
²⁰ rit quin cerebri sit morbus. Est enim (vt *& nota.* breuiter quis dixerit) affectus hic, dolor capitis diuturnus, difficulterq; solubilis, qui à parua occasione vehemētes habet accessiones, vt neque strepitū, neque vocē vehementiorē, neque luminis splendorē, neque motum tolerare possit infirmus: sed tranquillitatem, obscurumq; cubiculum quærat, idq; ob doloris vehementiam. Quippe nōnulli veluti malleo se percuti arbitrantur: alii caput

put contundi distendiq; sentiunt: non paucis ad oculorum quoq; radices dolor extenditur. Quin huiusmodi accessiones, veluti in morbo comitiali, intermissiones habent: interceditq; tempus, quo perfectè liberari videntur. Igitur cōstat, q; sicut in cephalalgia (id est capitis dolore) ita in hoc morbo caput facillimè afficitur: atq; hoc est ipsis commune. verùm per cephalæam affectæ partes multo reddūtur, quàm in cephalalgia, debiliores. Cæterùm inter capitis dolores nō nihil discriminis inuenitur. nam sunt nōnulli, quibus caput aptissimum est vt impleatur, ac vniuersi quoque corporis habitus, ad ipsum implendum admodum idoneus: Alij omnes capitis partes aptas habent vt afficiantur: quibus, vbi vitioso victu vtuntur, accidit vt cephalæa arripiantur. Quo minus mirandum est, si horum aliis, membranæ cerebrū continētes, dolore afficiantur, aliis pericranion, id est exterior caluariæ membrana. Discrimen autem ab oculorū radicibus sumitur, considerando vtrum veniat ad eas malum, necne siquidem cōsentaneum est, vt quibus intra caluariam dispositio est, iis ad oculorum vsque fundamenta dolor extendatur: eo quòd & à cerebro, & ab vtraque membrana, atque à vasis quæ in ipsis continētur, veluti germina quædam deducuntur. Sed &

Cephalalgia.

Dolorū capitis differentia.

10

20

&

& eorum quibus dimidia capitis pars dolore infestatur (solent autem vocari hemicrani) alij extra caluariam, alij in capitis interioribus partibus dolorem sentiunt. At verò dextram capitis partem à sinistra distinguit sutura per longitudinem ipsius protracta, sub qua intra capitis ossa, linea medium cerebri diuidens protenditur, ad quam etiam peruenit, anteriorum duorum ventriculorum septum. Porro ea corpora suapte natura idonea sunt, vt ipsis caput impleatur, in quibus vaporosus calidusque spiritus generatur, aut quibus biliosa excrementa cumulantur in ore ventriculi. Atqui spiritus dolores inducunt tensiuos, qui idcirco sic vocati sunt, quòd extensionis sensum inducunt. Biliosa excrementa dolore mordaci afficiunt. Dolores à plenitudine procedentes grauitatis sensum afferunt: quibus si rubor accedat atque calor, calidos, sed sine iis, non calidos humores significant. Sunt quibus caput assiduè dolet, vbi vel paulò liberalius vinum ingesserint, vel meracius, idque magis, si suapte natura calidum fuerit. Præterea calidi odores omnes, vt styracis: aut cypheos, atque in totum odorata omnia, capitis dolorem pariunt, adeò vt nonnulli ne thuris quidem odorem ferre possint. Neque verò absurdum est, vt quos

Hemicrania.

Tensiuus dolor.

Mordax.

Grauis dolor.

Sensus quosdam ob sensus exuperantiam dolor in-
oris vètri festet, quemadmodum in ore stomachi acci-
culi ex- dit. Sunt enim nonnulli, in quibus id tam
quisitus. exactè sentit, ut neque acie acetum, neque si-
 napi, neque aliud huiusmodi ferat. Alii verò
 contrà, ipsum penè insensibile habent. quippe
 videtur aliqui vel ructare vel vomere quæ-
 dam usque adeò vitiosa qualitate infecta,
 ut nos ne odorem quidem sustinere possi-
 mus, quum tamen ipsi interea nullam alicu- 10
 ius momenti mordacitatem sentiant. Nihil
 igitur prohibet, quo minus in hominum cere-
 bro similes notentur differentiæ, ut eosdem
 odores aliqui impunè sustineant, perinde
 ac si omnino ab ipsis distarent, alii eos sine
 molestia ferre non possint. Igitur quod
 omnes huiusmodi affectiones ad cerebrum
 pertineant iam manifestum esse videtur.

De apoplexia, nervorum resolutione, & con- 20
 vulsione.

CAPVT X.

AT verò nervorum resolutio, & per uni-
 versum corpus eorum convulsio, in
 quo genere nervorum etiam rigor (Græci
 tetanon vocant) continetur sensu ut prædi-
 ctæ affectiones cognosci non possunt, sed
 ratione quæ nos doceat, est opus. Itaque si
 aliquando per totum corpus, nervorum
 actio vitiosa redditur, ipsorum principium
 affe

affectum esse constat: id verò ex sola anatomice dignosci potest. Quum igitur omnes pariter nervi tum sentiendi, tum mouendi vim amiserint, apoplexia huiusmodi affectio appellatur: Vbi verò alteri laterum, aut dextro aut sinistro id accidit, resolutio nominatur, eius scilicet partis in qua consistit affectus, interdum dextræ, interdum sinistræ.

- Quòd si in aliquo membrorū idem euenerit, eiusdem membri resolutio esse dicetur. Nam & tota manus & totū crus interdum resoluitur, atque solus in crure pes, & quæ sub genu sunt. Sic etiam de tota manu similiter proportionem dicendum est. Caterū ex anatomice didicimus, quòd omnes animantis partes sub ceruice positæ, quæ à consilio & voluntatis imperio moueri possunt, nervos habent qui eas moueāt, procedentes ex spinali vocata medulla. Atqui sæpenu-
 10 merò audistis eam spinalem vocari medullam, additā scilicet medullæ appellatione, interdū verò sine additione simpliciter spinam nuncupari. Vidistis etiam in corporis dissectione, nervos qui thoracem mouent, ex ea spinæ parte quæ in ceruice est, ortum deducere: ipsa verò ex trāsuerso incisa, si tota fuerit dissecta, omnes quæ sub ipsa sunt corporis partes, sensu, motuq; priuari. vtpote suscipiente spina à cerebro, vim tum sen-

M

tiendi tum mouendi pro arbitrio. Præterea
Sectiones in Anatomice vidistis, vbi per trāsuerſas spi-
in spinali næ incisiones ad medium vsque secundum
medulla longitudinem secaretur, non omnes suppo-
quam no- sitas corporis partes, sed eas duntaxat, quæ è
nam ad se regione sectionis erant, resolutas: dextras
vant. quidem dextra spinæ parte dissecta, sinistras
 verò, vbi reliqua pars esset incisa. Itaq; ma-
 nifestum est, quòd circa primū spinæ pro-
 cessum factā aliqua dispositione per quam ¹⁰
 cerebri facultas quo minus ab ipsam perue-
 niat, prohibetur, omnia inferiora membra,
 demptā facie, sensu motuq; priuabūtur: vbi
 verò media eius processus pars fuerit affe-
 cta, non omnes inferiores partes resoluen-
 tur, sed vel sinistrae duntaxat, vel dextræ.
 Videntur autem huiusmodi resolutionum
 aliquæ faciem quoque infestare: sed tum re-
 solutum latus ad alteram faciei partem tra-
 hitur. Quumq; ex anatomice didiceritis, ²⁰
 nervos qui per faciei parte, sparsi sunt, à cere-
 bro demitti, si earum aliqua simul cum to-
 to corpore resoluta est, haudquaquam vos
 latere debet, resolutionis dispositionem in
 ipso cerebro cōsistere: vbi verò illæ per-
 manserint, spinæ initiū affici sciendum est.
Nervi fa- Accidit verò nonnullis vt faciei partes dun-
ciei affe- taxat afficiantur, quæadmodum & reliqua-
eti. rum quoque partium interdum aliquæ, vt
 lin

lingua, oculus, mandibula, labrum. Etenim
 nō omnibus ab vno loco principiū influit,
 vtpote quæ ex diuersis cerebri partibus ner-
 uos suscipiunt. Id quod in Anatomice haud
 obscurè cōspicitur. Igitur apoplexia omni- *Apoplexia*
 bus animalibus actionibus noxam inferēs, *magnitu-*
 cerebrum affectum esse manifestè declarat. *do.*

discernitur autem affectionis magnitudo
 ex noxæ quam spirationi infert vehemen-
 tia. quum enim naturalem ordinem pluri-
 mū egreditur, magnam: quum verò pau-
 lum impeditur, parua in cerebro no-
 xam esse coniicere oportet. Sanè omnium
 pessima spiratio putanda est, quæ & inter- *Pessima*
 mittitur, & magna cum violentia trahitur. *spiratio.*

Quippe vt mori cōtingit apoplecticos, ob
 id quod spirare non possunt: sic homo qui
 corporis partes mouere nequit, ad vitæ fun-
 ctiones censetur inutilis, quamuis huic subi-
 20 tæ mortis periculum haudquaquam immi-
 neat. Itaque vidimus quendam, qui reliquis
 partibus omnibus resolutis, nullam quæ ad *Resolutio*
 faciei partes pertineret, actionē amisit, ser- *nes varia.*
 uata etiam spiratione: quomodò enim vi-
 uere diutius potuisset, ipsa deperdita? In quo
 affici putauimus illam spinæ partem, quæ
 paulò inferior est, processu nervorum ad
 septum transversum tendentium: quinetiam
 & vrinam, & alui sedimina ipsum præter

voluntatis imperium emisisse manifestum est. Insuper vidimus alium, cui propter casum omnes inferiores partes demptis manibus resolutæ. Igitur quemadmodum corporis partes quæ sub facie constitutæ sunt, resoluuntur, faciei partibus illæsis, affectionem in spinæ initio esse certum est: ad eundem modum, si toti corpori conuulsio acciderit, eundem spinæ locum affectum esse declarat, faciei partibus omnino seruatis illæsis. Quod 10
 si hæc quoque afficiantur, cerebro noxam iam illatam esse ostenditur. Vbi verò pars aliqua conuulsa est, neruum qui eius motioni deputatus est, aut musculum affici necesse est. Igitur si ex Anatomice neruorum ad singulas partes venientium principia didiceris, perquam facile earum & sensum & motum deperditum curabis. Verum hæc indeterminata relictæ sunt & Erophilo & Eudemo qui primi post Hippocratem neruorum ana- 20
 tomicen accurate scribentes, non mediocrem medicis dubitandi occasionem præbuerunt, quo pacto per neruorum resolutionem interdum sensus duntaxat, interdum motus, nonnunquam ambo simul pereant. Itaque neruorum resolutio potissimum dicitur, vbi motus deperditus est. Vbi verò partium aliquarum sensus perit, eam partem sensu expertam esse resolutam verò non adeò dicere
 con

*Neruorum
 resolutio
 Paraly-
 sis.*

consueuimus: quanquam sunt nonnulli, qui hanc affectionem sensus resolutionem vocitant. Nos verò semper iubemus vt cuiq; nominibus pro arbitrio vti liceat. etenim hoc nobis esto propositum, vt affectam scilicet sedem, simulq; dispositionem eius inueniamus. Nisi enim hæc accuratè cognouerimus, nequaquam eas partes, quibus vel sensu, vel motus vitiatu est, rectè curabimus. Sanè

- 10 Pausanias Syrus sophista quum Romam ali *Pausaniae*
quando venisset, secūdum duos minores si. *curatio.*
nistrae manus digitos, atque medij partē mediam, sensum in primis quidem difficilem habebat: postea malè curantibus medicis, sensum omnino amisit. Quibus equidē cognitis, omnia quæ præcesserunt inuestigauit, atque ipsum quum per viam duceretur, vehiculo excidisse, atq; in dorsi initio læsum, mox partem læsam breui quidem curatam, sed autum in digitis sensus vitium audiui. Igitur
20 remedia quæ illi digitis adaptauerant, læsæ parti adhibere iussi, atque sic vir ille celeriter sanitati restitutus est. Etenim id quod in pri *Nerui ad*
miscire oportet, quòd videlicet nerui per *cutē ma-*
vniuersæ manus cutem dispersi, quibus sen- *nus per-*
tiendi ad ipsam facultas defertur, proprias *uenientes.*
quasdam habeant radices, quodque neruorū musculos mouentium sunt aliq; medici ignorāt. Verūm latius quàm proposueramus, iam

nostra expatiata est oratio: proinde quiescere eam decet. quippe nostra intentio erat, ut hoc commentario omnes affectiones, quæ caput, maximè verò cerebrum infestare consueverunt, inueniremus. At quia ab ipso nervi originem ducunt, per consequentiam ad nervorum usque affectiones sermo pervenit: cui etiam finem imponendo, passionibus quæ reliquis capitis partibus accidere solent, scribere aggrediamur, si prius hoc tantillum superioribus addiderimus.

De olfactu. CAP. XI.

Olfacien-
di vis la-
sa.
Ethmoi-
dea ossa.

Vbi olfaciendi vis læditur, non eorum meatum qui in naribus conspiciuntur, sed vel anteriorum cerebri ventriculorum, quum intemperantiâ quadam afficiuntur, noxa est, aut eorum meatum, qui in his ossibus sunt, quæ ethmoide (id est cola) vocantur, si aliquando obturantur, si quidem odoratorum sensus in prioribus cerebri finibus perficitur, elatis ad ipsos per coli foramina vaporibus, quemadmodum in eo libro quem de olfactus sensorio conscripsimus, iam declaratum est.

LIBRI TERTII

FINIS.

CL.

CL. GALENI

DE AFFECTORVM

LOCORVM NOTITIA

LIBER QVARTVS.

T V S.

*

10 *Absoluit rationem cognoscendi morbos capi-
tis & faciei: atque hinc ad thoracem affe-
ctum descendit.*



20 *Q*VA via & ratione vniuersali af-
fectas sedes scrutari conueniat,
primis libris duobus quarun-
dam partium exemplis satis per-
strinximus. Quoniam verò (vt iam dixi-
mus, atque in aliis libris demonstraui-
mus) circa res particulares exercitari oportet eum,
qui singula artis opera, quæ vniuersali via
& ratione didicit, tutò & celeriter exercere
voluerit: operæ precium me facturum mihi † λογ-
videre videor, si † rationales quasdam no- κὰς δια-
tiones omnium corporis particularum, quæ γνῶσις,
sensum efugiunt, cum quomodolibet affi- quæ con-
ciuntur, perscripsero, sumpto à capite initio. cipiuntur
Igitur de memoria, & cogitatione vitiata, mente,
atq; reliquis animæ functionibus, quas prin nec sen-
cipes nominare consueuimus, in huius com- su perci-
mentationis libro tertio iam diximus, simul piuntur.

M 4

in non paucis affectuum generibus, via & ratione inducto exercitationis modo. Nam & de delirio tum phrenitidis proprio, tum eo quod citra febrem accidit, insaniam nominant: præterea de lethargo, sopore, morbo comitiali, melancholia, vertigine, cephalæa, hemicrania, apoplexia, & similibus ibi iam dictum est.

De affectis partibus in oculorum morbis.

CAPVT I.

10

AT in præsentī libro, qui huius cōmentarii quartus est, de faciei partibus, quæ intrinsecus afficiuntur, sermonem faciemus, ab oculis incipiendo. Nam modò ipsorum sensus, modo motus, ac nonnunquam tam sensus, quàm motus resolutur: idque interdum in altero, interdum in utroque accidit oculo. Nonnunquam solis palpebræ, nonnunquam etiam eius partis, quam propriè oculum vocamus, vel sensus, vel motus læditur. Cùm igitur nullo in oculis malo apparente, cernendi sensus deperditus est, descendens à cerebro in ipsum nervus causam in se continet, cùm vel inflammatione, vel scirrho laborat, vel aliqui ex humorum defluxione afficitur, aut aliter quomodolibet foramen ipsius obturatur. Atque huiusmodi affectus, oculo, ut instrumentali parti, accidere necesse est: qui

*Nervus
visificus.*

qui verò ei, vt similiari, adueniunt, octo in-
 temperantiæ generibus continentur. Præ- *Spiritus*
 terea aliud quoque ipforum vitiū est, quum *visificus.*
 vel nihil omnino, vel exiguū admodum, vi-
 fifici spiritus à principio, quod in cerebro cō-
 sistere putandum est, ad eos descendit. Sive- *Oculorū*
 rō vteruis oculorum, motum duntaxat ami- *motores*
 ferit, secundæ copulæ neruum, qui à cerebro *nerui.*
 oritur, molestari necesse est, ab aliquo vide-
 10 licet eorum affectuū quos alteri neruo, qui
 à prima coniugatione nascitur, nuper acci- *Oculorū*
 dere diximus. Quoniam verò, vt ex anato- *musculi*
 mice didicimus, musculi oculum mouentes, *sex.*
 senario numero constant, ac præter eos, alii
 quoque sunt, qui descendentes in ipsum
 meatus (*ὥρον* Græci vocant, quo nomine
 dissecutores primæ coniugationis neruū eò
 quod soli manifestum sit foramen nūcupa-
 re consueuerunt) radicem amplectuntur. ac-
 20 cidit interim quamuis ipse haudquaquam
 afficiatur, vt musculorū aliquis, aut in pro-
 pria essentia, aut in neruo ad ipsum descen-
 dente, ab aliquo nuper dictorum affectuum
 infestetur: siquidem singulis horum muscu-
 lorum, pars quædam nerui à secūda cōiuga-
 tione orti transmittitur, haud secus quam iis
 quoque musculis, qui meatum ipsum com-
 prehendūt, siue ij duo, siue tres, siue vnus dū
 taxat dicendus sit: id enim in præsentia non

M s

Munus refert, modò nouerimus horum musculo-
musculo- rum inuase esse, vt & sursum trahant ocu-
rum ocu- lum, & firment, ne mollis ille neruus, quem
los mouen & visificum & meatum nominant, vllò pa-
tium. cto in processu diuertatur. Quum itaq; sex
 inueniantur oculum mouentes muscoli, si
 is quidem qui ipsum sursum attrahere so-
 let, afficiatur, totus oculus delapsus vide-
 bitur: si verò is qui ipsum detrahare po-
 test, affectus est, oculus sursum attractus¹⁰
 apparebit. Ita etiam si minoris anguli mu-
 sculus vitiatur, ad maiorem: si verò hic læ-
 sus est, ad illum oculus deflectitur. At si vol-
 uentium musculorum quispiam resoluitur,
 obliqua erit totius oculi conuersio. Cæte-
 rum quum alij præterea sint muscoli, mol-
 lem neruum illum circundantes, scire licet,
 ipsis resolutis totum oculum procidere, at-
 que à sua sede moueri, tametsi plerique eo-
 rum qui sic affecti sunt, sensum quidē inten-²⁰

Neruus to molli neruo, sed nequaquam affecto, ci-
opticus of- tra noxam cernere possunt: qui vbi quoquo
fensus. modo afficitur, visum efficit obscuriorem.
Aristot. vbi verò adhuc magis malum ingrauescit,
sect. 31. constat eos qui sic afficiuntur, nihil omnino
prob. 17. cernere posse. Porro quum oculi à sua sede
et Aphr. remouentur, si ad alterutrum angulum fiat
probl. 9. conuersi, innoqua permanebit cernendi fa-
lib. 2. cultas: si verò aut sursum, aut deorsum, aut in
 obli

obliquum quoque vertantur, quicquid ipsis
 obieceris id omne duplū esse videbitur. *Musculi*
 sculi verò supernam palpebram mouentes *supernam*
 (nam inferior immobilis est) quoniam per- *palpebrā*
 quā parui sunt, adeò vt in maioribus quo- *mouentes.*
 que animalibus vix manifestè perspicere pos-
 sint, nihil mirum, si nerui ipsis innati difficul-
 ter videātur. Nihilominus quemadmodum
 in musculis, quorum iam suprā meminimus,
 10 ita & in his quoq; euenire necesse est, vt in-
 terdum musculi ipsi peculiari aliquo affectu,
 ex his quos ad musculos pertinere nouimus,
 interdum verò nerui ipsis innati infestentur.
 Igitur si musculus ipsam sursum attra-
 hens exoluitur, laxam efficiet palpebram, *De electro-*
 adeò vt oculus aperiri non possit: si verò de- *pio & la-*
 trahentes (gemini enim sunt) resoluuntur, *gophthal-*
 oculum claudere non poterunt. Quorum si *mia Cel-*
 alter duntaxat afficitur, ad oppositum mu- *fus. lib. 7.*
 sculum palpebra deflectetur, vt fracta videa- *& Graci*
 20 tur, in fine videlicet circa mediam vtriusque *medici.*
 lineam. quippe ea pars, quæ iuxta musculum
 affectum est, sursum trahi, quæ verò iuxta
 illa sum est, detrahi videtur. Hi sunt partium
 oculi peculiare affectus, qui latentibus locis
 insident. Ac sunt præterea alii, qui ex aliis
 partibus ei per cōsensum adueniunt. Igitur *suffusio.*
 accidentia, suffusorum visus similia videntur
 oculis nulla propria affectione molestatis:
 sed

sed aut oris ventriculi, aut cerebri cognatione, id accidere solet. Verum hæc ipsa, ab iis quæ à ventre oriuntur: distinguenda sunt. Primum quidem ex eo, quod vel alter duntaxat oculus, vel uterque, similiter visis occupetur, siquidem in vniuersum visa ob humorum in ventriculo contentorum vitium oborta, utrique oculo similiter accidunt. Quæ verò per suffusiones apparent, neque incipiunt simul in utroque, neque similiter 10 apparent: deinde ex tempore quoque distinguuntur. Si enim tribus, quatuorve aut etiã pluribus mensibus, suffusionis apparuerint accidentia, contemplantiq̃ue tibi pupillam, nihil tenebrosum videatur, ab ore ventriculi proceculi affectum procedere inuenies. Si verò dentium non ita multum temporis intercessit, quaerendum est in primis, utrum ex quo incœpit affectus, singulis diebus perpetuò huiusmodi apparitio perseuerauerit, nullo scilicet 20 interueniente die, qui omni reprehensione caruerit: an diebus quibusdam intermediis laborans exactè visus sit sibi conualluisse: Nam assiduitas suffusionem portendit: Intermisio verò, quod malum à ventriculo prodierit, suspensionē excitat: id quæ magis, si perfectè quis concoquens, nullum sibi visum apparere fatetur: sed multo magis, si quum apparuerūt visa, mordicùs in ore ventriculi

Accidentia
suffusionis
ab ore ventri-
culi procedentium
nota.

tricoli doluit: maxime verò si post hæc vomendo, eiecta re mordente, mitigata fuerint accidentia. Hæc sunt quæ primo statim die, quû videris hominem, interrogando discere debes, quando (vt iam diximus) exquisitè secundum naturam se habuerint oculi. Vbi verò altera pupilla tenebrosior: aut turbidior, aut (vt breuiter dicam) nõ exactè pura videtur, suffusionis esse initium censendum

10 est. Si verò quispiam suapte natura pupillas ipsas non admodum puras habuerit, considera num vtriusque similis sit affectus, ad hæc, an non ita multum temporis à suffusionis accidentibus præterierit [vt eas turbidiores reddere potuerit.] Quod si ita est, im-

20 pera, vt minus cibi, quàm pro consuetudine, ingerat, eumque nihil mali succi habentem: postero die vbi probè cõcoxerit, qualia apparuerint visa interroga: si enim vel omnino nulla, vel debiliora videantur, ad vëtriculum referendû est accidens. At si similia permanferint, non per consensum, sed ex propria dispositione, sciendum est huiusmodi accidentia oculos infestare. Idque magis vbi sumpto ex aloë medicamento, nihil variaverint, Voco autem medicamētum ex aloë, quod alii hieram picram, alii simpliciter picram appellant. Quippe si à ventriculo pro-

uenerit accidens, huiuscemodi medicamen-

Vera suffusionis indicia ex pupille consideratione.

Dialoges. Hierapicra.

to

to potui dato, facillimè curatur, accedente simul bona cōcoctione, vt in idem conueniant, & affectæ sedis notitia, & ipsius cura.

Curat Galenus *suffusionis accidentia* *per epistolas.* *tio.* Equidem quosdam sic affectos, quamuis (vt scitis) non viderem, quum in alienis essent terris, per literas curavi. Nam quum nonnulli ex Iberia, Celtica, Asia, Thracia, atq; aliis regionibus, per epistolas à me peterent etiam in suffusionis initio, nullo adhuc vitio in pupilla apparente, vt probatum 10 aliquod eis medicamentum transmitterem, volui prius certiore me redderent, num ex multo tempore ita fuissent affecti. prætereà de aliis quoque, quorum paulo antè mentionem fecimus. Qui quum per epistolas responderent, sex menses aut annum iam exactum esse, vtrunque oculum similiter affici: quum probè concoxissent, melius sese habere: per cruditates, atque ventriculo mordicus dolēte, grauius irritari: edu- 20 cta verò per vomitum bile, quiescere: nulla facta de pupilla quæstione, satis efficaciter me cognoscere putavi, nō proprio affectu, sed per ventriculi consensum oculos infestari. Mittens itaque picram, ipsos quidem in primis, atque præcipuè: per eos autem, alios quoque multos ipsorū conterraneos sanaui, quum enim omnes quotquot epistolas meas acceperunt, docti essent, affecto-
runa

tum locorum notas ex literis meis didicerunt: quibus deinde facillè cognitis, eos amaro medicamēto curauerūt. At similia quoque suffusioni accidentia in quibusdam phrenitidis speciebus, affecto scilicet cerebro, sæpe numero euenire solet. Nec refert, utrū species an differentias nominaueris. Nam simplices quidem duæ inueniuntur, ex quibus deinde tertia cōponitur. Quippe sunt phre-

10 nitici quidam, qui de iis quæ oculis offeruntur, rectè (quantum ad sensitiuam notitiam pertinet) iudicant, cogitando verò, à naturali iudicio aberrant. Alij rursus cogitatione quidem falluntur minimè, sensibus tamen difformiter mouentur. Sunt præterea qui simul & sensus & cogitationis vitio laborant. Itaque cuiusque læsionis modum sic accipe. Quum Romæ quidam do-

Phrenitidis species tres.

20 mi, cum lanifici puero contineretur, surgens à cubili venit ad fenestrā, per quam & ipse videri, & prætereuntes videre potuit. Itaque ex vitreis vasis singula ostendens, interrogauit, imperarētne ut ea proiceret. Illi verò ridentes, plaudētesque, ut ea proiceret, rogabant. tum ipse deinceps omnia arripens eiecit, at illi magnis acclamationibus riserunt, Postea, iuberent ne puerū quoque proiici, quum eos interrogasset, atque id illi iussissent: illico ipsum deiecit. quem ab alto

Phreniticus vitrea

vasa & lanifici

puerū ex fenestra

deiecit.

cadem

*Galenus
adhuc
pueri de-
lirium.*

*Prenun-
tiam futu-
ram in se-
ipso phre-
nitidem.*

eadentē videntes, suppresso statim risu, ac-
currerunt, & confractum iam puerum sustu-
lerunt. At contrariam affectionem non so-
lū in aliis, verū in meipso, quum puer
adhuc essem, expertus sum. Quū enim per
æstatem ardente febris laborarem, & festu-
cas atro colore ex cubili eminere, & floccos
similiter in vestibis esse putabam, quos au-
ferre tētans, nihilq; sub digitis eductum in-
ueniens, accuratius vehementiusq; id effi-
cere conatus sum. Audiens itaque duos ex
amicis, qui tum aderant, dicentes: Vidēsne
hunc iam & floccos euellere, & festucas col-
ligere? statim intellexi, id ipsum quod dice-
bant, me fecisse. Quum verò sic animo cō-
starem, ut rationalis in me facultas non va-
cillaret: rectē inquam dicitis, proinde ne
phrenitis me arripiat, auxilio estote illi au-
tem quum idoneis rigationibus caput fo-
uerent, tota die sequentiq; nocte, grauibus
insomniis turbatus sum, ut interim & cla-
mare, & exilire viderer: verū postero die
mitigata sunt omnia accidentia. Igitur con-
stat, quòd licet ab vna eademque causa se-
cundum speciem accidentia proueniant,
non tamē ab eadem sede quæ primario af-
fecta sit, emergunt, & in iis qui ex cerebro,
atque illis qui per ventriculi consensum, ut
dictum est, laborant. Quum enim in cere-
bro

bro cuiuspiam biliosus succus abundat, ac Biliosus
ceditque febris ardens, is afficietur perinde ac succus in
si ad ignem torreretur, oriturque tum fumus cerebro a-
veluti in lucernis ab oleo, qui per vasa, quæ bundans,
ad oculum tendunt, delapsus, visorum in visorum
ipsis causa censetur: si quidem in anatomice causa.
vidistis, quod & arteriæ & venæ, ab his va-
sis ex quibus choroides membrana cōtexta
est, simul cum nervis ad oculum descendūt.

- 10 Verūm huic sermoni, utpote satis iam defi-
nito finem imponentes, de reliquis oculi
partibus id in vniuersum dixerimus, nostri
instituti non esse, earum particularum quæ
manifestè sensu percipiuntur, si à naturali
constitutione aberrauerint, notas perscribere:
sed illarum potiùs, quæ quum affectæ fue-
rint, sensum latent. Nam quum pupilla ma-
nifestè videtur aut fracta, aut distorta, aut
præter naturam vel aucta, vel imminuta,
20 haud difficile est affectam particulam co-
gnoscere, at verò quæ sit dispositio huius-
modi faciēs affectum scire non sine nego-
rio, à medica arte petendum est. verūm de
iis in libro de causis accidentium iam scri-
ptum est. Proindè non opus esse videtur, ut
in hoc libro vel affectas sedes in oculis, quas
sensus consequi potest, vel affectus ipsos de-
clarare aggrediar. Quippe affectuū nomina
vno paruo volumine, cui titulus est. Quo-

N

modò noscantur oculorum affectus perscripta sunt. Causas ut diximus in libro de accidentium causis inuenies. Tempus igitur est, ut ad linguam nostra conuertatur oratio.

De affectuum linguae notitia, item de sompore, & morbo comitiali.

CAPVT II.

ATque videmus interdum ipsius motum, interdum gustandi sensum laedi, 10 atque nonnunquam cum eo tactum quoque. Neque enim alio gustus atque alio tactus nervo utitur, ut in motu videre est. Nervi enim à tertia coniugatione orti non solum tangendi, verum etiam gustandi vim optinent. Verum crebrius laeditur gustandi quam tangendi facultas, quavis iisdem nervis utraque utatur. Nam ad gustum quidem exacto iudicio opus est: tangendi verò sensorium, ut crassissimum, ita cernendi, tenuissimum 20 est. Auditus verò sensorium, ut in tenuitate à visu, ita sensorium gustus in crassitudine, à tactu, secundum locum obtinet. Olfacienti verò sensorium, in illorum quatuor medio constituitur. Mouendi autem vis linguae aduenit, à septima nervorum à cerebro ortorum coniugatione, non longè à spinalis medullae initio. Quumque hoc in loco utraque cerebri pars, tam dextra, quam fini

Gustus.

Nervorum

tertia cere

bri coniu-

gationis

facultas.

Sensoria.

Motus lin

guae à qui

bus ner-

vis.

sinistra afficitur, ne apoplexia hominem Apople-
 rapiat, periculum est: vbi verò altera tan- xia.
 tum, in †paralyfin finiri solet. Ea inter- Paralysis.
 dum alteram duntaxat linguæ medietatem †Al. τω α-
 à motu prohibet: interdum partes sub ca- ραπλη-
 pite constitutas: & quidem modò has, mo- γίαρ.
 dò illas infestat: nonnunquam alterum la-
 tus, per vniuersum corpus vsque ad extre-
 mas pedum partes afficit. Igitur ex faciei
 10 partibus sola lingua sæpenumerò videtur
 iam dictâ noxa molestari: quum nulla sit,
 neque in tactu ipsius, neque in gustu læsio.
 Cuius rei causa haud obscura est, vobis præ- Nervi ad
 cipuè, qui vidistis neruorum à cerebro pro- faciem.
 cessum, ad faciem quidem à parte eius ante-
 riore: ad partes verò totius animalis sub fa-
 cie omnes, ab altera parte nempe postero-
 re. A qua etiam eorum neruorum qui ad lin-
 guæ musculos veniunt, coniugatio proce-
 20 dit, quibus ipsa motum ab electione perfici-
 cit. Itaque non ab re quum anterior dun- Anterior
 taxat cerebri pars afficitur, sola linguæ mo- cerebri ps
 tio vitio carebit. Reliquæ verò faciei par- affecta.
 tes omnes in altera parte, dextra aut fini-
 stra, & sensum & motum ab electione a-
 mittunt. Quòd si nanque aliquando sola
 anterior cerebri pars afficitur, supremum
 ipsius ventrem ei consentire necesse est, at-
 que cogitandi quoq; actiones vitari. Pro-

inde qui ita affectus est, neque sensus neque
 motionis munere fungitur: spirandi tamen
 facultas haudquaquam læditur, vocaturque
Kαρὸς, *so* hic affectus caros, id est sopor. Si verò adeò
por. vehementer spirationem opprimat, ut quis
 vel magno conatu vix spirare possit, eorum
 exemplo qui per grauem somnum stertere
Apoplexie solent, apoplexia nominatur. At qui solutæ
succedit apoplexiæ creberrimè succedere solet voca-
paralysis. ta ¶ paralysis. Sopore verò finito, bona va- 10
 ¶ *Al. πα-* letudo magna ex parte subsequi consuevit.
εαπλη- Fit autem sopor, Hippocrate autore, muscu-
ria. lis temporū affectis, prætereà in acutis quo-
Morbus co que morbis, ut idem Hippocrates scripsit.
mitialis Inter soporem verò & apoplexiam morbus
inter sopo- comitialis medius est, conuulsionem afferēs
re & apo vniuerso corpori, sed in paraly sin non fini-
plexiam tur. Horum trium morborum, frigidus ac
medius. crassus aut omninò viscidus humor, causa
Catale- est. Verùm & in sopore, & morbo comitia- 20
psis. li, ventres magis, cerebri corpus minus: in
Sopor vigi apoplexia verò, corpus magis affici solet. Et
lans. in caro quidem anterior pars magis, in apo-
 plexia & morbo comitali vtraque afficitur.
 In catalepsi verò & catoche dicta, postero-
 ra cerebri potius afficiuntur. Quum autem
 osse quopiam terebra perforato, medius vē-
 triculus fuerit contusus, sopor hominē occu-
 pat, sed neque conuulsione neque difficili
 facta

facta spiratione: hæc apoplexiæ, illa morbo
 comitiali peculiaris est: haud secus quàm ca-
 talepsi, soporiq; seruatur secundum naturam
 spiratio. Verùm vt per soporem palpebræ
 clauduntur, ita in catalepsi manent apertæ.
 Quemadmodum autem inter perforandum,
 quum quis membranam negligenter, ac vl-
 trà quàm res expostulat, meningophylace
 (id est membranæ custode) premendo vio-
 10 lauerit sopor accidere solet. Ita vbi os calua-
 riæ vehementer atritum ipsius ventriculos
 comprimat, maximeque medium, sopor su-
 peruenire potest. Quinetiam ad vehemen-
 tes dolores hic affectus sequitur, concidente
 videlicet robore spiritus animalis. Voco au-
 tem sic id quod est in cerebri ventriculis pri-
 mum animæ instrumentum, quo & sensum
 & motum in vniuersas corporis partes trans-
 mitti. Hos cerebri affectus, tum quod iam
 20 proposito sermoni familiaritate coniun-
 guntur, tum etiam quod antea non satis de-
 clarati fuerunt, operæpretium duximus in
 præsentia definire. Sed ad linguæ affectus
 redeundum nobis est: quorum alij quidem
 communes sunt per cerebri neruorumque
 consensum, alij ipsius duntaxat proprij cen-
 sentur. Igitur quod ad communicationem
 quam cum cerebro habet, pertinet, vt per
 septimam neruorum coniugationem mo-

Sopor à ca-
 talepsi
 quid differe-
 rat.

Meningo-
 phylax la-
 mina æ-
 nea est fir-
 ma paulu

resima ex-
 trema par-
 te, leuis,

subiicitur
 è parte q̃
 scalpro ex-

scindi de-
 bet, nec vl-
 tra scal-

prum tras-
 ire pati-
 tur.

Spiritus
 animalis.

Communi-
 catio lin-
 gua cum

cerebro p
 neruos.

tus ipsius vitiatur. Ita sensus impediri potest
Nervus per tertiam, quem nervum dissectores mol-
tertia con lem appellant, descendente dispersum que
iugationis (vt scitis) in tunicam quæ linguam compre-
mollis di- hendit, quemadmodum is, qui à septima cō-
ctus. iugatione ortum habet, musculis ipsam mo-
 uentibus distribuitur. Proprij autem solius
 linguæ affectus, ex iis quæ iam suprâ de ocu-
 lorum propriis affectibus diximus, haud dif-
 ficulter inuenientur. Quippe sicut muscu- 10
Similariū lorum ipsius aut similarium intemperantiæ
et instru motum impediunt, ita ambientis ipsam ex-
mentaliū trinsecus membranæ intemperies, & tangen-
partiū af- di & gustandi simul sensum vitiat. Instru-
fectiones. mentalium verò affectionū speciē reterunt
 inflammationes, scirrhi, œdemata, erysipela-
 ta, suppuraciones. de his verò, Vtpote quæ tū
 visu tū tactu discerni possunt, nihil aliud in
 hisce commentariis dicemus quippe eas dun-
 taxat affectas partes hoc in libro persequi 20
 proposuimus, quæ neque visu neque tactu,
 sed demonstratione, atque (vt summam di-
 cam) rationali via inueniri possunt.

De sensu auditus.

CAP. III.

Auditus.

EAdem quoque ratione in sensu auditus
 quicunque affectus in aurium oculis
 obiecta concavitate, oriuntur, rationali in-
 uestigatione non indigent. Illæso verò ap-
 paren

parente aurium foramine, si audiendi facultas læditur, simili via & ratione inquirendæ sunt notæ. Vbi enim præter hanc nihil læsum est, neruum proprium affectum esse, haud absurdè coniicimus.

De affectibus faciei. CAP. IIII.

- 10** **V**Bi verò reliquæ faciei particulæ simul cum ipsa læduntur, in cerebro dispositionem præter naturam esse existimamus, ipso vel vt similari vel vt instrumentali parte affecto. Sed facies reliquis in locis omnibus, non solum motum, verum etiam sensum aut perdit omninò, aut vitiatum habet: *Quando facies sensum aut motum amittit.* idque interdum partibus quæ læsas habent actiones, proprio affectu laborantibus, interdum verò nervis qui ad eas à cerebro deferuntur: denique ipsomet interdum affecto cerebro: quorum discrimen per copulata ipsis accidentia facilè deprehenditur. Quippe si fortè fortuna vna quæpiam particula, aut in sentiendi, aut mouendi, aut vtrâque facultate lædatur, ea sola causam dispositionis continet: Idque aut suis ipsius partibus, aut nervis, qui ad ipsam ex tertia coniugatione feruntur, vel instrumentaliter, vel per intemperiem laborantibus. At vbi plurimæ simul affi-

ciuntur particulæ, cōsiderare oportet, vtrum
 ex vna neruorum origine, aut pluribus, sen-
 sum motūve, quum in naturali sunt habi-
 tu, sortiātur. Subiiciamus enim ex arte secan-
 di corpora, temporum maxillarumq; muscu-
 ad tēpora lis, item labris, & nariū pinnis, sensum & mo-
 & nares tum: linguæ verò, omnibusq; oris partibus
 ac labra sensum duntaxat, à tertia neruorum coniug-
 pertinen- gatione procedere: à secunda verò, vt ocu-
 tium. lorum musculis motum, ita à prima oculis 10
 ipsis cernēdi sensum suppeditari. Igitur vbi
 particulæ quibus à tertia coniugatione ner-
 ui adueniunt, & quidem omnes, sed in alter-
 utra duntaxat parte læsæ videntur (nunquā
 autem huius præceptionis, vel nihil dicenti-
 bus nobis, obliuiscaris) neruum ipsum pri-
 mariò affectum esse putandum est. Si verò
 vtramq; simul partem lædi contigerit, non
 nerui proprius, sed in cerebro, loci cuius-
 piam, à quo nerui procedunt, primus affe- 20
 ctus est. Sanè affecto in vtrâque parte, tam
 dextra, quàm sinistra, cerebro, in eo videli-
 cet spatio, vnde tertia neruorum coniuga-
 rum faciei tio prodit, omnes vicinæ partes simul affici
 offensio à consueuerunt: proinde & secundæ & primæ
 dextra in coniugationis nerui: vnde sequitur, vt ocu-
 aduersam lorum quoq; partes lædātur. Quòd si vnus
 partē de- duntaxat vel musculus, vel neruus, quo-
 flectitur. quo modo siue primariâ affectione, siue per
 con

consensum fuerit affectus, pars ipsa in aduersum trahitur musculo. Nam resoluta musculo, qui dextram labri partem mouet, ipsa ad sinistram deflectitur. At si is qui sinistram mouet resoluitur, ipsa trahitur ad dextram. Haud secus & totam mandibulam, & narium pinnas, & genas utrasque quas à musculosa latitudine (id est lato musculo) moueri didicistis, in aduersam partem deflecti contin-

20 git. Id autem per neruos non à tertia coniugatione, sed à seruis vertebris procedentes, efficitur. Nam hi per totam penè faciem *Nerui à* sparguntur, exigua ipsius parte excepta, quæ *spina in* à quinta coniugatione prodeunt *neruos faciem.* suscipit, in suprema videlicet lati musculi parte.

De spinalis medullæ affectibus.

CAPVT V.

20 **S**Ed iam tempus est, ut spinalis medullæ *spinalis* affectus persequamur. Igitur spinalis me- *medulla.* dullæ affectus, quantum ad præsentem inquisitionem pertinet: compendiosam habet doctrinam: ea verò quæ ex actionibus habetur cognitio, non item. Etenim nisi quis neruorum ab ipsa procedentium coniugationes ita memoriâ teneat, ut ad quam corporis partem singulæ perueniât, cognoscat, discernere non poterit, secundum † quam † *Disop.*

N 5

vertebram ipsa sit affecta: velut è contrariò
 si illarum meminerit, facilis erit affectæ sedis
 notitia. Quinetiam si reliquarum quoque
 partium omnium notitiam quæris: vt ner-
 uorum qui à spinali medulla oriuntur, memi-
 neris necesse est. Veluti vbi primæ vertebræ
 afficiuntur, licet rarò euenire tamen inter-
 dum angina potest, idque in pueris magis,
 quàm adultis, de qua Hippocrates libro se-
 cundo de Morbis populariter vagantibus 10
 in hunc modum scripsit: Erant anginae af-
 fectiones huiusmodi, Cervicis vertebræ ad
 interna conuersa sunt, aliis quidem plus, aliis
 † Dentem verò minus, atque in partibus exterioribus
 totam se manifesta videbatur in ceruice concauitas: 11
 cundam dolorem laborans, quum tangeretur, sentie-
 vertebræ bat. Accidit etiam angina cuidam, sub ea
 cervicis vo vertebra quam † dentem nominant, verum
 cavit. non adeò acuta: quibusdam verò ob rotun-
 Hippocra ditatis magnitudinem, omninò conspicua. 20
 tes: pro- Fauces autem, vt ea vertebra quæ dens di-
 priè dens citur, inflammatione minimè laborabant,
 dicitur: ab sed molestiâ afficiebantur. Ea quæ sub genis
 hac verte- erant, tuebant quidem, sed inflammatio-
 bra proces ne laborantibus haud erant consimilia. In-
 sus pyre-
 noëdes valido ligamento capiti alligatus, hinc annuimus
 & abnuimus. Note anginam indicantes nullo tamen exi-
 stente in gutture proprio affectu.

guina

guina nullus dolor cruciabat, sed natura-
li potiùs habitu permanebant. Lingua haud
facile conuertebatur, atque aucta ipsis vi-
debat, atque exerta: venæ sub lingua ma-
nifestæ: deglutire nisi magno cum labore
nequibant: at si vi quadam deuorare cona-
rentur, per nares effluebat id quod ingesse-
rant. Ex naribus loquebantur. Spiritus ipsis
non admodum elatus, nonnullis capitis, tem-
porum, atque ceruicis venæ attollebantur.
atque horum quibusdam, † quibus dolores † *Al. admo*
recrudescebant, tempora paululum cale- *dum hor-*
bant, quamuis alioqui non febricitarent. *rendis &*
Plurimi non augebantur, nisi quum vel *terribilis.*
sputum vel aliud quippiam deglutire tenta-
rent. Neque subsidebant oculi. Igitur qui-
bus tumor non in alterutram partem defle-
xus, sed rectus erat, nequaquam paralyti-
ci euadebant. Horum si quempiam peris-
se mihi constaret, id referre grauarer mi-
nimè. nam quotquot memoria nunc con-
sequi possum, omnes superstites perman-
serunt. Atque alij quam celerrimè sanitati
sunt restituti: Alij non pauci quadragesi-
mum diem præterierunt. Insuper nonnul-
los, febris omninò non arripuit: Plurimis
etiam vsque in longum tempus, pars quæ-
dam tumoris protracta est, cuius rei signum
& à deglutatione, & à voce sumi poterat,
Atque

Atque eliquatæ quoque columellæ, quan-
 quam nihil mali habere videbantur, malæ
 tamen significationis nuntium præstabant.
 At verò quibus alterutra pars afficiebatur, ij
 ea parte à qua vertebra resolvebantur, pa-
 ralytici euadebant, atque hæc ipsa versus al-
 teram trahebantur. Porro huiusmodi ac-
 cidentia, tum in facie, tum in ore, & septo
 quod gurgulionem distinguit, euidenter
 deprehendebantur. Quinetiam inferiores ge-
 næ pro ratione mutabantur. Cæterum qui
 paralytici ab angina fiebant, iis non totum
 corpus, vt in aliis fieri solet, resolvebatur: sed
 vsque ad manus duntaxat malum procede-
 bat ab ea parte, quæ anginâ vrgebatur. At-
 que ij concocta quædam, eaque exigua, &
 non sine molestia expuebant: prætereâ qui-
 bus tumor in rectitudine consistebat, ij ex-
 puere poterant. At ij quos febris quoque infe-
 stabat, longè maiori cum difficultate spira-
 bant, ac inter loquendum screabant venæ
 ipsis attollebantur, atque pedes erant quàm
 frigidissimi. Horum si aliqui non illicò mor-
 tui sunt, ij tamen erigere sese haudquaquam
 potuerunt. Verùm omnes quotquot equi-
 dem nòuerim, mortem obierunt. Totam
 huius sermoni seriem in secundo libro eius
 commentarij, quem in secundum librum
 de Morbis populariter vagantibus perscri-
 psimus

Paralyti.
 ci ab angina.
 na.

pſimus, ad verbum ferè enarrauimus. Atque
 idcirco eam totam hic inferuimus, eo quòd
 Hippocrates multis ostendit accidisse angī-
 nam nobis rarò viſam, nullo exiſtēte in gut-
 ture proprio affectu. Quinetiam quod cir- *Vertebra*
 ca primas oritur vertebraſ, à quarum ſecun- *dentiformis.*
 da pars quædam dentiformis vocata proce-
 dit: vnde nonnulli ipſam totam vocauere
 dentem. At nunc ſub hac quoque vertebra
 10 (inquit) factam quidē anginam, ſed non
 æquē acutam, vt ea quæ circa ſecundam fie-
 ri ſolet. ſiquidem: conſtat, quòd ſpinæ par-
 tes quò fuerint altiores, eo ſunt præſtan-
 tiores. proinde quò inferior primis duabus
 vertebraſ fuerit diſpoſitio, eo minorem in-
 feret noxam. Nam ex arte ſecandi corpora *Nervi ſe-*
 didicimus, ſepti tranſuerſi neruoſ ſub quar- *pti tranſ-*
 ta ac quinta vertebra emergere: prætereà ex *uerſi.*
 commentariis de Spirationis cauſis edocti
 20 ſumus, liberam ſpirationem à ſolo fieri ſe-
 pto tranſuerſo, accedente ad hanc interco-
 ſtalium quoque muſculorū actione, vbi vi- *Muſculi*
 delictet vehementiori opus eſt ſpiratione. *intercoſta*
 Quòd ſi vehemētiffimā ſpiratione indigue *les ſpira-*
 rimus, ſuperiores etiā muſculos concurre- *tionē ad-*
 re oportet. Verūm non ſolūm ob magnam *inuuant.*
 aut maximam ſpirationem horum muſcu-
 lorū actionē requirimus, ſed ob alias quo-
 que cauſas, de quibus latius in libris de Dy-
 ſpnœa

spinoza (id est spirandi difficultate) iam dictum est. In praesentia verò satis fuerit, à praescripto Hippocratis sermone tantum accipere, quantum ad affectorum locorum notitiam necessarium est. Si prius eius verbi, quod in libro de articulis à nobis explicatum est, meminerimus, ubi inquit: Vertebrae autem quae in spina sunt, quaecunque per morbos in gibbum trahuntur. Vult nimirum non solum ad interna vertebrarum luxationem, quam lordosin (id est excavationem) vocant, sed eam quoque, quae foras vertebrae labuntur, comitari tensiones, quae ad partes fiunt internas, trahentibus, qui ibi praeter naturam consistunt tumoribus nervosa corpora. Igitur ubi vnica duntaxat vertebra, aut etiam duae, aut tres sese deinceps consequentes distrahuntur, ea parte spinam cauari contingit. Vbi verò inter distractas vertebrae, vel vna vel plures illesae permanserint, sic affectis gibbus accidere solet. At si in alterutram partem, vel dextram vel sinistram distrahatur, ibidem in obliquum torquebitur spina. Atque in eo quem praemisimus sermone, vtriusque mentionem fecit Hippocrates: excavationis quidem, cum dixit: Quibus secundum rectitudinem tumor incedit: obliquae verò torsionis, dicēs: Quibus verò alterutra pars afficiebatur. Por

Hippo-
crates lib.
3. de arti-
culis sub
principiū.
Lordosis
vertebra-
rum luxa-
tio ad in-
terna.

Gibbus
quando ac-
cidit.

rō

rō exactè admodū atque vtiliter nobis (si
 legerimus) hæc conscripsit. Per excuatio-
 nem quidem, neminem fieri paralyticum,
 quod fit vbi pars aliqua resoluitur. Per obli- *Obliqua*
 quam verò torsionem, malum ad manus vs- *spinae tor-*
 que procedere, significans ipsum ad infernas *sio.*
 partes, vt costas, lumbos, crura, nō posse de-
 scendere. In primis itaque hoc nobis scien-
 dum est, alia quidem sequi accidentia, labo-
 10 rāte spinali medulla proprio affectu, siue id
 ex sola intemperie fiat, siue simul humore
 quopiam affluente, vt in erysipelate, inflam-
 matione, atque vlcere putri. Alia verò con-
 tusa, quia vna vel plures vertebrae suo loco
 cōmouentur. Quippe vbi proprio affectu *Spina pro*
 spina ipsa laborat, siue id in dextra, siue sini- *prio affe-*
 stra parte eueniat, citra tamē vertebrarū lu- *ctu labo-*
 xationem, & quidem si in altera parte dun- *rans.*
 taxat afficiatur, omnium inferiorum corpo-
 20 ris partium, quæ è regione nocumenti con-
 stituuntur, tam sensus quàm motus læditur.
 Si verò vtraque pars affecta est, omnes parti-
 culæ tam in dextra quàm in sinistra parte,
 ei quæ læditur subiectæ, similiter resoluūtur.
 At luxata vel ad gibbum vel ad concauum
 vertebra, fieri potest, vt nulla omnino par-
 tium inferiorū, vel in sentiendi vel mouen-
 di facultate vitium percipiat. Atque fieri
 etiam potest, vt lædatur eo videlicet modo,
 qui

qui ab Hippocrate in libro de articulorum affectibus definitus iam est. Quū igitur an-
Angulosa gulosa (vt ipse nominat) sit spinæ luxatio,
spinæ lu- id est, quū nō paulatim, sed affatim, perinde
xatio. ac si frangeretur, pars aliqua curuatur, subie-
 ctas partes omnes ladi necesse est. Paulatim
 verò facta luxatione, atq; in orbem magis,
 nihil notatu dignum patiuntur partes, quæ
 cōmotæ vertebræ supponūtur. Sed in obli-
Luxatio quum luxatio lādīt omnino partes eas, ad 10
spinæ in quas nerui ex luxatis vertebris procedentes
obliquū. perueniunt: idq; magis in ceruice, in thora-
Foramina ce minūs, sed multo minūs in lumbis acci-
vertebra- dere solet. Siquidem in ceruice vertebræ in-
rum, per ter se cōnexæ æqualiter utræque conferunt
que nerui foramini, vnde neruus procedit. In thorace
exeunt. autē superior magis, inferior minūs. Sed in
 lūbis totus neruus ex superiori excidit ver-
 tebra: vbi si trāsuerſa eueniat vertebrarum
 luxatio, eadem secum trahens & spinam & 20
 neruum, illa sum ſeruat ipſius ſecūdum na-
 turam ortū. In ceruice verò, ex loco medio
 inter duas vertebras procedentes nerui, per
 obliquas luxationes, in ea quidem parte, ad
 quam spina ipſa deſlectitur, opprimuntur:
 in altera verò, tenduntur. Porrò tenſiones
 quidem, vbi ingens quoq; inflammatio ac-
 ceſſerit, conuulſio comitatur. Ad compref-
 ſiones verò earum partium, ad quas oppref-
 ſus.

sus nervus peruenit, paralyfis, id est, resolutio
sequitur. Igitur non ab re in ea angina cu-
ius in præmisso sermone historia narrata est,
ad manus vsque superuenit resolutio, vtpo-
te pro sedentibus nervis ex fine ceruicis ad
manus. Quippe sub ceruice thorax est, à cu-
ius vertebis emergentes nervi non ad ma-
nus, sed ad spatia intercostalia transmittun-
tur, paucis qui ex primis procedunt exce-
10 ptis. Igitur per eas quas nuper diximus ver-
tebrarum luxationes, reliquæ faciei partes
omnes, neque in sensu, neque in motu no-
xam subeunt. Porro genæ duntaxat, sine
mandibula læduntur, vt quæ à musculosa
latitudine, id est lato musculo mouentur. *Latus*
Constat itaque quod muscoli, quibus mo- *muscu-*
uendi vis aduenit per nervos, qui à ceruicis *lus.*
vertebris orti in ipsis disperguntur, noxam
non euadunt, si & spinam, & prouenientes
20 ab ipsa nervos affectus quispiam infestaue-
rit. Verùm qui & quod sint huiusmodi mu-
sculi, ex nervorum qui à spina oriuntur, dis-
sectione didicistis: veluti alia quoque co-
gnitu necessaria accidētia, quæ sequuntur, vbi
spinæ ipsius vertebræ vel in gibbū, vel con-
cauum, vel etiam transuersum luxantur, ex
secunda particula commentariorū, quos in
librum de Articulis edidimus, omnia cum
propriis demonstrationibus accuratè con-

O

scripta habetis. Quorum summas in præsentiā commemorasse operæ precium fuerit. Equidem nonnulla iam percurri. Superest itaque ut ea quæ nondum tacta sunt, tractemus, ut nihil orationi nostræ deesse videatur.

Vertebra- tur. Porro scire debetis, vertebra à suo po-
rum luxa situ luxari, aut ob casum, aut ictum, aut tu-
zionis cau morem præter naturam, nervosa corpora
se. vertebri. ipsis atque spinæ insita, extenden-

tem. Horum duo sunt genera: aliud enim est, ro-
 partium quæ secundum naturam se habent,
 aliud tumorum quorundam qui præter na-
 turam accidunt: quos Hippocrates vno vo-
 cabulo comprehendens cruda tubera nomi-
 navit. Igitur manifestum est, quod in præ-
 missa conditione, quam libro secundo de
 vulgariis morbis descripsit, cervicis verte-
 bris adiacentes muscoli afficiebantur: po-
 tuit etiam tuberosus aliquis tumor accedere,
 ob quem concocta nonnullos scire dicit, 20
 facta videlicet tuberum concoctione. Cur

Anginosi. igitur eos anginosos appellavit? an quia dif-
 ficulter spirabant, nullo existente vel in pe-
 ctore vel pulmone vitio? quippe hac in re
 differt angina concursus à peripneumonia,

Angina & laterali morbo, atque ex eo quod angu-
definitio. stis sensus in gutture est. Præterea in præ-
Libr. 3. sagiorum libro videtur angina nomine ap-
Prog. pellare omnes affectus huic loco acceden-

tes.

tes, quos spirandi difficultas comitatur. In-
 „ quit enim: Angina periculo sissima est, celeri
 „ terque enecat, si neque in faucibus, neque in
 „ ceruice quicquam apparet, si dolor vehemens
 „ est, si † vix spiritus trahitur: ctenim eodem † ὁρῶ-
 „ die iugulat, licet interdum vsque ad alterum πνοήν,
 „ aut tertium aut etiam quartum protrahatur. quæ voce
 „ Quæ verò in reliquis non minore quidem non so-
 „ dolore afficit, extumescit autem, & in fau- lum recta
 20 cibus ruborem mouet, superiori non mi- illa spira-
 „ nus periculosa est: sed longius spatium ha- tio sed
 „ bebìt, † præcipuè si vehemens fuerit rubor. quæ omni
 „ Sed tum præcipuè malum prolongatur, no diffi-
 „ quum non solùm fauces sed ceruicem quo- cilis intel-
 „ querubor occupat. Maximè verò potest ab ligitur.
 „ ea secunda valetudo contingere, si rubor si- † ἢ ἢ ἢ ἢ
 „ mul & ceruicem & pectus cōprehendat, ne- θημὰ μι-
 „ que ad interna reuertatur erysipelas. Igitur γαγινῆται,
 ex iis verbis haud dubia coniectura est, om- quod ferè
 20 nes affectus qui huic loco accidunt, si spira- non legi-
 tionem quoquo modo reddāt deteriorem, tur in exē-
 ab ipso cynanchas (id est anginas) nomi- plaribus
 nari. Nondum solitis medicis cynanchen Græcè.
 per K, synanchen verò per s, nominare: tan-
 tum abest, vt vel paracynanchen vel parasy-
 nanchen dicerent. Quippe tum primùm ho synāche,
 mines res ipsas neglexerunt, quū nimio stu- parasy-
 dio nomina quærere inciperent. Itaque qua- nanche.
 tuor inuentis nominibus, quatuor affectus

significari dicebant. Ac notas ipsorum scribentes, genus illud quod suprà tractauimus, quum sermonē ex libro vulgariorum morborum secundo explicaremus, omnino dereliquerunt. Atque hæc sunt quatuor eorum quatuor genera. Primum vbi fauces inflammantur, genera. fauces voco internum oris locum, vbi simul conueniunt & gulæ & gutturis partes extrema. Alterum cum neque fauces, neque reliquæ oris partes, neque etiam externarum 10 partium vlla inflammata videtur, laborans tamen suffocationis periculum in guttore sentit. Tertium vbi extrinsecus circa fauces inflammatio apparet. Quartum vbi gutturis partes tum externæ tum interiores similiter Cervicis affectæ sunt. At superest adhuc alius cervicis alius affectus, quem ipsi silentio præterierunt, vbi affectus an ad anteriores partes vertebræ luxantur: & gine non quidem solis interdum musculis, qui cū ipsis dissimilis. 20 communicant, tumore præter naturam affectis, vel nato ibi tuberculo, interdum etiam gulâ pariter vitiata: nonnunquam musculis quoque, qui gulam gutturi iungunt: quin etiam propriis aliquando gutturis musculis, qui ipsum aperiunt oblæsis. Per omnes id genus affectus spirandi quidem difficultas oboritur, sed citra suffocationis periculum: laborantes difficulter deglutiunt, atque dolore afficiuntur, idque præcipuè cum potus eis.

per

per nares resilit. Accidit etiam interdum, vt excedēte inflammatione, & lingua & fauces in tumorem attollantur, quemadmodum & Hippocrates ipse tradidit. Verū huiusce-
 modi cognationū enarratio proposito no-
 stro nihil conferre videtur. Nam lingua affe-
 cta, aliæ quoque actiones deperduntur. At
 vbi vnica duntaxat actio læsa est, & sedes
 affectæ plures, tum nostri instituti est, vt ex
 10 reliquorum accidentium varietate eas discer-
 nendo inueniamus. Quippe nullo spirita-
 lium instrumentorum quoquo modo, neq;
 primario, neque per consensum affecto, fie-
 ri minimè potest, vt spiratio lædatur. Quum
 itaque multa sint spirandi instrumenta, ac spiratio-
 numerosa quoque partium multitudo, qui-
 bus ipsa consentire consueuerunt: non ab re *Libr. de*
 multa discretione indiget is, qui & primā-
 riò affectas & consentientes sedes inuenire spirat.
 20 conatur. Igitur ex sola spirandi specie, illico
 non nihil & de affecta sede, & de ipsa dispo-
 sitione conicere licet. Quippe si videatur la-
 borans inter spirandum totum mouere tho-
 racem, vt in parte quidem anteriore ad iugu-
 lum, in vtroque latere † ad ceruicem, in parte † ἀχρῆ
 posteriore ad scapulas vsque motus ipsius ἀτὰρ ἰνα-
 scendat, tres ex huiusmodi spiratione dispo-
 sitiones significantur. Vna est, flammea in
 pulmone atque corde caliditas: Altera in ali-

quo spiritalium instrumentorum angustia:

Aestus si-
gna. Tertia est facultatis musculos thoracis mo-
uentis debilitas. Quumq; huiusmodi spira-
tionem conspexeris, in primis arteriarum pulsa-
tionem perpẽdere oportet, hæc enim quan-
tus sit calor indicat. Atque de iis in libro De
præsagiis à pulsu, iam scriptum est. Dein-
de spirationem ipsam considera, an multa,
an frequens, an exufflando fiat. Postremo
thoracem in pectore tange, quem si arden- 10
tem inueneris, iam omnes copiosi caloris no-
tas te habere non dubita. Quibus ex abun-
dantia accedit faciei oculorumq; rubor, ca-
pitis ardor, sitis vehemēs, lingua arida & sa-
lebrofa, dicēte infirmo ardere sese. Vbi verò
incendij signis modum seruantibus thorax
Angustia vehementer dilatatur, angustiam in spirita-
in spirita- libus instrumentis esse portendit. Itaq; con-
libus in- sideres oportet, an guttur sit affectū, an pul-
strumēti. mo, an thorax ipse humoribus impleatur, 20
an tubercula in ipsis nata sint, quo in gene-
re etiam abscessus numerantur. Atqui guttu-
ris affectus tum primarios, tum eos quibus
per consensum infestatur, iam percurrimus.
Pulmonis autē thoracisq; vitia paulò post
accuratiùs persequemur. Nam in præsentia
spinæ duntaxat affectus tractare proposui-
mus, tum alios, tum illos qui ei per imbecil-
litatem vocatam accidere solent. Porro so-
let

let imbecillitas accidere, interdū cerebri vi- *spina im-*
 bio, vtpote à quo & sentiendi & mouendi *becillitas.*
 facultatem recipit. Interdum ipsa duntaxat
 spina primario affectu laborante, idq; ob
 peculiarem intemperiem, vel toti spina, vel
 diuersis ipsius partibus aduenientem, quam
 vulgarium medicorum mentes nequaquam
 comprehendere valent, quum tamen cre-
 berrimè videant laborantes quosdam adeò
 10 resolutos, vt vix digitos possint mouere,
 quamuis omnibus thoracis partibus spiritus
 trahatur, nullo ardente calore ad magnam
 spirationē ipsos cogente. Id verò ob huius-
 modi causas eis accidit. Nam dum quiescit
 animans, liberās spirationem solum septum *Libera spā*
 trāuersum modò valeant vires, efficere so- *ratio.*
 let. Vbi verò ob infirmitatem, spirandi mu-
 nus perficere non valet, tum intercostalium
 musculorum concurrat auxilium. Quòd si
 20 præterea maiori animal spiratione egeat,
 tunc superni musculi omnes, quorum maxi-
 mi scapulas secum manifestè mouēt, ad spi-
 randi actionem requirūtur. Quum itaque
 hominem spirandi opus omnibus thoracis
 partibus perficere videris, non fuerit tamen
 frequens spiratio, quantum thorax dilate- *Dilatatio*
 tur perpende. Insuper & narium pinnas, et *thoracis in*
 enim ipsæ quoque & dilatantur & contra- *angustia*
 huntur. Dilatatur autem thorax quidem, *spiritus.*

verum non similiter vt in ardentibus febribus, quàm adhuc valent vires. Nā in iis magna ex parte totus thorax dilatari consuevit. Neque etiam vt in illis, quibus id euenit ob aliquam spiritalium instrumentorum angustiam, vt in angina, atque in dyspnœa, quàm fluxio affatim descēdens induxit. Neq; quibus ab vtraq; causa prouenit, vt in peripneumonia. Quippe hoc morbo affecti, & maxima & frequentissima spiratione vtuntur. Cæterum quemadmodum ob virium infirmitatem, ita ob vnius quoque particulæ particularem imbecillitatem, omnes thoracis partes dilatari coguntur. Igitur athleta. Secundus nomine, qui satis quid pateretur intelligebat, sentire se manifestè in septo transuerso dixit imbecillitatem. Atque idcirco cogebatur intercostales musculos sine intermissione mouere, atque nonnunquàm superiores quoque, interdum autem zonam circumdans præcordiorum partibus, sola transuersi septi motione, sufficienter spirabat, quo tempore quiescebat. Verum an ad septi transuersi musculum, an ad nervos qui ad ipsum perueniunt, ad aggregatum ex vtrisque pertineat huiusmodi imbecillitas, mihi quidem explicatu perdifficile videtur. Idem spirationis genus etiam in alio quodam notavi, quem cùm aliquando equus in præcordiorum

*Secundus
athleta
cōpresso
spiritu
laborās.*

*Spiratio
lesa ob
calcitra
tionem
equi in
præcor-
diorū re-
gione.*

rum regione calcitrasset, adeò atrociter, vt oborta in septo transuerso inflammatione, mortis periculum immineret. Is licet euaserit à periculo tutus, ab imbecillitate tamen liberari nequiuit. In alio etiam, qui à vehemēti peripneumonia infestabatur, brachii tam posteriores, quàm internæ partes, à cubito ad summos vsque digitos, sensus difficultate laborauerunt, atque motus quoque nonni-

- 10 hil læsus est. Huic prætereà nerui, qui in primo atque secūdo intercostali loco inueniuntur, noxam subierunt, quorum primus non contemnendæ magnitudinis, per intimas partes abditus deferitur, sed ei qui ipsum præcedit admixtus, atque multiphariam diuisus, vt in arte secandi corpora videre est, cuius etiam partes aliquæ per interiorem cubiti regionem, vsque ad digitorum extrema perueniunt. Alter verò neruus tenuis quidem, nullique admixtus, per axillam sub cute ad brachium deferitur, dispersus per cutis tam exteriores, quàm internas partes. Huic homini celeriter sanitas reddita est, adhibito medicamento ei loco, vnde nerui prodeunt, iuxta primum, ac secundum intercostale spacium. Iam sanati sunt quoque nonnulli, quibus vtrunque crus paululùm resolutum erat, adaptato lumbis medicamento, in eo spinalis medullæ loco, vnde cruribus nerui

† ix τὰν
δπρω.

Nervorum
qui in primo & secundo intercostali spatio sunt producti, vsque ad manus.

Cruris
resoluti
sanatio.

adueniunt, nullum resolutis cruribus medicamen adhibendo. Neque enim ipsorum, *Difficul-* sed medullæ proprius erat affectus. Vidimus *tas motus* alium, cui magna oborta suppuratione in *cruris ex* altera nate, iuxta cruris initium, nervi eiusdem cruris per incisionem nudati sunt, sed *suppura-* ea parte sanata, toti membro mouendi difficultas accidit. Itaque coniiciens durum *tione orta* quidpiam, à priori inflammatione in *in altera* uo derelictum, quòd huiusmodi dispositionem induceret, affecto loco idoneum medicamen adhibendo, hominem perfectè sanauimus. *nate.* Quod autem de partibus faciei dictum est, id de reliquis quoque omnibus est intelligendum. Quippe vnica duntaxat pereunte actione, solùm musculus, qui ipsam efficere solet, aut neruum ipsius affectum esse putandum est. At vbi plures actiones vitiatæ sunt, non eodem in loco, accidit interdum, omnes eius musculos, à communi aliqua *10* causa lædi. Fieri etiam potest, vt neruus aliquis qui musculis illis communis est, afficiatur. Præterea piscator quidem, quum in *Piscator* fluuio pisces venaretur, adeò circa sedem & *circa sedē* vesicam infrigidatus est, vt ipso inuito effluerent, & alui excrementa, & vrina. Atque *et vesicā* hic quoq; per calida remedia affectis musculis adhibita, celeriter sanus euasit. Item alius *infrigida-* eisdem molestatus accidentibus, sine tamen *tui.* mani

manifesta causa, læsis circa os sacrum nervis,
multo tempore per multa præsidia, vix sa-
natus est. Igitur quod protinus ab initio di-
cebam, illius nunc quoque mentionem fa-
ciendo, ad alia me diuertam. Etenim si ex
arte quæ corpora secare docet, ad quam par-
ticulam descendant singuli nervi, à spina pro-
deuntes, cognoueris, affectas sedes quàm fa-
cillimè inuenies. Ex artis itaque actionibus

10 horum omnium examen re ipsa deprehen- *Partes af-*
dite. Nanque sæpenuerò vidistis ex hu- *fectæ di-*
iusmodi notitia, manifestè iuuari laboran- *gnoscedæ,*
tes. Quippe non solum crura, & manus te- *priusquã*
merè ac frustra vulgares medici, tota die no- *adhibean-*
ctusq; calidis medicamentis illinunt, prætereun- *tur reme-*
tes locum, ubi vel spina, vel nervus aliquis ex *dia.*

ipsa emergens, læditur. Verum etiam caput
cuiusdam, non ita pridem, impositis medica-
mentis vehementer calidis, ulcerauerunt, pu-
20 tantes sensum ipsius grauiter laesum, hoc pa-
cto posse reuocari. Atque hunc ipsum sa-
nauimus, inuenta sede affecta, tum ex reli-
quis accidentibus, tum ex euidentibus cau-
sis. Nam super singulis interrogauimus.
Quarum vna huiusmodi erat: Quum sub
multa pluuia ac vento impetuoso ambulas-
set, pallium circa cervicem madefactum aie-
bat, adeo ut vehemèti se frigore in ea parte
affectum sentiret. Itaque si sciueris ex primis
spinæ

Nervi ex- spinæ vertebra, quatuor nervos ad caput ascē
 primis spi dere, à quibus pellis ipsum ambiens, sensum
 na verte. accipit, facile sedem affectam inuenies. Hac
 brus ad ea igitur sanata, capitis quoque pellis pariter sa-
 put. nata est, vtpotè quæ nulla primaria affectio-
 ne laborabat. Medici verò neque huiusmodi
 nervos, neque eos qui per singulas cutis par-
 tes dispersi sunt, cognoscentes, quāvis præsen-
 taneum sit eis remedium, quod minime parti-
 culæ iuxta nervi initium adhiberi deberet, 10
 ipsi partes illas multo negotio molestant.
 Ego verò sepe numerò vos monui, alios qui-
 dem in ipsa spina veluti radicē habere, alios
 verò vt ex magnis ramis, atque ipsis quoque
 è spina exortis, procedentes, qui rursus diuisi
 distribuuntur. Atque alii per valde multas
 cutis partes, alii per pauciores. Quo magis mi-
 ror dissectores ipsos, illos non cognoscere,
 quàm in nervorum resolutione quærunt,
 quam ob causam resolutarum partium non 20
 semper & motus & sensus pereat? videntes
 aliquando sensum duntaxat, aliquando &
 sensum & motum simul deperdi. Arbitratur
 namque nervorum, qui per musculos disper-
 si sunt, reliquias, ad cutem tendere: quumque
 diuisus per musculum nervus affectus est, si
 quidem vehemens fuerit vitium, & sensum
 & motum simul lædi, sin læuius fuerit malū,
 seruari quidem sensum, vtpotè qui non tan-
 tum

*Sensus &
 motus de-
 perdit.*

tum roboris desideret, motum verò, eò quòd robustis egeat viribus, perire. Interdum enim vnus musculus, vel totum crus, vel manum mouet, ac proinde viribus indiget: qui si ita afficiatur, vt munus suum perficere nequeat, membrum ipsum immobile relinquit, sentiendi verò facultas partium affectiones discernens, illa sa tunc permanet vt quæ nõ ita validis egeat viribus, quippe nihil minus, imò
 10 magis etiã, pati possunt partes, quàm debiles fuerint, efficit enim imbecillitas, vt facilius affectio à sensu dignoscatur. Igitur ratio ipsorum in huiusmodi quidem neruorum resolutione probabilis esse potest. Vbi verò deperdita sentiendi facultate, motus non per- *Sensus amissus*
 rit, nonnulli quidem adeò vanas adduxere ra- *motu in-*
 tiones, vt satius fuisset eos conticescere, non- *columna.*
 nulli verò cognita huius quæstionis diffi-
 cultate, non grauati sunt dicere, huiuscemo-
 20 di paralysis speciem, qua seruato motu sen-
 sus perderetur, neminem vnquam vidisse. Sa-
 nè qui arroganter sibi sectæ alicuius princi-
 patum vsurpant, artis verò opera nunquam
 in exercitationis vsum duxerunt, iis nihil tam
 difficile videtur, quod non intrepidè profi-
 teantur. Verum magna ex parte mentiuntur.
 atque vt scribunt nonnulla, perinde ac si fre-
 quenter conspexerint, quorum tamen ne
 somnia quidem vnquam viderunt: ita plu-
 rima

rima nunquam videri aiunt, quamuis creber
rimè conspexerint.

De sanguinis spūto. CAP. VI.

ATque cōuenit quidem inter medicos,
sanguinem è gula ventriculoque vo-
mitione, ex spiritalibus partibus tussi, ex fau-
cibus & gurgulione sreatu, ex ore simplici
expuitione expelli. Nos verò sanguinem, 10
qui à capite, ad gurgulionis partes internas,
ut ad fauces affatim descendebat, tussiendo
educi sæpenuerò conspeximus: quippe su-
bitò gutturi irruens, tussim mouere potest.
quare diligenter aduertere animum opor-
tet, ne aliquando huiusmodi sanguinem, ex
spiritalibus instrumentis ascendisse putemus,
exemplo illorum medicorum, quos equi-
dem noui non rectè erroris accusare præstan-
tissimos medicos, quum ipsimet errarent, cre- 20
dentes huiusmodi sanguinis eruptionem es-
se quàm periculo sissimam: tanquàm pulmo-
ne vehementer affecto. Neque enim par est
exigua vena dirupta tantum effluere sangui-
nem. Cæterùm contingit plærunque ut vel
Sanguis p
tussa eie
Etus, vena
erosa. perosa, vel exesa, vel utcunque nominare vo-
lueris, vena, sanguis affatim tussiendo eiicia-
tur. Quum enim retroactis temporibus, quis
ex interuallis quotidie non ita multum fan-
gut

guine tussiendo expuere consueuerit superueniatque ei postea multi sanguinis intertussendum eruptio, & quidem neque ab alto cadenti, neque in certamine, neque palæstra grauitè vulnerato, neque etiam sub vilo graui pondere oppresso thorace reliquum fuerit, vt coniiciamus, ob insignem erosionem, plurimum sanguinem intertussendum fuisse reiectum. Atque non pauci *Pulmonis*
 10 sic affecti, pulmonis quasdam particulas si- *particulae*
 mul cum sanguine eiecerunt. Quocirca di- *cum san-*
 ligenter considerare oportet, an spumofum guine ex-
 quippiam simul educatur. Id enim efficacissi *create.*
 mum fuerit indicium, quòd ex pulmone fa-
 cta sit excretio. Haud secus si bronchi pars
 quædam, aut arteriæ, aut venæ tunica, aut
 etiã pulmonis ipsius carūcula eiicitur. Quip *Dolor non*
 pe nihil horum accidit iis, qui ex thorace san *infestat*
 guinem tussiendo producant. Ac ne dolor eos, qui-
 20 quidem infestat eos, quibus à pulmone san- *bus à pul-*
 guis erumpit, vtpote qui duos neruos per- *mone san-*
 quàm tenues, à sexta neruorum à cerebro *guis erū-*
 ortorum coniugatione recipit, extrinse- *pit.*
 cus per membranam ipsum continentem
 dispersos, & qui per visceris profundita-
 tem non extenduntur. Verùm thoraci (vt sci-
 tis) multi ab internis, multi etiam ab ex-
 ternis partibus adueniunt nerui, quibus faci-
 lè dolores percipi possunt. Prætereà thorax
 muscu

musculis, ossibusque abundat, pulmo verò laxus est, atque à compressione, aut cōtusione tutus. Proinde thoracis dolores, intensiores sunt pulmonis, remissiores. Quùm igitur dolente thoracis parte quapiam, sanguinem quis spuendo reiecerit, neque multum, neque rubrum, sed nigricantem, grumosumque, huic thorax primaria affectione infestatur. At sanguis affecto thorace, per pulmonem educitur, ut in suppuratis affectibus, pus quod 10 inter thoracem & pulmonem, sensus iudicio contineri percipitur: ad eundem modum in pleuriticis sputum coloratum emitti solet, quemadmodum in quinto huius commentationis libro utcunque dicemus. Consequens est ut de ulceribus quæ sanguinis reiectioni superuenire consueverunt, deinceps 20 dicere aggrediamur. Ea in pulmone creberimè fieri possunt, ac curationē (ut quibusdam videtur) nequaquam admittunt, aut (ut alij putant) difficulter admodum sanantur. At in thorace dirupta vasa, à quibus sanguis expulitur, magnâ ex parte conglutinantur. Nunquam enim huiusmodi ulcera, vel diuturna, curationi omninò resistunt. Quæ verò in pulmone longo iam tempore permanserunt, quamvis aliquando curentur, relinquitur tamen in ipso res quædam callosa, fistulosaque, quæ tractu tempo

Pulmo-
nis ulce-
ra.

Thoracis
ulcera.

temporis, à leui occasione expelli solet. Atque cum iis quæ inde expuuntur, miscentur Ephelcis. ramenta à medicis vocata, ac cruoris exigua Ramen- quædam guttula, qua in re, cum vlceribus tum. in aliis sedibus genitis, communicant. Verùm ex gula ventriculoq; , vomitu: ex renibus & vesica, cum vrina: ex intestinis verò, deiectione excernuntur. Sed ex spiritalibus instrumentis, nihil sine tussi expui potest. Quòd si pluribus deinceps diebus ali. Hirudo equis cruorem & screauerit, & emūxerit: idq; pota, vel citra capitis vel dolorem, vel grauitatem, si naribus ue præsentem siue præteritam, neque is ex adherens ictu procedat, huius & totū per nares mea- expuio- tum, atque eam oris partem, qua ad nares fo- nē & vo- ramen tendit, accuratè considerare oportet. mitionem Nam fieri potest huiusmodi accidens, hiru- sanguinis dine huic loco adhærente, quæ quidem in excitat. dies augeri solet: quamuis enim primis die- Caue ne bus, vtpote exigua, sensum effugiat, tertio ta hic per sa- men, quartòve die, haud obscure videri po- niem pus test. Eadem ratione ex ventriculo quoque, intelligas, cruor epota sanguifuga euomitur. sed est hu sed id iusmodi cruor tenuis, saniei que speciem re- quod à fert, siue is ex ventriculo, siue naribus, siue Græcis i- ex ore feratur. Igitur cū talem videris, ac chor, à bar hominis considerato habitu, super præteri- baris vi- tis eū interrogaueris, ex omnibus, rei ipsius rulētia di veritatem faciliè conicies. Equidem quū citur.

P

viderem hominem, integra valetudine, huiusmodi cruorem euomentem, interrogavi qua victus ratione antea fuisset usus: ille vero inter alia quæ narravit, hoc quoque addidit, quod cum nocte quadam sitiret, misso puero qui aquam afferret, ex immundo fonte bibisset. Quibus auditis, sciscitatus sum, apparuissentne aliquando sanguisugæ in ipso fonte, qui quum id quoque fateretur, epoto subinde idoneo pharmaco, hirudinem vomitione reiecit. Porro quum alius quispiam huiusmodi cruorem emungeret, & expueret: ipso narrante audiui, eum rure æstatis tempore, in stagno quodam, cum cæteris iuuenibus iuuenili ludo qualem adolescentes in aqua ludere solent, exercitatum: tum ego sciens in eo stagno sanguisugas esse, duxi laborantem ad splendorem, conuersoq; directè ad solis radios narium foramine, in eo

Inuenis, hi rudine ad narium meatum correptus. *meatu ubi nasus ad oris regionem perforatur, hirudinis in meatu latentis caudam cospexi.* *Has igitur historias, utpote perquam conducibiles, vobis narrare operæ pretium duxi.*

Quibus notis vitiata voce, affecta sedes deprehendatur.

CAP. VII.

QUod in proposito sermone, læsionem putare oporteat, etiam si non penitus tota

tota partis actio secundū naturam deperdi-
 tur, sæpenumerò iam diximus. Nec ab re fue-
 rit id in præsentia monuisse. Prætereà (quā-
 uis non ignoretis) monitos vos velim, non
 eandem esse rem, vocem & sermonem. si-
 quidem vox vocalium instrumentorū mu- *Vox.*
 nus est: loquela verò, eorum quæ sermoni *Loquela.*
 deputata sunt, inter quæ lingua principatum
 obtinet: cui non parum conferunt, & nares,
 10 & labra, & dentes. Sic etiam vocis instru- *Vocis in-*
 menta sunt, guttur, & musculi ipsum mouen- *strumenta.*
 tes atque nerui, qui à cerebro ipsis vim defe-
 runt. Igitur si vel claudentes, vel aperientes
 guttur musculi, immobiles reddantur: qui
 sic afficitur, obmutescet. vbi verò, vel diffi-
 culter mouentur, vel palpitant, aut tremunt,
 pro affectionis ipsius modo, vox ipsa læde-
 tur. Similiter, si vel conuellendo, vel quatiē- *Obscure*
 do, mouentur, aut vbi imbecillæ sunt ipsis *& parua*
 20 vires, siue ob suam ipsorum, siue ob neruo- *vocis cau-*
 rum ipsos mouentium affectionem, obscu- *sa.*
 ram & paruam efficient vocem. Quòd si
 alius quispiam ex mouentibus guttur mu-
 sculis quoquo modo afficitur lædetur qui-
 dem vox, sed parum erit vitium, atque sic
 affectus, neque obmutescet omninò, neque
 ita exiguum habebit vocē. Igitur vt ex mu-
 sculis guttur mouentibus, præcipui habentur
 ij, qui ipsum aperiunt, & claudunt: ita ex

Nervi vo- vocalibus nervis, ij quos recurrentes vocāt,
cales. qui & ipsi sextæ coniugationis pars sunt,
 neruorum, qui à cerebro oriuntur, quemad-
 modum & alij, qui quidem per ipsum disper-
 si differunt ab illis, eò quòd à nervis sextæ
 coniugationis non in ceruice, sed cùm ad
 thoracis regionem perueuerint, separantur.
 Nullus itaque tam ineptus dissector est, qui
 sextam coniugationem totum secet, inuitus,
 quamuis recurrentes nervi ob imperitiam 10
Recurren- nonnunquam diuellantur. Accidit verò in-
tium ner- terdum in magnis asperæ arteriæ vulneri-
uorum dis bus, vt vnà cum ipsa arteria, vel alter, vel v-
sectio. terq; incidatur. Porrò per chirurgiam quoq;
 in frigidati, tantisper vocem impediunt, do-
 nec calefacti, naturalem temperiem recupe-
 raauerint. Quinetiam vitari vocē haud ob-
Vitiata scurè contingit, quum vel acutior, vel ma-
vox à mu sculis à mē ior redditur, ob id quòd fauces à suis muscu-
sculis à mē brana gut lis nequeant intendi. Item grauissimè lædi- 20
brana gut tur vox, vbi membrana, quæ faucibus & gut-
turis, & turi communis est, multa humiditate riga-
destilla- tur. Quòd etiam destillationes eadem ra-
tionibus tione vocem raucam efficere possint, nemo
 & vehe- non intelligit. Vehemens quoque exclama-
menti ex- tio, similiter vocem afficit, vtpote quæ simi-
clamatio- lem inflammationi circa iam dictam mem-
ne. branam, atque gutturis musculos, parit affe-
 ctum. Cæterum quum gutturis interni mu-
sculi

sculi inflammantur, eum affectum, anginam *Angina.*
 esse constat, quæ simul & vocem, & spi-
 rationem lædit. Ac idem quoque in vniuer-
 sum facere solent omnes præter naturam
 tumores, siue in spiritalibus viis exorian-
 tur, siue extrinsecus ipsas comprimant. Sic
 enim gula quoque vbi inflammatione affe-
 cta est, vt comprimat asperæ arteriæ tuni-
 cam, qua cartilaginum ipsius partes extreme *Cartilagi-*
 10 figmoides vocatæ (id est, quæ figma literæ *nes figmoi-*
 figuram referunt) coniunguntur, & spiratio *des.*
 ni, & voci noxam afferre consuevit. Haud
 absimile quoque vitium inducit, verte-
 brarum ceruicis in anteriorem partem lu-
 xatio, sed de his iam antea dictum est. Igi-
 tur omnes huiusmodi affectus voci adue-
 niunt, propriis ipsius instrumentis familiari
 aliquo vitio, siue primogenia affectione,
 siue per consensum laborantibus. Nam id
 20 ad propositum sermonem nihil conducit.
 Sunt prætereà alij affectus, cum peculiari sua
 materia priuatur. Atque in commentariis de
 voce dictum iam est, quòd propria huius
 actionis materia, generatim quidem loquen-
 do, est expiratio: secundam speciem verò, at- *Expira-*
 que propriam differentiam, exufflatio. quæ *tio.*
 quidem est, quā afflatim spiritus foras effier- *Exuffla-*
 tur, intercostalibus musculis ad hanc actio- *tio.*
 nem concurrentibus. Vnde fit, vt per vehe-

mentia thoracis vulnera, atq; omninò ipsius
 in altera parte resolutionem, in primis qui-
 dem semispirans, ac mox animal semiuocale
 euadat: idq; per accidens. In apoplexiâ verò,
 sopore, morbo comitiali, vigilantî sopore,
 communi ratione earum actionum quæ ab
 impetu & voluntatis imperio procedunt,
 vocem lædi contingit, siue spinæ partes pri-
 mæ, siue simul cum iis cerebrum quoque af-
 ficiatur. His itaque quinque inter se conse- 10
 quentiâ quadam conuenientibus, expiratione,
 exufflatione citra strepitû, strepenti exuf-
 fatione, voce, loquela: si earum prima læda-
 tur, reliquas omnes lædi necesse est: vltima
 verò læsa, reliquæ haudquaquam læduntur.
 At cum secunda, tres reliquæ læduntur, cum
 tertia, duæ vltimæ: cum quarta verò, sola po-
 strema læditur. Etenim si nihil omninò spi-
 ret animal, vel ex vtrisque thoracis partibus,
 vel ex altera parte duntaxat: & quidem si ex 20
 vtrisque celerrimè suffocabitur: si ex altera
 tantùm, semispirans, atque semiuocale red-
 detur: perdetque simul reliquarum dein-
 ceptus duarum actionem partem dimidiam.
 Quarum alteram exufflationem citra strepi-
 tum, alteram verò, strepentem nominare
 consueuimus. Quòd si expiratione seruata,
 corrumpatur exufflatio, reliquæ tres actio-
 nes, strepens exufflatio, vox & loquela, si-
 mul

Strepens
 exuffla-
 tio.

Exuffla-
 tio citra
 strepitû.

mul corrumpentur. Sicut voce pereunte, lo-
 quelam quoq; perire necesse est. Cùm itaq;
 dictarum actionum opifices musculos co-
 gnoueritis: superest considerare, qui ex ipsis
 proprio affectu laborent, & quorum actio
 ledatur per accidens. Quòd si quidpiam eo-
 rum, quæ ex corporum dissectione vidistis,
 obliuioni tradideritis, admonebunt vos, ij
 quos de respirationis causis, atque de voce
 10 perscripsimus, commentarij. Atque de his
 ipsis, in secundo libro de Viuorum disse-
 ctione, etiam dictũ est. Sanè expirationem *Musculi*
 faciunt, vniuersi thoracem contrahentes mu- *expiratio-*
 sculi: Exufflationem (quæ vehemens expi- *nẽ et exuf-*
 ratio est) intercostales maximè: Strepentem *flationẽ ef-*
 exufflationem, ij qui in faucibus sunt: Vocẽ *ficientes.*
 verò ipsam, gutturis musculi efficiunt. Sed *Loquendi*
 lingua articulatiuam vocem distinguens, lo- *usus.*
 quendi usum præstat: atq; nonnihil ad hanc
 20 rem conferre videntur dentes, labra, narium
 foramina, palatum, gurgulio: prætereà me-
 dio cre linguæ ipsius vinculum. Itaque bal- *Balbi.*
 bis blæsisque, atque aliis qui impedita sunt *Blesi.*
 loquela, loquutionis instrumentorum ali- *Lib. 6. a.*
 quod, aut cum natura ipsum formaret, aut *pho. 32.*
 postea, lædi certum est. Veluti quum vel po-
 lypus, vel aliud quidpiam narium foramina
 obstruit, aut ex primis dentibus aliquis de-
 perditus est, aut vbi labia fuerint mutilata.

Verum quo pacto quidem tenuē obtineant
vocem: ac praterēā quomodo aliā vocis,
tūm differētiē, tūm affectiōnes, fieri possint,
vt rauca, resonans, tenuis, aspera, obicūra, in
commentariis de voce sufficiēter diximus.

*Quibus notis sedes affectū in dyspnœa depre-
hendatur.*

CAP. VIII.

ATque de dyspnœa (id est difficili re- 10
spiratione) iam antea, vbi spinæ pas-
siones percurrimus, multa dicta sunt. Qui-
bus nunc in memoriam reuocatis, quæ ac
presentem contemplationem supersunt, sub-
iungam. Itaque in vniuersum expeditè vos
meminisse velim, musculorum thoracē mo-
uentium, neruorumq; , qui ad ipsos perue-
niunt, quos in corporum dissectione vidi-
stis. Igitur introeūtes ad hominem diffi-
culter spirantem, in primis considerate, an o- 20
mnes thoracis musculi moueantur, an soli
intercostales sine superioribus, atq; an simul
cum intercostalibus præcordia quoq; mo-
ueantur. Quum itaque conspexeritis omnes
moueri, vnā ex tribus, quas dicemus, cau-
sis, huiusmodi motionem efficere putādum
est. ac deinde quæ sit illa, quæ nunc infestat,
perpendere oportet. Quòd si nō omnes mo-
uentur, aliter definire. Subiiciamus igitur
aliquem

*Difficilis
spiratio-
nis causa.*

aliquem omnes simul mouere musculos, vt
pectus vnà cum scapulis manifestè subleue-
tur. In hoc opere ex tribus vnum aliquod
conicere necesse est: Aut virium imbecillita-
tem, aut viarum spiritus angustiam, aut ve-
hementem in corde & pulmone calorem.
Quamuis interdum duæ, ac nonnunquàm
(licet rarò) tres quoque ex iam dictis causis
concurrere possint. Atqui tribus quidem si-
mul conuenientibus, proximam mortem ti-
mere oportet. vbi verò duæ fuerint, difficile
est ægrum seruare. Sed vnâ duntaxat infe-
stâte, peculiari opus est finitione, vt sciatur,
vtrum ad sanitatem perueniat æger, an sub
malo succumbat. Igitur vbi vires duntaxat *Vires infir-
mæ in dys-*
fuerint infirmæ, ad tria mouentium muscu- *pneæ.*
lorum genera venire, eosq; omnes ad mo-
tionem excitare solent, vno genere mouere
pectus nequeunte. Quippe si septũ transuer-
sum solum, veluti quũ secundũ naturã se ha-
bet, sufficienter mouere posset, neque in-
tercostalibus, neque superioribus musculis
indigeret: quoniam verò imbecillum est, o-
mnes sensim mouet, sed neque frequentem,
neque raram omninò facit actionem. His
igitur adhibenda est mens, nam cetera haud
difficiliter per ea discernuntur. Sanè pluri-
mũ aucto in spiritalibus instrumentis ca-
lore, omnibus quidẽ thoracis musculis agit

animal, sed velox frequens, & vehemens est eorum actio, quando videlicet citra virium imbecillitatem, calor infestat. Ad virium imbecillitatem, ubi flammeus calor non accesserit, neque velox, neque frequens omninò comitatur motus proinde non ita multum, omnes thoracis partes delatare potest. Quippe hoc dyspnœæ genus, cum ea quæ ob nimiam incensionem facta est, vnum commune habet, quòd omnes thoracis muscoli per ipsam agere coguntur. Quinetiam ubi ob plurimum calorem spiratio difficilis est, præter magnitudinem, frequentiam, & celeritatem, hoc quoque accedit, quòd calidus, feruensque spiritus, exufflando produci-
 tur. At in virium imbecillitate, nulla ab ore facta exufflatione spiritus, ex solis na-
 ribus emitti solet. Quòd si per inspiratione cōtra-
 nem cuiusdam narium pinnae manifestè con-
 strahi videantur, id verò efficax prostrati
 pnaa. roboris indicium est. Ob spiritalium verò instrumentorum angustiam, totus quidem thorax magna ex parte, & celeriter, & frequenter dilatatur: sed qui sic laborant sine exufflatione spiritum reddunt. Si verò simul conueniunt in spiritalibus instrumentis, & calor, & angustia, vt in peripneumonia: tūm neque maxima, neque frequentissima, neque etiam celerrima spiratio suffi-
 cere

cere potest: sed surgere tentant sic laboran-
 tes: etenim sentiunt hoc pacto thoracem fa-
 cilius dilatari. quippe qui decumbentibus in
 sese concidit, eò quòd pectoris partes ad spi-
 nam declinant: quâ erecta, thorax etiam si-
 mul fertur, non amplius seipsum grauans. Ac
 similiter quoque respirare solent, ij quibus
 asperæ pulmonis arteriæ plurima defluxio-
 ne opplentur, aut vbi ex proximis locis in
 10 ipsas aliquid deriuatum est, à superioribus
 verò vnica duntaxat re differunt, quòd neq;
 exufflant, neque calidum spiritum emittunt.
 Sic etiam iis, quibus inter thoracem pulmo-
 nemque magna puris quantitas collecta est, *Suppurato-
rum respi-
ratio.*
 quos suppuratos vocant totus thorax attol-
 litur: sed neque calidus est ipsorum spiritus,
 neque etiam exufflâdo emitti solet, nisi adu-
 rens fortasse febris accesserit. Verùm ij celer-
 rimè suffocantur, tum ob affectum ipsum,
 20 tum quòd vires omnibus suppuratis ex ne-
 cessitate imbecilliores redduntur. Sed non
 necessariò influxionibus quæ ad pulmonē *Fluxio in
pulmonē*
 irruunt, aut peripneumonia, aut asthma-
 te (id est anhelatione) robur prosternitur. Nā
 contrā per anhelantes affectus, crassis & vi-
 scosis humoribus pulmoni impactis vires
 robuste, cōstantesq; permanere possunt. At- *Tubercu-
lum in pul-
mone.*
 que si tuberculum, coctū difficile, aliquan-
 do in ipso natū fuerit, thorax maximè qui-
 dem

† Πολὺν dem dilatabitur, † sed non ita multum inspi-
 ρῶν ἰσχυρὰ rabit aërem. † Ac licet continenter spirare co-
 ὄναι ἔρ αἰ gatur, non tamen exufflare solet, id enim au-
 ρα, multū ἔτι caloris proprium est. In eādem dyspnœæ
 verò aërē speciem, sed alia ratione, labuntur ij quoque
 inspira- quos angina molestat, ob angustiam quæ
 bit. hic au non sit in concauitatibus, quæ inspirationem
 tem aliū suscipiunt, sed in iis quæ ipsam transmittunt.
 codice se. Quibus verò, & abscessus, & inflammatio,
 cutus est, atque humorum plenitudo, in thoracis aut
 cui & nos pulmonis cauernis consistit, nulla obstru-
 subscribi- ctione accidente in gutturis atque asperæ ar-
 mus. teriæ concauitatibus, illis videlicet quæ in-
 † καὶ, δὲ spiratum aërem suscipere solent, si tūm angu-
 τῷ ideo- stia constringat, ex necessitate sequetur ma-
 q̄i- gna thoracis dilatatio, sed nō ita multus tra-
 hetur spiritus. Proinde laborantem & celeri-
 ter, & frequenter spirare necesse est. Præ o-

Magnæ mnibus autem vos meminisse velim, magnæ
 respiratio respiratiōis geminas esse differētias, fit enim
 nis diffe- interdum ob dilatationis à thorace proce-
 rentia. dentis magnitudinem: interdum verò, ob
 inspirati aëris multā essentiā. Scitis nimirum
 quod sepe numero vos admonere soleo earū
 rerum, quæ à prioribus omissæ sunt. Nam
 quas ipsi persecuti sunt, earum propter scri-
 ptorum multitudinem, facilis atq; in prom-
 ptu est memoria. Quæ verò ab Hippocrate
 (quamuis accuratè de dyspnœa scripserit)
 non

non sunt definita, ea posteriorum nemo explicauit definitiue. Idcirco necessarium esse putauit, creberrimè illorum vos admonere. Igitur quicumq; sine inflammatione, vel omninò sine aliquo præter naturã tumore aut angustia spiritaliũ instrumentorum, per febres ardentes difficulter spirant, iis inspirati aëris quãtitas, magnitudini dilatationis thoracis, proportionem respondet. Quibus verò, *Dilatatio*

10 vel tumor, vel angustia, sine flammeo calore in spiritalibus est, in his thoracis quidem *thoracis* dilatatio maxima est. id verò quod inspiratur, non solùm dilatationem proportionem *quãdo vehementior aut periculosior.* non assequitur, verùm etiam minus quàm secundum naturam inspirari solet, attrahitur.

At sine distinctione, vnã dispositionem ostendit magna thoracis dilatatio si raritatem simul acceperit. Verùm animaduertere oportet ne aliquando in hac decipiamini, putantes eam spirationem, quæ ob virium *Spiratio ob virium* imbecillitatem omnibus agētibus musculis efficitur, eandem esse cum magna. Quam *imbecillitatem.* equidẽ quo clarior esset interpretatio, sublimen vocare volui: hicque mihi facilè fuit *sublimis spiratio.* intelligere. Hippocratem eum sublimen vocare spiritum, qui altioribus thoracis partibus inspiratur. Quemadmodum quum in *Libr. I. prog. 27.* quit: Magnus spiritus & ex longis interuallis delirium declarat: cõstat eum magnum pro multo

multo dixisse. Is verò bifariam fieri potest, vel sine superiorū musculorum actione, vel ipsa quoque concurrente. Nam plerunque intercostales musculi, vnā cum septo transuerso, ad multam thoracis eleuationem quā multus spiritus alliciatur, superiorum musculorum auxilio non indigent. Quodd verò huiusmodi eleuationis species, deliriū portendat, in commentariis de Dyspnœa iam ostēdimus, vbi etiam cuiuslibet difficultatis anhelitus dispositio, declarata est. Nunc verò, vt compendio quodam, hīc explicamus eos affectus, quos in aliis antea cōmentariis iam percurrimus: ita & de dyspnœarum differentiis, partim quidem dictum est, partim verò in sequentibus dicemus. Nam magnarum respirationum, alia quidem crebra est, atque huic sunt differentiæ complures, quarum aliæ alias dispositiones indicant. Alia verò rara, vnicam indicans dispositio-
nem. Sic etiā de exigua dicendum est: quodd rara quidem, spiritalium instrumentorum frigiditatem: frequens verò non solum spiritalium, sed eorum quoque quæ cum ipsis mouentur, vt hepatis, lienis, ventriculi, gula, laborem portendit. Quum igitur plures sint dispositiones, quas per vehemētes motus dolor comitatur: ex aliis notis, & considerandum & definiendum est, siue inflammatio

Dyspnœarum differentia.

*Varie dispositio-
nes
dolorē ex-
citantes.*

matio quædam, siue erysipelas, siue vlcus,
 siue abscessus dolorem efficiat. Quinetiam
 didicistis quòd inæquales intemperantiæ,
 dolores excitare sæpenumèrò solent. Simi-
 liter spiritus crudi flatuosiq; copia, qui ar-
 ctatus aliquãdo, partes ipsum ambientes di-
 stendit, aliquãdo verò violenter egreditur.
 Præterea calidi & acris, aut frigidi: & lenti
 humoris abundantia: si aliquando retentus
 10 succus, ambiētia corpora distendat, aut inde
 violēter exeat, dolores efficere potest. quòd
 si grauius affecta fuerint instrumēta, in qui-
 bus huiusmodi res continentur, dolent, vel
 nō mota: si verò leuior fuerit affectus, quã-
 do mouētur. Verum in libris de Dyspnœa, *Libro 2.*
 causam explicauimus, cur exiguæ spiratio. *Frequens*
 nis, frequens quidem spiritus, motorum per *& rarus*
 respirationem instrumentorum, laborem *spiritus*
 significat. Rarus verò, vehementem refri- *quid indi-*
 20 generationem, & quidem spiritalium dunta- *cent.*
 xat, præcipuè pulmonis, & cordis. Est etiam
 alia dyspnœæ species, quum veluti breui
 quadam quiete, intercipitur opus thoracis,
 idq; nōnunquàm aspirando nonnunquàm
 verò respirando, siue hoc accadat ob mu-
 sculorum thoracis conuulsionem, siue ob
 caloris copiam, cogentis laborantem cōti-
 nenter vel aspirare, vel respirare. Est insuper
 alius respirationis affectus, quem apnœam
 (quasi

Apnœa, (quasi non spirationem dixeris) nominant,
nulla aut nulla, ut aspicientibus videtur, facta respira-
abolita spi tione. Verum ut rei ipsius natura declarat, eā
ratio. non fieri incredibile est. Nam impossibile
Libr. de videtur ut animal omni spiratione exactē
usu par- priuatum, in vita seruari possit, quamuis ea
tium. animalia quæ in cauernis latere consueue-
 runt, thoracem mouere videantur minimè.
 Proinde duorum alterum conicere oportet, aut adeò exiguam fieri spirationem, ut
 sensum effugiat, aut huiusmodi animalia tūc
 spiratione omninò non indigere, sed eam
Transpira transpirationem, quæ per vniuersum corpus
tio per v- fit, sufficere: quippe hanc, cor ipsum per arte-
niuersum rias efficit. Respirationem verò, per thora-
corpus ab cem cerebrum efficere constat. At verò di-
arteriis. spositio, quæ apnœam facere potest, omni-
Respira- bus animalis partibus communis esse vide-
tio fit per tur, veluti in apoplexia, sopore, morbo co-
thoracem. mitiali, catalepsi. Nam in his omnibus, nul-
Apnœa o- lus proprius affectus, spiritalia instrumenta
mnibus præ cæteris infestat, non magis quàm vocis,
partibus aut locutionis, aut progressionis instrumen-
cōmunis. ta: sed affecto principio, omnia quibus vires
 suæ per quas reguntur ab ipso suppeditari
 consueuerunt, ei consentire necesse est. ve-
 rum de apnœa iam & particulatim, & per se
 diximus: quamobrem tempus est, ut nunc
 ad alia transeamus.

De

De pulmonis affectibus.

CAP. IX.

Igitur quū exercitationis via, qua ad affe *Exercita-*
 thoracis locorū notitiam peruenitur, du- *tionis via*
 plex sit, altera quidem ab apparentibus acci *ad affe-*
 dentibus, altera verò à corporis partibus. si *thoracis lo-*
 quis per vtrasque voluerit exercitari, eadem *corum no-*
 bis dicet, quamuis alio & alio modo, vt de *titiam.*
 pulmonis confestim affectibus dictum est: *Pulmonis*
 10 præterea etiam vbi de dolorum ratione, de *affectus.*
 sanguinis reiectione, ac de dyspnœa dixi-
 mus, atque in præsentia quoque dicemus.
 Etenim vehementi dolore nunquam cru-
 ciatur, verum & gravitatis sensum, & ali-
 quādo extensionē quandam, vel ad pectus,
 vel ad spinā peruenientem percipere potest.
 ibi enim membranæ ipsum ambientes su-
 spenduntur. Sæpenumerò etiam angustia
 molestantur laborantes, atq; ob hoc crebrò
 20 celeriterq; spirant, ac thoracem vehementer
 attollunt, sed non ita multum aërem attra-
 hunt. Hæc si citra febrem acciderint, aut tu-
 berculum, aut lentorum, crassorumve, aut
 quorundam aliorum humorum plenitudi-
 nem in eo existere, aut pus, aut alium quen-
 dam humorem, vel lentum, vel crassum, vel
 multum in ipsum effusum fuisse declarant. *Tuberculi*
 Verum ea inter se per præterita accidentia *pulmonis*
 discernere licebit. Nanque si quis per bo- *signa.*

Q

nam valetudinem, quum solitas actiones
facere potest, sic difficulter spirare incepe-
rit, augeaturque accidens, neque inter re-
spirandum stertere videatur, crudi tubercu-
li ortum suspicari oportet. Si verò sterten-
do strepitum fecerit, lentorum, crassorum-
que humorū pertinaciter impactorum mul-
titudinem, pulmonis bronchia molestare
indiciū est. Quòd si illico ab angustiae sen-
su quis difficulter spirauerit, fluxionem vel
à cerebro, vel à vicinis sedibus in pulmo-
nem irruentem portendit. Sed quum fluen-
tibus in pulmonem, vel viscosis, vel crassis,
vel multis humoribus, hominem difficulter
spirare dico, in bronchiis eos contineri, in-
telligas velim. Vt enim in totum viscus le-
uis arteria diuiditur, ita etiam bronchio-
rum essentia in totum pulmonem, ab aspe-
ra arteria procedit. Vocantur autem à dif-
sectoribus bronchia, asperæ arteriæ cartila-
gines, sigma literæ figuram referentes. At
vbi pleuritis præcessit, mox remissa febris ve-
hementia, intra latera grauitas in imo tho-
racis derelicta sentitur, ac vbi quis affatim
à decubitu transinutatur, idque maximè si
ab vno latere in aliud se conuertens deflue-
re aliquid sentiat, puris multitudinem ibi
contineri, haud dubia coniectura est. Quin-
etiam in iis fluctuatio sæpenumerò haud
obs

Bronchio-
rum pul-
monis af-
fectorum
nota.

Bronchia
quid vo-
centur.

Multipu-
ris in pul-
monibus
collecti
nota.

obscure auditur. Accedit ad iam propo-
 tas notas hoc quoque indicium, si vehemen-
 ti prægressa pleuritide nihil penè laborans
 expuerit. Si verò citra febrim, serofus aut pi-
 tuitosus humor in thoracis spacium subito
 defluens, spirandi difficultatem excitaue- *Sputi in*
 rit, laborans, tenue sputum, idque ab initio *pleuriti-*
 quidem exiguum, sed cum vehementi tussi: *de aut*
 vbi verò concoctum est, plus atque cras- *pulmonū*
 10. sius, & cū mitiore tussi expuere solet. Quip- *dolore cō-*
 pe bifariam accidere potest, vt vehementer *sideratio.*
 tussiendo pauca quis expuat: alii enim ob
 lentum crassumue humorem, alii ob te-
 nuem id facere videntur: siquidem tenuis
 humor quum subleuatus est, inter tussien-
 dum à spiritu diuisus refluit. Lentus verò
 aut omnino crassus difficulter effertur: vt
 pote qui non tam facile à corporibus qui-
 bus impactus est, abstergi, neque etiam à
 20 quauis occurrentis spiritus violentia impel-
 li potest: nisi enim spiritus qui tussiendo ef-
 fertur, & multus & vehemens fuerit, nihil
 secum educet. Igitur sputum quod neque
 liquidum aut aquosum admodum fuerit,
 neque crassum etiam aut lentum, id facile
 efferri solet, maximè vbi validæ fuerint vi-
 res. Etenim sine vehementi thoracis cōtra-
 ctione vehementer tussire nemo potest. At *Valida*
 sine valida tussi, crassos lentosque humo- *tussio.*

Q 2

resefferri impossibile est. Igitur quando cū spirandi difficultate, cui & angustia & grauitas coniuncta est, acuta quoque febris inciderit, is affectus inflammatio pulmonis est.

Pulmonis inflam- At si intolerabile fuerit incendiū, angustiaē verò, grauitatisque sensus minor, erysipelas ipsum vexare censendum est. Extremis au-

Erysipelas pulmonis. tē ita definitis, quid sit erysipelas phlegmonodes, aut inflammatio erysipelatodes, haud difficulter deprehendetur. Sunt alii pulmo-

Intempe- nis affectus, vbi citra humorum affluentiam intemperies ipsum infestat, siue æqualis ea fuerit, siue inæqualis. Igitur inæqualis tussim

ries æqua excitat, æqualis verò, si moderata est, rhyth-

lis, & in- mon immutat: at si vehemens, idque vincē-

æqualis te calore, frigidi aëris, atque potionis cupi-

pulmonis. ditatem inducit, ac tractu temporis finitur

in febrim: per frigidam autem intemperiem

contraria euenire solent, quippe si modum

seruauerit, calidi aëris, ac calidæ potionis de-

syderium excitat: si verò modum excedit,

replet viscus ipsum fluxionibus. Caterūm

de ea tussis specie, quā sanguis ex ipso reiici-

tur, vel exeso, vel rupto vase aliquo, vel ore

Sanguis alicuius venæ patefacto, antea vbi de san-

nis emis- guinis spūto mentionem fecimus, iam di-

sio per tus ctum est. atque nunc quoque pauca quædam

sim. dicemus. Porro ruptiones in ipso deprehen-

des, tum ex multi sanguinis fluxione, tum ex

magna

magna notabiliq; aliqua causa quæ præces-
 fit, si subitò aduenerit. Voco autem præce- *Præceden*
 dentes causas, vt quum aliquis ex alto, vel in *tes cause*
 ludo, vel certamine ceciderit, aut quū alter *vasis ru-*
 super alterum cadit, aut vbi ex inanimatis *ptionē in*
 corporibus aliquod graue, vt vel lapis, vel *thorace*
 lignum, thoracem læsit. Nonnullis ira cum *aut pul-*
 exclamatione præcessit. Quinetiam citha- *mone effi-*
 roedis tragœdisq; certantibus, aut acuta ve- *cientes.*

- 10 hementiq; voce clamantibus, vasa interdum
 dirumpuntur: maximè vbi non præmissa
 pulmonis per præcedentes exclamations
 lenitione, violenter clamare conantur. Vt
 enim luctatoribus, si certamen aggredian-
 tur, musculis prius neque calefactis, neque
 per frictiones aut moderatas motiones ex-
 planatis, partes quædam rumpuntur, atque
 cōuelluntur, ita etiam pulmoni accidere so-
 let. Hunc quia frictionibus ad vehementes
 20 motiones præparare nō licet per exclama-
 tiones, quæ frictionibus proportionē respō-
 dent, id efficere studemus. Insuper nulla ma-
 nifesta extrinsecus adueniente causa, vt in *Cause ru-*
 cæteris corporis particulis, ita in pulmone *ptionis va-*
 quoque vas aliquod ob sanguinis abūdan- *sis in pul-*
 tiam dirumpi potest: quum videlicet exten- *mone.*
 sioni resistit, aut ob frigus à vicinis partibus *Lib. Epi.*
 contractum, aut ob innatam intemperiem. *6. par. 3.*
 Ita Hippocrates venas (inquit) frangit aqua *Aph. 10.*

frigida. Atqui ipsa per se rupturas non facit, sed quia venarum tunicas frigiditate sua duras, & extendi contumaces reddens, ut rumpantur paratiores efficit. Rruptionis vero causa est, aut vehemens motus, aut humorum abundantia, qui vel per se, vel una cum crudo & frigido & flatuoso spiritu venas extendunt. Verum fractionis ab huiusmodi haud obscurum indicium praebet, subita cumulati ac vniuersum fluentis san- 10

Venarum guinis vacuatio. Quum vero venarum ora *ora quan-* aperiantur, non frigida, sed è contrario, calida *do ape-* lidæ dispositiones praecedunt, veluti ubi *riuntur.* multis eisdemque calidis balneis homo utitur, atque terram inhabitat calidam, fueritque anni tempus eiusmodi, similiter alimenta quoque, & potiones. At quæ eroso

Erosio va- vase aliquo affatim accidunt sanguinis euas- *sis in pul-* cuationes, eas praecedere solent exigua spumone. *mone.* ta, atque acres in pulmonem à capite fluxiones. 20 Nonnunquam vero & pulmonis aliqua pars, aut ramentum simul efferri videtur, ut neminem latere possit, ad pulmonem hunc affectum pertinere. Orto vero *Vlcus in* in aspera arteria vlcere, praeter hoc quod *aspera* sputum purulentum apparet, dolorem quoque in loco affecto laborans sentire consuevit: ipsum vero per ea quæ screantur, quia exigua sunt, ab vlcere quod in pulmone

mone natum est, discerni potest, quippe ab
 vlceribus pulmonis plurimum sputi reiici-
 tur. Atque vt ex pulmone educa particu- *Vlcus in*
 la visceris ipsius vlcerationem significat, *pulmone.*
 ita ex gutture videmus interdum corpu-
 sculum aliquod à ligula (Græci epiglot- *Ligula*
 tida vocant) per vlcerationem excreari. Id *vlcus.*
 verò non solum hoc indicio deprehendi-
 tur, verum etiam ex eo, quòd in vlcerato
 10 loco doloris sensu laborans infestatur, ve-
 luti de aspera arteria dictum iam est. Et-
 enim pulmonis vlcera dolor non comi-
 tatur: ea verò quæ in iis sedibus oriuntur,
 dolorem quidem inducunt, sed non vehe-
 mentem, vt si alicui suapte natura hebes
 fuerit sensus, ipsum planè non percipiat.
 Igitur persæpe vidimus eos quos iam su-
 præ proposuimus affectus, & qui pulmoni
 & spacio thoracis, & asperæ arteriæ, & gut-
 20 turi accidere possunt: quippe omnium ho-
 rum sermonis communitate inducti men-
 tionem fecimus. Qui verò deinceps dicen-
 tur, non ita crebrò nobis apparuerunt. Qui-
 dam humorem repente expuit, liquidæ *Signæ*
 bili in colore perquam similem: medium *pulmonis*
 videlicet inter flauum ac pallidum, ac nul- *à putre-*
 la acredine infectum: atque ita quoti- *faciente*
 die magnam eius quantitatem expuit, dein- *humore*
 de leui suborta febricula tabescere incepit, *affecti.*

adeò vt purulenta 'screaret. Postea tractu
temporis, quatuor videlicet mensium, exi-
guum cum pure cruorem reiecit, atque sic
aucta febre magis consumebatur: ac iterum
atque iterum plus expuebat, adeò vt ma-
gnam sputi quantitatem redderet: quocirca
magis crescente febre, ac resolutis viribus,
eorum qui tabe marcescunt exemplo mor-
tem obiit. Deinde alium vidi, eodem ferè
modo sex mensibus: ac alium quoque diu- 10
rius laborantem. Igitur qui primus nobis
occurrit, initio quidem nihil mali habere,
sed tandem pessimè affici visus est. Alterum
verò quum conspiceremus, ei statim ab ini-
tio cognito malo, præsenti medicamento
succurrere tētauimus: ac multo magis etiam
tertio. At quamuis multo negotio vtrunq;
liberare conaremur, nihilominus neq; ho-
rum vllus, neque alius post eos seruari po-
tuit. quum enim morti iam proximi essent, 20
pulmonis ipsius putres quasdam partes ex-
puebant. Proinde facile cognoui, haud ab-
simili eos affectu laborare, qualem in ex-
ternis partibus videre solemus, quum à pu-
trefaciente quopiam humore inficiuntur.
verum has & abscindere & vrere possu-
mus: pulmoni verò horum auxiliorū neu-
trū adhibere licet. Quapropter omnes peri-
re necesse est. At verò postremum quum
vide

*Pulmonis
frusta per
sputū eie-
cta.*

viderē, ad visceris fortem exiccationē soli-
 cito me animo conuerti, & quidem odori-
 bus atque potionibus ad id efficacibus. Pro-
 inde medicamentū quod hedychroum vo-
 cant, interdiu naribus ipsius iugiter adhibe-
 re iussi: ad somnum verò sese conuertenti
 præscripsi, vt nariū foramina ex aliquo pre-
 ciosorum vnguētorum illinerentur, qualia
 videlicet Romæ præparari solent, vocant
 10 verò ea & foliata & spicata. Atque dedi in
 potu medicamenta, mithridaticam voca-
 tam compositionem, ambrosiam, athana-
 siam, theriacam. Itaque perpetuo anno sic
 educatus, tandem similiter vt reliqui tabidi,
 vitam finiuit: quam fortasse ob iam dictam
 educationem longiori tempore protraxe-
 rat. Præterea alium huiusmodi affectum in
 pulmone notauī. Quidam diuturna tussi
 vexatus, & exiguum lentumq; pus expuens,
 20 frustum quoddam paruo grandinis grano
 haud ab simile excreauit, ac deferens illud
 mihi ostendit, atque rursus non ita multo
 post aliud quoque attulit: vnde conieci,
 lentum illum humorē, quem antea expue-
 re solebat, siccatum induratumq;, ad huius-
 modi substantiam peruenisse: quam obrem
 medicamentū ei in potu dedi, quod asthma-
 ticis auxiliatur, atque ita factum est, vt mi-
 norem expueret grandinem, atque longiori

Medicatio

pulmonis

à putrefa

ciente hu-

more affe

cti.

Hedy-

chroum

medica-

mentum.

Foliata &

Spicata

vnguēta.

Grado ex

pulmone.

Q 5

Mirum est quàm antea interuallo, neq; pluribus dein-
quod qui- ceps annis adeò mitigari potuit affectus,
dam sub quin tandem moreretur. Cæterum grandi-
mortē sup nes ipsæ magna ex parte erui magnitudinē
purationē æquabant, quamuis interdum maiores, in-
ad instar terdum minores esse viderentur. Atq; alios
oui mēbra quoque similiter quidem spuerē, sed nihilo-
na clau- minis in multos annos vitam extendere vi-
sam per dinus. Quorum alii aliam ob causam, alii
asperā ar- verò ob spiritalium instrumentorum affe- 10
teriā reie- ctum mortui sunt, quamuis nihil cruoris
cit. excrearent. Ea verò quæ Antipatro medi-
Antipatri co acciderunt, nemo est qui nesciat, utpote
medici qui medicam artem publicè apud Roma-
morbus, nos professus est. Agebat hic ætatem sexa-
quo extin- ginta quidem annis minorem, sed quinqu-
tus est. ginta iam annos excesserat. Is correptus ali-
quando febre quadam ephamera, idq; ab
evidenti causa, declinante iam febre, ut quid
sibi facto opus esset intelligeret, pulsus 20
ipse suum tangere aggressus est. Quum igitur
omne inæqualitatis genus in arteriarum
motione inueniret, in primis quidem terri-
tus est: deinde verò quum sese non febrile
planè sentiret, illicò balneum subiit. quippe
laboribus ac vigiliis corpus fatigauerat. At-
que tenui quoq; victu, donec diem tertium
præterisset, usus est. quo quum nulla appa-
reret febris, ad solita negotia pertractan-
da

da prodiit : atque arteriam in extrema brachii sui parte tangens, admiratus est perseuerantem in pulsibus inæqualitatem. Occurrens itaque mihi, extendit manū ridens, iussitq; pulsū tāgere. At ego subridens, quid inquam portēdit hoc quod proponis ænigma? Ille iterum ridens obnixè orauit, vt tangerem. Igitur inter tangendum omnigenam in pulsu inueni inæqualitatem, non
 10 solū in multarum pulsationum cumulo, quam systematicen) id est congregatice, multitudine) vocant, verū etiam in vna arteriæ distinctione. proinde miratus quomodo [adhuc] viueret, quum talem haberet pulsationum sum, interrogavi, num difficilis esset ei respiratio. illo verò nullam se sentire respondente, obseruavi equidem an aliquando mutaretur, quippe sex mensium spacio assidue arteriam tangebam. Quumq; ab initio
 20 interrogaret, quam corporis dispositio mihi videretur posse huiusmodi pulsū efficere, atque per quem modum, idq; citra febriem, ad eam quæstionem respondi, in commentariis de Pulsibus iam declarasse me huiusmodi inæqualitatem. Nanque ob magnarum in pulmone arteriarum angustiam id euenire putavi : angustię verò causam esse dixi, visceris inflammationem. At tibi hanc ob causam id nunc accidisse impos

impossibile est, quippe febre fuisset affectus:
Causa morbi Relinquitur igitur vel obstructione ex li-
Antipatri. quidis, & crassis, & viscosis humoribus, vel
 crudi cuiuspiam tuberculi ortum, in huius-
 modi te dispositionem induxisse. Tum ille
 respondens, oportuisset (inquit) me suspirio-
 sa orthopnoea laborare. At ego probabilia
 (inquam) ipsum dicere, sed a veritate aber-
 rare: quippe fieri nonnunquam huiusmodi
 orthopnoeam ob eam quam diximus cau- 10
 sam: id verò quum in asperis non in leuibus
 arteriis crassus & lentus humor cumulatur.
 Proinde omnē ei victus rationē, atque me-
 dicamēta quoq; haud aliter quàm asthma-
 ticis adhibere iussimus, deinde sex (vt dixi)
 mensibus elapsis, leui quadam spirandi diffi-
 cultate affectus est: accedente simul cordis
Cordis palpita- palpitatione, in primis quidem semel, dein-
tio, pul- de bis, atque ter, postea quater, ac saepius
monis af- quoque, aucta simul spirandi difficultate ad 20
fectū se- quindecimum vsque diem post quem diffi-
quitur. cillima derepente oborta spiratione, reso-
 lutus statim obiit, aliorum quorun-
 dam exemplo, qui cordis affe-
 ctibus laborant, de quibus
 posthac sermonem
 faciemus.

FINIS LIBRI QVARTI.

CL.

CL. GALENI

DE AFFECTORVM

LOCORVM NOTITIA

LIBER QVIN.

T V S.

*

10 Reliquos thoracis morbos & diaphragmatis,
deinde etiam gula, & ventriculis, postremo ie-
coris eadem methodo describit.



In precedenti libro, quū de pul-
monis affectibus ageremus, ser-
monis communitate, & thora-
cis, & cordis quodammodò me-
minimus: pleniorē verò, absolutiorēq;
de ipsis sermonem in quintum hunc librum
distulimus. Quoniam verò quartus liber in
accidentibus quæ Antipatro medico eue-
20 nerunt, finem sortitus est, læso in primis
ipsius pulmone. deinde ad cor etiā transeun-
te affectu, operæ precium me facturum arbi-
tror, si omnes eius affectus percurram.

De cordis affectibus. CAP. I.

Igitur quemadmodum de cæteris corpo-
ris partibus, ita de corde quoq; definiē-
dum est: quæ nam ipsi propriè, vel primario
affecto, vel utcunq; nominare volueris, su-
perueniant accidentia: quænam verò ipso
cate

cæteris partibus consentiente. Id autem ex
 his intelligi potest, quæ prius in aliis libris
 demonstrauius, vbi iam declaratum est,

Cor fons innati caloris cor velut fontem esse, neque
caloris. animal mori omnino posse, ni cor afficia-

Princi- tur. Quum itaque tres sint principes partes,

pes par- quibus gubernatur animal (quippe præter

tes cor- cordis principatum ostensum est sensum &

poris. motum, vniuersis corporis partibus à cere-

bro suppeditari: iecur verò nutricis facul-

tatis esse principium) semper mors ad im-

modicas sequitur cordis intemperantias: si-

mul enim cum ipso omnes vitiantur par-

tes. quum enim (vt ostendimus) ipse pecu-

liari cordis temperie actiones suas perficiant:

hac pereunte, actiones quoq; ipsarum peri-

re necesse est: ac proinde cerebri quoque,

& iecoris. Horum verò temperie deperdi-

ta non oportet cordis simul actionem peri-

re. Si enim neque sentiendi, neque mouen-

di ab electione facultatem animal habuerit,

neque nutriatur, veluti in latentibus euenit

animalibus, nihilominus viuere ipsum pos-

se, quoad cor manserit illæsum, haudqua-

quam negandum est. Quin videmus sæpe

numerò multis deinceps diebus alios neque

intelligere, neq; sentire, neq; etiam moueri,

ad nihilominus viuere: quemadmodum vbi

quis ob virium hepatis imbecillitatem sine

alimen

alimento permanens, diutiùs etiam sufficere potest. At verò si cor respiratione priuetur, hominem illico perire necesse est. Igitur qui ad spirandi functionem nihil conferre thoracem putant, ii causam reddere nequeunt, cur per vehementem apoplexiam, *Apoplexia vehementis.* superno duntaxat principio vitiatò, laborantes subitò moriantur. At vobis eam inuenire haud difficile est, utpote quibus effi-

- 10 caciter persuasum est, musculos qui motionis principiū à nervis in ipsos à spinali medulla, quæ in ceruice est, delatis suscipiunt, thoracem attollere, priuatis tūc musculis mouendi facultate, quæ ex cerebro ipsis influe-
re solebat. Etenim nisi ad spirandi functionem ambo principia simul iuncta concurrere oporteret, potuisset aliquis viuere, priuatus interdum superno principio. Igitur ex quibus causis inuenimus, cur affecto cerebro in vehementi apoplexia, cor quoq; lædatur, ex iisdem ipsis, sed secundum alium modum, causam quis inueniet. quam obrem in apoplexia minore, catalepsi, sopore, morbo comitiali, lethargo, animal ita affectum non pereat. Namque si diligenter consideraueris, inuenies per huiusmodi affectū, quomodò spirent laborantes: quippe videbis & violentam & difficilem spirationem, perinde ac si vinculo quodam constrictus thorax
attolli

attolli prohiberetur. Atq; huius rei sufficientem fecimus mentionem in libris de Musculorum motione. Nanque similis est hæc quaestio, ei qua de somno quidam hæsitant: quippe quum per somnum omnes musculorum actiones exoluantur, sola actio quæ ad thoracis musculos pertinet, seruetur. Nunc verò ea duntaxat dixisse satis fuerit, quæ in præsentia proposito nostro cōducere videbantur. Porro qua ratione homines per somnū ¹⁰ spirant, reliquis musculis omnibus quiescentibus, eadem quoque ratione per minorem apoplexiam, atque alios ei vicinos affectus spirare possunt. Vbi verò vel apoplexia, vel alius quispiam affectus adeò vehemēter increuerit, vt musculorū thoracis actio omnino deperdatur, perire simul respirationem necesse est. Vnde cordis quoque temperamentum soluitur: quo fit tandem, vt etiam animalis ipsius necessariò sequatur interitus. ²⁰ Atque hac ratione per vehementes superni principii læsiones animalia perire videmus. Iam ex iocineris quoq; affectu mori accidit sed alia ratione, inedia scilicet: vnde longiore tēporis spatio in huiusmodi affectibus vitam protelare possunt. Atq; mori contingit nōnullos per alium quoque modum, vt in syncopa, stomachi vitio eueniente, & vehementi dolore, & timore graui, & volu

Thoracis
musculo-
rum actio
per somnū
seruetur.

Syncopa
stomachi
vitio.

voluptate maxima. Et enim quibus vitale robur infirmum est, animi verò affectiones ob imperitiam fortes, iis animæ essentia facile dissolui potest. Atque horum aliqui ob mœstitiā interierunt, sed non illico; vt de superioribus diximus. At vir magnanimus neque ob mœstitiā, neque ob aliam aliquam animi ægritudinem mœstitiā fortiorē vnquam succubuit: vtpote cuius animæ

10 robur validum est, affectus verò non adeò vehementes. Caterū proprio quoque affectu cor laborare solet, vel ob simplicem intemperiem, siue inæqualis, siue æqualis ea fuerit: vel inflammationem, vel erysipelas, idque dum fieri incipit. Illicò enim antea quàm augebantur huiusmodi affectus, animal corrumpitur. Atque hos affectus rursus

cardiaca syncopa sequitur: quemadmodum quæ stomachi vitio fiunt syncopæ, ad eos

20 affectus, quibus os ventriculi (stomachum nonnulli appellant) infestatur, sequi solent. verū hæ consentiente corde eueniunt. Porro vtriusque partis, tum oris ventriculi, tum cordis dispositiones, aut à forti duntaxat intemperie, aut venenoso humore, nonnunquàm ab erysipelate, aut inflammatione, aut alio quopiam præter naturam tumore fieri solent. Igitur exiguæ quidem cordis intemperantiæ, pulsus arteriarum, pro sua

Animæ essentia dissolutio.

Proprij cordis affectus.

Syncopæ cardiaca.

R

quæque natura variant: de quibus in libro de Pulsibus, iam dictum est. Maiores verò per proprias quidem simularium partium intemperies subitam mortem non inducunt: per eas verò quæ ad instrumentales partes pertinent, subitò enecare possunt: sed præcedentibus prius signis quibusdam,

Hippoc. li. quorum vnum ab Hippocrate dictum est:

2. aph. 41. Qui sæpe & multum exoluuntur sine cau-

Palpitatio sa manifesta, ij repente moriuntur. Est & 10

cordis. alius affectus, palpitatio videlicet cordis, aut

Humor in per se eueniens, aut cum significatione qua-

ambiente dam, quòd in humore cor ipsum moueatur.

cor tunica Neq; enim mirum videri debet, tantam humo-

contētus. ris multitudinem cumulari aliquando in an-

biente cor tunica, vt ipsum, ne attollatur,

impedire possit. Quippe in animalibus dis-

sectis vidimus plerumque plurimum humo-

ris vrinæ speciem referentis, in eo, qui 20

ipsum inuoluit, panniculo contineri. Et

enim simia quædam quum emaciari indies

videretur, eam tamen necessariis nostris

negotiis impediti secare in tempore non

potuimus, post mortem verò, reliquis

corporis partibus omnibus illæsis, inuen-

tus est in ambiente cor tunica, tumor præ-

ter naturam, humorem in se continens,

qualem pustulæ (Græci hydatidas vocant)

emittere solent. Atque in gallo quoque

vidi

vidimus aliquando cordis tunicam huius-
 modi scirrhuso tumore affectam, perinde
 ac si plures crassæ membranæ inuolutæ al-
 tera alteri fuissent: verum in eo nihil hu-
 moris continebatur. vnde verisimilis conie-
 ctura elicitur, homines etiam similibus pos-
 se affectibus infestari. Inflammato autem *Cordis in-*
 manifestè corde gladiatores vidimus, haud *flāmatio.*
 aliter quàm qui cardiacâ syncopa pereunt,
 10 obiisse. Igitur si ad ventrem cordis vul. *Vulnus*
 nus aliquando penetrauerit, protinùs ma- *cordis.*
 gno cum sanguinis fluore hominem mori
 necesse est: idque præcipuè, si sinistrae par-
 tis venter fuerit vulneratus. Si verò non ad
 ventrem vsque pertingat, sed in cordis sub-
 stantia consistat vulnus, ex ita affectis ali-
 qui non solum ea die qua vulnerati fuerunt,
 sed sequenti quoque nocte viuere potue-
 runt: qui obortâ deinde inflammatione ex-
 20 tincti sunt. Atque etiam ij quandiu vixe-
 runt, mentis cōpotes inuenti sunt. vnde eui-
 dens sibi testimonium sumere potest ea se-
 cta, quæ negat rationalem animæ vim in
 corde consistere. Palpitatio autem visceris
 huius pluribus integra valetudine degenti- *Sanguinis*
 bus, tum adolescentibus, tum adultis subito *detractio*
 sine alio manifesto accidente euenire visa *in palpita*
 est. Atq; omnes eos sanguinis detractio iu- *tione cor-*
 uit. Atque hoc accidente planè liberati sunt, *dis utilis.*

qui post sanguinis missionem vfi sunt victu
& medicamentis, quibus esset extenuandi fa-
cultas. Horum verò nonnulli, quos rursus
huiusmodi accidens infestabat, simili cura-
tione sospites euaserunt. Cæterùm noui
quendam quotannis verno tempore huius-
modi palpitationis accidente vexatum, qui
quum per tres annos à sanguinis detractio-
ne se adiutum intelligeret, anno quarto, an-
tequam accidens ipsum inuaderet, sangui- 10
nem misit, idq; pluribus deinceps annis fa-
ciendo, idonea etiam post sanguinis detra-
ctionem medicamenta adhibuit. At nihilo-
minùs hic quoque ante senectutem morte
præuentus est, sicut & reliqui omnes, quorū
alij quidem per acutas febres, alij verò cū
sani degerent, affatim syncopa intercepti in-
terierunt. Quamuis vnus vel duo citra syn-
copam alia quadam mortis specie perierint. 20
At verò sic affectorum magna pars ætatem
agebat quinquaginta quidem annis inferio-
rem, sed quæ quadraginta annos excederet.
Porro panniculus cor ambiens. quomodo-
cunque affectus sit, nisi inflammatione infe-
ratur, inter ignobiles partes reputatur.
Quocirca ipsius dispositio per consensum
ad cor transcurrit. Cū enim ipse solus affi-
citur, exemplo reliquarum omnium par-
tium, quæ ad custodiam & tegumentum
cæte

† Apople-
xie modo
inquit.
Aegineta
in libr. 3.
hunc locū
transferēs.
Cordis pa-
niculi affe-
ctus.

cæterarum nobiliorum factæ sunt, nullum affert periculum. Cæterum nulla à corde spirandi difficultas oritur, præter eas quas in priori libro diximus, cum de dyspnœa sermonem haberemus. Etenim supercalfactû spirationem efficit magnam & densam, atq; celerem, ac calidum insuper spiritum reflat. Contrà refrigeratum, exiguam reddit spirationem & raram.

10

De thoracis affectibus.

CAP. II.

ATque huic quoque parti, vel primariò affectæ, vel aliis consentienti, quemadmodum reliquis omnibus, affectus quidam superueniunt, quos respirationem ledere necesse est. quippe proprium respirationis organum eam esse, iam demonstratum est.

Igitur ubi dolorificis affectibus molestat, exiguam densamque reddit spirationem, veluti in commentationibus de difficultate spirationis ostendimus. Id verò & vicinis quoque partibus, & iis quæ simul mouentur affectis, euenire solet. Nam diximus antea de spinæ affectibus, respirationem interdum lædi, thorace proprio affectu nequaquam laborante, sed vel neruo quopiam à spina procedente, vel spina ipsa affecta. Eorum verò, qui propriè ad thoracem pertinent, affectuum, quidam in ipsius musculis,

R 3

quidam verò in membrana costas cingente consistunt. Nam de his affectibus qui vel in cute, vel in costarum ossibus consistunt, hîc agere non proposuimus: in quibus locus affectus sensibus subiiciatur. Igitur quum ex musculis alij spatia intercostalia vocata repleant, alij verò extrinsecus extendantur, dolorificæ externorum musculorum dispositiones, vt vlcera, contusiones, abscessus, erysipelas, inflammatio, haud diffi-
Inflamma- tiones intercostalium. culter à medicis manuum adhibentibus discernuntur. At intercostalium musculorum inflammationes, eorum maximè, qui in prima parte consistunt (duo enim, vt scitis, sunt huiusmodi musculorum genera) tactu consequi non possumus atque ij grauiori, quàm externi, dolore cruciantur: ac fluxionem, quæ inflammationem induxit, ad interna, per eam quæ costas cingit, membranam transmittunt, quam tunc pariter
Pleuritis exquisita. cum ipsis inflammari necesse est. Veluti rursum vbi ipsa aliquando primario affectu infestatur, intercostalium musculorum partes internæ, similiter ei consentiunt. Verùm exquisita pleuritis fit, vbi cingens costas membrana primario affectu laborat. proinde dolor, vel ad iugulum, vel ad præcordia peruenire potest: ad iugulum quidem, superioribus eius partibus affectis: ad præcor

præcordia verò, vbi inferiores afficiuntur.

Atque vehemens quoque febris huiusmodi inflammationem perpetuò sequitur, quia sedes affecta, & parum distat à corde, & cum panniculo ipsum inuolvente, ac septo transuerso cognitionem habet. Caterùm

afficiaturne magis cingens membrana, an muscoli ipsam contingentes, à pulsibus indicium petere oportet. Nanque muscoli mi-

10 nùs, cingens verò membrana magis & tendit, & indurat arteriam. Vt in peripneumo-

nia nulla penitus apparet huiusmodi durities. At effusa in spatium thoracis sanies in

asperas pulmonis arterias transsumitur, deinde tussiendo excreatur, qualis sit, qui inflammationem fecit, humor, declarans, an videlicet biliosus, aut melancholicus, aut pituitosus, aut cruentus. Etenim si bilis abundat, pallidum, aut flauum: Si atra bilis, ni-

20 grum: Si pituita, spumosum & candicans: Si sanguis, rubrum sputum reiicitur. Quòd verò tussiendo ex thoracis spatio aliquid interdum expuatur, facile intelliget iis, qui eas dispositiones considerauerit, quibus ab exterioribus ab intima pectoris vlcus penetrare contingit, siue id ob vulnus non con-

glutinatum eueniat, siue ob magnum abcessum vtrinque eruptum, vel perinde ductum ac si externas duntaxat partes affice-

Cur febris vehemens pleuritide sequatur.

Peripneumonia.

Thoracis excrementa spuèdo reiecta, humorem colore qualis sit indicant.

Sphacelos in costa. ret, facta deinde sectione, inueniatur cingens costas membrana erosa, aut costa ob sphacelum (id est cariem) excisa, aut eò quòd medici cingentem membranam, utpote erosam, putrescentemque, seruare illam non potuerunt. In omnibus iam propositis dispositionibus, si aqua multa in thoracis spatium infundatur, mox tussiendo expuitur, laborans ipse aquam multam esse, ex sapore apprehendit. Quo pacto autem hoc fieri 10 possit, atque per quos meatus ipsa in asperam arteriam ingrediatur, perpendere debet is, qui errorem illum in quem multi in causæ inuestigatione inciderunt, effugere voluerit: ij namque ex thoracis spatio in pulmonem quippiã recipi, impossibile esse iam sibi persuaferunt, fortasse ita se sentire simulant, ne videantur de re quapiam dubitare.

Transsumptio ex thorace in asperam arteriam. Cæterum credere oportet huiusmodi fieri transsumptionem: quippe per vulnera haud 20 obscure apparet. Deinde quo pacto ea fieri possit, inuestigaret ut quum inuenerimus, animo simus quietiori. Sed inter querendum, quandiu nihil nos inuenisse putauerimus, ruditatem potius nostram accusare, quam veritatem ipsam negare debemus. Atque videmus etiam conglutinatis cruētis vulneribus, in sputo, notas quasdam fluentis ex vulnere cruoris, ad spatiũ quod inter pulmo

pulmonem est & thoracem. Præterea suppu-
 rati, in hoc ipso spatio pus cōtinere, & ipsum
 expuere haud obscurè videntur. Atque ra-
 tionì consentaneum est, vt eodem modo tū
 cruor, tum pus ex thorace expuatur: Quo-
 rum viam inquirens Erasistratus incredibi- *Erasistra-
 tus.*
 lia quædam scripsit in eo libro, cui titulus
 de Sanguinis educatione est, sub hac verbo-
 rum serie: Via autem per quam incedunt, ea
 10 quæ ab iis sedibus reiiciuntur, huiusmodi
 „ est: Ab ea arteria quæ spinæ adiacet, vasa
 „ quædam ad vtrunque latus, tam dextrum,
 „ quàm sinistrum, similiter procedunt. dein-
 „ de in loca vicina, multiplici diuisione di-
 „ sperfa, tandem adeò euadunt exigua, vt sen-
 „ sum lateant. Quum itaque sanguis in huius
 „ modi arterias inciderit, nonnunquam per
 „ concauam arteriam, ad loca quæ circa pul-
 „ monem sunt, atq; adeos nexus per quos pul-
 20 mo apud spinam arteriæ coniungitur, ascen-
 „ dit. quippe ea quæ huc inciderint, hac via ad
 pulmonem adscendere solent. Verùm quo-
 modo ex pulmone deinde reiiciantur, antea
 dictum est. In his verbis manifestè declara-
 uit Erasistratus, eas arterias quæ à magna ar-
 teria ad singula intercostalia loca proce-
 dunt, per ora quæ ad inflammata partem
 perueniunt, sanguinem suscipere, ipsumque
 ad magnam arteriam, quæ à corde orta, per

R s

spinam extenditur, referre, atque ab ipsa
rursus, ad ea loca quæ circa pulmonem
sunt transitum fieri. Sed neque modum,
quo huiusmodi transitus fiat, neque viam
explicauit. Verùm deinceps scripsit, Atque
per eos nexus, per quos pulmo arteriæ cir-
ca spinam adhæret: fit enim (inquit) hac
quoque via, eorum quæ inciderunt in pul-
monem, ascensus. At quomodo, & per quæ
conceptacula id fieri possit, non ostendit. 15
Proinde manet adhuc eadem quæstio, nihil
planè ad ipsam dissoluendam afferente Era-
sistrato. quamuis vt in cæteris libris omni-
bus, ita in hoc ipso, de sanguinis educ-
tione, perspicuam pollicitus fuerit interpreta-
tionem. Quocirca multò magis vitiosum
quispiam huiusmodi sermonem reputaue-
rit, vtpotè qui ipsi quoque Erasistrato fue-
rit suspectus. apparet itaq; ex industria cum
voluisse obscuris vti sermonibus, vt aliquid 20
dixisse videretur, quum nihil diceret. Atque
hoc in loco, quæstionis enarrationem dere-
liquit. Nam quomodo sanguis ex lateribus
quidem ad magnam arteriam perueniat, ma-
nifestè declarat. At quomodo rursus ab hac,
ad eas sedes, quæ circa pulmonem sunt, vt
ipse dicebat, ascendat, haudquaquam expo-
suit. Constat etiam ex eo quòd dixit, Lo-
ca quæ circa pulmonem sunt, quum dicere "
pulmo

pulmonem potuisset, eum haud inuitum
sermonis obscuritatem affectasse, id quod
„ postea declarauit, dicens: Ex pulmone au-
„ tem quomodo ad educationem ascēdat, iam
„ antea dictum est. Perinde enim, ac si in pul-
monem, ex magna arteria sanguis iam dela-
tus sit, quomodo inde reiiciatur, velle nos
admonere, videtur. Quod verò de expui-
10 tionem quæ ex pulmone fit, iam antea dictum
sit, non ignoramus, ac perspicuam fuisse nar-
rationem testificamur. Verum optaremus
vt de ea, quæ ex magna arteria in pulmo-
nem fit, transumptione dixisset. Quemad-
modum cum inquit, per eos quoque nexus,
per quos pulmo arteriæ apud spinam coniū-
gitur, fieri circa pulmonem sanguinis reie-
ctionem. Ne hic quidem, quos nexus dicat,
declarauit. Etenim si vel ex membranis,
vel fibris consistant, ad sanguinis in magna
20 arteria contenti, in pulmones delationem
nihil conferunt. quippe necesse est ex arte-
ria oriri vasa quædam, per quæ sanguis in
pulmonem transferatur, quemadmodum *Vasa ex*
magna ar
Erasistrati secta hoc ipsum per arteriam pul- *teria, per*
moni substratam fieri autumat. Huius enim *quæ san-*
arteriæ, extremæ partes, & quidem exi- *guis in pul*
guæ, ad asperam arteriam transire videntur. *monē trās*
Atqui ipsa quoque ex magna arteria, antea *fertur.*
quàm ad spinam perueniat, initium sumit,

Ita

Itaque duplici quadam ratione, Erasistrato
ab hac arteria auxilium suppeditare conan-
tur, sectæ ipsius professores. In præsentia qui-
dem ad sanguinis ex thorace educationē, ali-
bi verò ad inflammationis in pulmone ge-
nerationem. Nā & hāc obiiciunt eis, qui ali-
ter sentiunt, vtpote quam ita, vt Erasistratus
docuit, fieri sit impossibile. Nanq; vbi do-
cet quomodo fiat inflammatio, putat inci-
dentem in arterias sanguinem, spiritui, qui à
corde defertur, obuium fieri, atq; sic ad extre-
mas arteriarum partes repelli. Nisi vbi vulne-
rata aliquando quædam arteria, vacuato ex
ipsis per vulnus spiritu, ex ea quæ ad vacua-
tum spiritum fit sequela, sanguinem susci-
piunt. Hac itaque ratione non posse fieri
inflammationem in pulmonis arteriis di-
cunt: quippe si aliquando sanguis in eas inci-
derit, nulli ipsum spiritui obuiare, quòd in
solas pulmonis arterias, nullum à corde fer-
ri spiritum. Erasistratus contendat, quamuis
reliquas arterias omnes à corde spiritum su-
scipere fateatur. Verùm è contrariò, ipsas
cordi spiritum suppeditare, quem per inspi-
rationem ab asperis leues arteriæ suscipiant.
Hanc igitur arteriam, quæ à maiori arteria
spinæ incumbenti, in pulmonem fertur, in-
flammationem in extremis partibus susti-
nere, atque vt sanguis ex thorace reiciatur,
effi

efficere dicunt Erasistrati sectatores. Sed inflammationis rationem hoc in loco tractare non proposuimus. Cæterum quòd ex magna arteria, in pulmonem sanguinis transumptionem fieri Erasistrati sectatores dicunt, à veritate deuiare videtur. In primis enim sanguinem ex intercostalibus locis, in magnam arteriam transferri impossibile est, quippe à spiritu, qui à corde per magnam arteriam ad hæc loca transmittitur, repulsus, illicò reuertetur. Si concesserimus autem hoc ita fieri, ac demus in magnam ipsum arteriam deferri, multò absurdior ex Erasistraticæ sectæ fundamentis sermo euadet. Etenim spiritum, saluantem incursionis impetum, à corde in hanc arteriam expressum, in totum deferri corpus, per ortas ab ipso arterias autumat, perinde ac si ex vna arteriæ constrictione spiritus ad extremas pedum partes peruenire possit, veluti à vehementissimo vento, delationis celeritatem fieri putans. Quòd verò tanta vehementia, sanguinem in magna arteria cõtentum, ad quamlibet corporis partem non impellat, impossibile est. Neque vlla ratione dici potest, ipsum in vnam arteriam quæ in pulmonem feratur compelli: ita enim is impetus mentis sit particeps, atque intelligat, qua via quàm facillimè vacuari possit. Id ipsum verò rursus,

Aduersus Erasistratios, de transsumptione sanguinis ex magna arteria in pulmonē.

sus pugnare videtur cum præsenti sermone, qui sanguinem quàm celerrimè vacuari per asperam arteriam concedit. Nam si tam facilis est per extremas harum arteriarum partes transitus, ut incidens in eas sanguis, tam celeriter vacuetur, fieri non potest ut impactus, inflammationem excitet: eo quòd impingi, & excidere, inter se sint contraria. Id verò multo maiori admiratione dignum est, quòd quum Erasistratus quàm diligen-

*De puris
vacuatione
in pleu-
riticis &
suppuratis,
aduersus
Erasistratum.*

tissimè deinceps de puris vacuatione conscribat, siue id in pleuriticis, siue in suppuratis contineatur, ipse pugnam hanc, qua videlicet sermones eius, tum nobis, tum reliquis hominibus omnibus inter se certare videntur, non intellexerit, ea facilè deprehendetur, si sermonem eius, qui ad verbum sic se habet, hìc subscripserimus: Atque in his ipsis affectibus, plurimi interdum puris excretio fit: causa, venarum natura est, quam sic pendere oportet: Magna quædam vena ex corde nascitur, adiacens spinæ, ac in eo loco, ubi à vertebra septum transuersum nascitur, finem accipit. Ab hoc verò, venæ quæ ad latera extensæ sunt, atque arteriis adiacent, oriri videntur. Igitur quum vel vlcus, vel abscessus, in his locis euenit, multum puris congregans, id quidem haud facilè, ad spatium quod inter latera & pulmonem est, effun-

„ effundi potest. quòd succingens latera mem *Membrana*
 „ brana, neruosa est, & fortis, ac diuidi contu- *na costas*
 „ max: proinde coërcetur ad vasa, membranæ *succingēs.*
 „ intrinsecus subiecta. Quum itaque tenuis
 „ magis, ac imbecillior vena sit quàm arteria,
 „ hæc vasa prius diuiduntur quàm ipsæ arteriæ
 „ atque per has diuisiones, pus effunditur in
 „ venas: per inferiores verò sedes, pus deici
 „ non potest, quia ad eas venarum natura non
 10 „ peruenit, sed finem sortiūtur, vt dictum est,
 „ circa septi transuersi ortum. Quum semper
 „ autem continuæ sedes repleantur, vt per su-
 „ periores meatus exitum capiat necesse est.
 „ Perpendenda igitur est actio, quam pulmo
 „ inter respirandum efficit, ac quomodo, tum
 „ spiritum tum humores, & attrahit, & expel-
 „ lit, quippe eodem modo pus à lateribus ad
 „ pulmonem ascendere solet. Sed quomodo
 20 „ demùm à pulmone reiiciatur antea dictum
 „ est. In hoc sermone quòd pus in venas transfusum
 „ sumptum, non possit ad loca septo trans-
 „ uerso inferiora peruenire, rectè ab Erasistrato dictum est, vtpotè venâ, quæ o- *Vena ad*
 „ cto inferioribus thoracis costis alimentum *costas de-*
 „ præbet (non enim omnes alere potest) ad *lata.*
 „ septum transuersum perueniente: neq; enim
 „ in præsentia contendere velim, an exigua
 „ aliqua eius particula inde exiliat. At quo-
 „ modo huiusmodi pus expuatur, neutiquàm
 „ dicere

Nullus
venæ ra-
mus à cō-
causa in
pulmonē.

dicere aggressus est: similiter nec sectatorū
eius quisquā. Neq; enim quemadmodū
arteria quandam à magna deductam in pul-
monem ferri affirmant, ita de vena dixerint,
etenim arteria, tametsi non manifestè in vi-
scus ipsum ramis distribuitur, ei tamen sub-
sterni, atque ad asperam vsque arteriam ra-
musculos emittere videtur. Verū à magna
vena, quæ spinæ incumbit, venam aliquam
in pulmonē transire, neq; nos vnquā vi- 10
dimus, neque dissectorum quisquā scripsit:
ac ne Erasistratus quidem id affirmare ausus
est. Quippe inter omnes conuenit, quòd à
dextro cordis ventriculo, per vnum dunta-
xat vas, pulmo sanguinem recipit. Oportet
igitur pus quod à costis, in eam venam, quæ
spinæ adiacet, in primis quidem peruenire
ad cor, deinde ad venam quæ ab hoc orta,
in pulmonem transit: postea ex hac in aspe-
ras arterias, quæ per ipsum dispersæ sunt, trā 20
sumi: postremò tussi indigere, quæ scilicet
ipsum vsque ad os efferre posset. Quo au-
tem pacto puris sanguini permixti, ab ipso
fiat secretio, tanquā exiguum quippiam,
ac vulgare, & quod ad vniuersam ipsius ra-
tionem firmandam parum conducat, præ-
teriens dicere neglexit. Neq; defendi etiam
potest, q̄ sanguis in vena, quæ circa spinam
est, contentus ad cor ipsum referatur. Nam
è con

è contrariò, vena hæc à dextra cordis auri- Vena à
cula exorta, sanguinem secum defert, qui dextra
omnibus thoracis partibus, quæ circa octo cordis au-
costas cōsistunt, alimentū præbeat. Etenim rricula
superiores quatuor, non ab iis, sed à vena ad ad costas
iugulum ascendente, quæ à medio loco in- nutrien-
ter cor & iugulum exoritur nutrimentum das.

- suscipiunt. Prætereà & hoc quoque non mi-
nus absurdum, ad Erasistrati verba sequitur.
- 10 Nam pus quod à supernis quatuor thoracis
costis, in concavam venam refertur, maxi-
mè quidem ad eas venas ducetur, quæ ad cer-
uicem, & scapulas, & caput, & manus, imò
potius ad vniuersas animalis partes, perue-
niunt. Hæc sunt ferè absurda quæ ad Eras-
istrati scripta sequi videntur. Accedit ad hæc,
quòd causam in hac perpensione penitus
non attigit: dicens enim, non facilè pus ef-
funditur in spacium, quod inter costas est &
20 pulmonem, quia succingēs costas membra-
na, neruosa sit, & fortis, atque diuidi contu-
max, pus aliquando in hoc spacium effundi
posse, non negauit: quippe qui verbis suis,
non facilè addiderit. Debuit ergo dicere, id
quanquàm non facilè, tamen aliquādo fie-
ri, deinde viam ostendere, qua suppurati,
pus expuere possint. Vt enim ex iis nō pau-
cos perire, ita & alios complures seruari vi-
dimus. Quorum si quis per singulos dies,

reiectionis puris quantitate collegerit, interdum sex, aut octo heminas, interdum decem, atque interdum plures, totam summam æquare inueniet. Cæterum id quod quæ creberri-
 me dicere consueui, nunc quoque dicam, quod multi Medici, rerum quæ manifestè videntur causam reddere nequeunt, eas esse omnino negant. Quanquam (ut dixi) omnes quot
Vulnerati quot in thorace vulnerati sunt; iniectionem per
in thora- vulnus aquam mulsam, illico expuere solent. 19
ce. Nonnulli etiam medendi modo, & qui cruen-
 tis adhibetur, & glutinatorio dicto haud paucis perforationibus curati, in primis qui-
 dem diebus purulenta quædam expuunt, nisi rectè, ac exquisitè, vniuersus sanguis per
 vulnus (quatiendo videlicet hominem, qui sic vulneratus est) fuerit effusus. At verò
Membra- membrana costas succingens, & valida est, &
costas suc- neruosa, ac diuidi cõtumax. Sin autem vo- 20
cingens. les, adde sermoni etiam membranam pulmo-
 nem ambientem, eandem cum illa naturam habentem: eo quod; liquores in vacua thoracis infusos hæc quidem non transmittit, illa non transsumit. Itaque ad eundem modum dices cutem membranæ esse multò fortiorè, atque crassiorè in fracturis ossium callo obducendis sanguineum humorem, quo minùs per ipsum penetrando egrediatur, prohibere possit: hunc tamen in nonnullis vide-
 mus

mus adeò copiosè effundi, vt tota etiam ligamenta possit irrigare. Quod quum ita fieri videamus, idem haud absurdè per tenues quoque membranas fieri fatendum est. Atq; satius fuisset Erasistratum non de hac re dubitare, sed id potius abundanter intelligere, quomodo humor inter thoracè & pulmonem contentus, in asperas pulmonis arterias recipiatur, ad leues verò arterias, atque ad
 10 venas, peruenire non possit. Nam & ipso Erasistrato auctore, tria hæc vasa simul ex- *Vasa ad*
 tenduntur, atque simul diuisa, terminantur *pulmonē*
 suo extremo quodlibet ore, in adiacentem *pertinere*
 pulmoni membranam. Cum ergo tria hæc *tia.*
 ora inter se proxima sint, cur in vnum duntaxat fiat transsumptio, quærere debuit Erasistratus. Nam longè præstantius erat, ea quæ fiunt, quomodo fiant quærere, quàm quòd fiant negare. Quanquam neq; dubia
 20 neque inuentu difficilis mihi videtur, eorum quæ in thorace continentur, in pulmonem receptio, quæ quidē in asperæ arteriæ partibus extremis fieri potest, quippe quæ non adeò angustæ sunt, vt læuiū arteriarum atque venarum partes extremae. Atque quòd magna ex parte asperarum arteriarum essentia, cartilago est, quæ concidere, atque concludi omnifariā non potest: quòd etiam earum, quàm duorū vasorū reliquorum, ora,

Diuisio- multò sunt ampliora. Cùm igitur ipsorum
nes vaso- circa pulmonem diuisiones numero sint
rum circa æquales: rationi consentaneum est, asperæ
pulmonē. arteriæ veluti ramos, reliquorum duorum
 generũ partes, proportionè superare. Id ve-
 rò manifestè apparet per visceris ipsius dis-
 sectionem, nam vicina quæque vasa eandẽ
 inter se seruant in magnitudinis excessu pro-
 portionem, quam ab initio maximè eorum
 partes habere conspiciuntur. Hæc sunt quæ ¹⁰
 dicere debuit Erasistratus. ac deinceps, utrũ
 inspirationis, an expirationis, an quietis tem-
 pore, pus ex thoracis spacio in pulmonem
 recipiatur, explicare: ac deinde quum id,
 neque per inspirationem, neque per quie-
 tem fieri docuisset, ostendere ipsum expira-
 tionis tempore recipi: id quod facillimum
 erat demonstrare, ei cui prius persuasum es-
 set, respirationis actionem ad thoracem
 pertinere, pulmone nullam propriam ha- ²⁰
 bente motionem: quippe qui per consequen-
 tiam dilatato thorace, pariter attollitur: eo
 verò constricto, ipse, spongiarum exemplo,
 quas manibus exprimimus, in sese residere
 solet. Etenim hoc pacto per magna vulnera
 fibra ipsius per vulnus procidere videtur: ve-
 rùm citra vulnus, thorax vehementer con-
 strictus, humorem qui in eo spacio, quod
 inter ipsum & pulmonem est, continetur, in
 aspe

asperas ipsius arterias comprimendo cogit. Nec credas velim, huic orationi, vehementer, frustrà fuisse insertum. Nisi enim vehementer admodum, thorax pulmonem ex omni parte comprimat, humor in asperarum arteriarum ora recipi non poterit. Quam obrem natura, quo robustior fieret expressio, tussi vocata, donauit animalia. Quæ cum naturale sit accidens, & sternu-
 10 tamentum, & singultum, & nauseam, similitudine quadam imitatur, de quibus in libro de Causis accidentium satis dictum est. Verum quia viribus opus est, quibus huiusmodi accidens naturale excitetur, contingit creberrimè per suppuratos affectus, mori laborantes, prostratis antea viribus, quod à validissima thoracis constrictione, eademq; celerrima, tussis excitatur. Atq; vires imbecillæ, neque validè neq; celeriter age-
 20 re possunt. Ergo de expuitione quæ ex ipacio thoracis procedit, satis fuerit hæc dixisse, redeamus igitur rursus ad eum quem *Vnde fiat* ab initio proposuimus sermonem. Sanè quæ *pleuritis*, in succingente costas membrana, ac muscu- *aut late-*lis illi cōtinuis, sunt inflammationes, mor- *ralis mor-*bum quem lateralem vocāt, efficere solent. *bus.* Huiusmodi accidentia inseparabilia sunt: febris ac- *Acciden-*ta, dolor, perinde ac si locus vel intendatur, *tia pleu-*vel pungatur: spiratio frequens, & exigua: *ritidis.*

Incocta pleuritis. *Dolor lateralis similis pleuritidi.* pulsus parvus, arteriam & duram & quodam modo tensam indicans: tussis magna ex parte cum sputis coloratis, nonnunquam verò sine his. Has incoctas pleuritides nominat, quæ vel celeriter hominem rapiunt, vel longo temporis spacio finiuntur. Ac dolor, modò ad iugulū, modò ad præcordia pervenire videtur. Sunt præterea alii laterum cum febre dolores, per quos spirationem exiguam reddi necesse est, sed nullum redditur sputum, ut in ea re nihil à pleuritide sine sputo constante, differre videatur. Verum hi faciliè ab illis discerni possunt. In his enim nulla omnino tussis est: illi verò qui sine sputo pleuritide laborant, sicca tussi molestantur: deinde quod neque tensionem, neque duritiem ullam, refert pulsus: postremo quòd non æquè acuta febre laborant, neque adeò difficulter spirant. Sunt etiam nonnulli, qui pressio extrinsecus inflammato loco dolere sese fatentur. Atque ij per sputum non purgantur, quia ab initio nihil eius succi qui inflammationem excitavit, ad thoracis spacium pervenire solet. At concocta inflammatione, nisi pus prius discutiat, ad cutem usque attollitur, atque inciditur.

De septi transversa affectibus.

CAP. III.

Ter

TErminum quo thoracis pars inferior Phrenæ finitur, antiqui phrenas (id est *terminus* mentem) appellauerunt: siue simpliciter de ipsis quo pars in animum venerit, siue (vt aliqui putant) thoracis quia eo inflammatione affecto, mens quo inferior que lædatur. A Platone autem diaphragma finitur. vocari incepit: qui sanè & ipse aliis veteribus similiter, phrenas appellauit. Putat *ma.* autem hūc in animalibus vsum habere diaphragma, vt irascibilem animæ vim in corde contentam abs appetitoria, quæ in iecore sedem habet, septo distinguat. Postea *tonis sententia.* Medici neglecto prisco nomine, diaphragma ipsum appellare consueuerunt. Id quod in dorsali quoque medulla eos fecisse constat. quippe huic quoque ob propriæ substantiæ nomen medulla est, quemadmodum instrumentum cuius nunc mentionem fecimus phrenes nuncupantur. Verū quo clarior esset dignotio, illi dorsalis, quemadmodum & cernicalis, & spinalis, atque lumbaris, cognomenta addiderunt. Postea ferè omnes simpliciter dorsalem appellare consueuerunt. Sic in præsentī quoque proposito, phrenum nomine reiecto, *Septum* diaphragma (id est septum transuersum) *transuersum.* nominare magis placuit. Aristoteles autem hanc animalis particulam, succincturam appellat, nescius ipsam magnæ ac per- *Etura.*

quàm necessariae actioni, in animalibus esse deputatam, quippe quæ spirationis sit instrumentum. Igitur non immerito cum afficitur, spirationem lædit, ut supra cum despirandi difficultate ageremus, diximus: ubi proprios eius affectus unà cum his qui per consensum cum spina & nervis ab ea exortis in ipso fiunt tradidimus. At verò nunc eos affectus, qui superno consentient principio, ei adveniunt, perstringamus. Igitur antea 10

Delirium. quàm aliquid deliret, frequentem ac exiguum: infestante verò iam delirio, multa varietate inæqualem, spiritum reddit: ut in libris de Spirandi difficultate iam dictum est. Atque delirare etiam solent nonnulli, ob vitium quod in ore ventriculi consistit, & febribus ardentibus, & pleuritide, & peripneumonia. Sed quæ ob septi transversæ affectum accidunt deliria, non multum distant à phrenitide. quippe per cæterarum 20 partium affectus, atque per febres ardentes delirium mitigari solet, quoties morbus de-

Phrenitis delirij nota. clinare videtur. At phrenitidis propria, præcipuaque nota est, ne in declinatione quidem febrium, delirium quiescere. Neque enim per consensum duntaxat, sed huiusmodi morbo cerebrum afficitur, sed propria primariaque affectione laborat, atque proinde paulatim accidere, quiescere verò ne-
que

que subitò neque affatim solet, vt in his par-
 tibus quarum nuper mentionem fecimus, ac
 antea quàm inualeſcat, præcedunt ipsum ac-
 cidentia non pauca. Eaquæ omnia phreniti-
 ca indicia vocantur, quæ ab ijs quoque, qui Phreniti-
 me præceſſerunt, cõscripta ſunt. Nam inter- ca indi-
 dum vigilias præcedere, ſiue etiam ſomnum cia, per
 manifestis imaginibus turbatum, vt & cla- cerebri af-
 10 ment nonnulli, & exiliãt, videre eſt. Interdũ ſectum.
 verò irrationalis accedit obliuio, vt laborã Irratio-
 tes aliqui quùm matellam petuiſſent, meie- nalis o-
 re tamen neglexerint. Aut quùm lotiũ emit bliuio.
 terent, matellam ipſam prodere haudqua-
 quàm meminerint. Interdum maiori cū tu-
 multu, aut temeritate respondent, præſertim
 vbi aliquis antea fuerit manſuetus. Atque ij
 omnes exiguo vtuntur potu. Spiratio ipſis
 rara eſt & magna, pulſus minores, magiſque
 20 neruoſos habent. Nonnunquam occiput do-
 lor infeſtat. Quum verò iam proximè ad
 phrenitidem accedunt, oculi eius vehemen-
 ter euadunt ſqualidi, aut ex altero ipſorum
 acris lachryma effunditur, ac deinde lippitu-
 do innatat, & venæ ipſorũ ſanguine plenæ
 videntur, & ſanguis ſtillat è naribus. Quo
 tempore nihil quod exactè ad prudentiam
 pertineat, respondent, & floccos auellunt, &
 feſtucas carpunt, atque aridiore feбри, cui
 non ita magnæ in alterutram partem muta-

tiones accedunt, torquentur, quemadmodum in aliis quibusdam febribus videre est, quæ per vigorem quidem gravissimè instant, inclinationes verò habent mitiores. Ad hæc lingua quoque salebrosa est, nonnulli interdum audiendo falli videntur, ac interdum mæsti iacent, vix quicquam respondentes, atque dispositione dolorifica affecti, vel acius premente aliquo, eam haudquaquam sentiunt. Ergo hoc modo per cerebri affectum, paulatim phrenitis euenire solet. Ab

Deliriū à septo transuerso.

aliarum verò partium nulla perpetuum delirium procedit, dempto solo septo transuerso, cuius vitio excitatū delirium, parum à continuo distat, adeò vt veteres putauerint, hac parte inflammatione affecta, homines phreniticos euadere. atque ob eandem suspicionem, phrenas (id est mentem) eam appellauerunt, tanquam sapienti parti conferat quippiam. Verum, delirium quod huiusmodi vitio accidit, à phrenitide distinguitur, & ex oculorum accidentibus, & sanguinis à naribus stillis, atque spirationis specie. quippe phreniticorum spiratio magna est, & ex longis semper interuallis. Contrà, vbi à septo delirium oritur, inæqualis, vt modò exigua sit atque frequēs, modò magna & angustiosa. Nam incipiente septi transuersi inflammatione, priusquam delirerent

Mentem quare phrenas appellauerint antiqui.

rent laborantes exiguum ac frequentē reddunt spiritum: contrā, iis qui ob affectum cerebrum delirant, magna prodit raraq; spiratio. Atque, vt summatim dicam, veluti eorum accidentium, quæ phrenitidem antecedere diximus, aut nullum apparet, aut si apparuerit aliquod, id perexiguum est, in his quibus septum transversum inflammatione laborare incipit: ita rursus sursum reuelli hypochondrion septi transversi, illicò ab initio affecti, proprium indicium est, id quod affecto cerebro posterius accidit, nō incipiente videlicet affectu, sed quum factus iam fuerit. Atque calor quoque circa caput & faciem vehementior est iis, qui ob cerebri vitium delirant. Reliqui septi transversi affectus, siue primarij sint, siue per cōsensum illi eueniant, partim quidem ab hoc nostro proposito sunt alieni (nempe qui manifestè apparent: vt sunt tūm alia accidentia, tūm abscessus in ipso exorti) partim verò iam antea dicti sunt.

De gula affectibus. CAP. IIII.

EAm partem quæ inter fauces & os ventriculi media est, quam veteres œsophagion nominabant, qui post Aristotelis seculum scripserunt, stomachon, nos Gulgulam dicimus, appellare consueuerunt. Quāuis Aristoteles prisco semper vocabulo hanc

hanc animalis particulam nominauerit. Eius
Oesopha- duplex est vsus: vnus quòd veluti via est eo-
gi vsus rum quæ deuoratur: alter quòd circa vtran-
duplex. que viam actionem quandam efficere vide-
 tur, tùm deuorando ea quæ ab ore ad ven-
 triculum deferuntur, tùm reiiciendo ea quæ
 ab hoc ad os eleuantur. cum enim geminae
Tunica sint ei partes (quas dissectores tunicas appel-
æsopha- lant) altera ad cibi potusq; deglutitionē vti-
gi. tur: altera ad eam, quæ vomendo fit, expul- 10
 sionem. Proinde rationi consentaneum est,
Affectus duo esse affectuum ipsius genera: vnum vt
æsopha- viæ eorum quæ ingeruntur, alterum vt in-
gi. strumenti eorum tùm quæ euomuntur, tùm
 quæ deuoratur. Constat verò, duorum iam
 memoratorū vsuum, alterum quidem sem-
 per esse necessarium, alterum verò propter
 occasiones quasdam. Igitur eorum acciden-
 tium quæ ipsum, tanquàm viam infestant,
 genus vnum est, quùm ob tumore aliquem 20
 præter naturam angustior fit ipsius meatus.
 Alterum quùm proprias actiones perficere
 nequit. Porro iam antea, vbi de angina quæ
 ad vertebrarū in ceruice luxationem sequi-
 tur, sermo habebatur, diximus quòd acqui-
 sititia ei angustia accidit, vbi à vertebra
 ipsis cōprimitur, cuius rei nūc quoq; admo-
 nitū te esse velim. Nec obliuioni tradas tu-
 mores eorum musculorū qui gulam ipsam
 inuol

inuoluunt, quomocunque fiant: nam de omnibus in libro de Tumoribus præter naturam dictum iam est. Cæterum in iis omnibus commune est, quòd tanta sæpenumerò inter deuorandũ infestat angustia, vt potus ad nares remittatur. Quum verò inflamm- *Gula in-*
 tione affecta gula, familiari propriaq; ang- *flamma-*
 stia, non à vicinis partibus acquisita, torque- *tio.*
 tur: tũm grauissimus inter deglutiendũ do-
 10 lor infestat, accedente quoque perquàm dif-
 ficili transitu: præsertim si supinus, qui labo-
 rat, iacens transglutire quippiam conetur:
 quocirca sic affecti habitum transformare,
 atque erigere sese student, ex accidente ipso
 edocti, faciliorem ita fieri deglutitionem,
 adeò vt haud parũ habitus hic, ad ciborum
 in decliues partes delationem, conferre vi-
 deatur, vtpote quæ possit sæpenumerò vel
 sola fieri, si prius ex ore vsque ad gulæ initiũ
 20 facta fuerit expressio. At supino decubitu
 nullum speratur auxiliũ, quo facilius ad in-
 fernas partes ferantur alimenta, quippe quòd
 tum à sola gulæ actione deuorandi munus
 perfici potest. Neq; verò latet vos, quòd par-
 tium inflàmatione affectarũ nulla non do-
 let, † quũ suo munere fungitur. Contrà vbi † κατὰ
 quieuerit, dolor mitigari solet. Ergo quum μὴ τὰς
 gula sentiendi facultate sit prædita, eo ipso ἰνεργίας.
 quoq; vti licebit quasi auctario partis vnde
 passiones

Interrogandus egrotus de suo affectu. passiones eius dinoscantur: Id quod à laborante, inter respondendum deprehendere licet, nisi adeò fuerit saxeus, ut quid ipsum lædat, narrare nō possit. Quod si eiusmodi est: qui possit animi sensa interpretari, gulæ sensus maximū præstabit corollarium, ad affectuum ipsius dinotionē. Etenim imbecillitatem nonnunquam percipere se dicunt laborantes, ut longo vix temporis spacio per gulam transeant, ea quæ ingesta sunt: quæ aliquando ad primum impetum facile descendunt, deinde rursus arcentur, ut videantur impacta, demùm per residuum spacium facile labuntur. Horum primum actionis infirmitatem, alterum particulæ cuiuspiam angustiam indicat. Verùm utriusque differentias, ex reliquis accidentibus intelligere licet.

Gulæ imbecillitas. Nam in imbecillitate quæ à sola intemperie, citra tumorem præter naturam fit, ingestorum in transitu tarditas æqualis est, & sine dolore, & in supino decubitu augetur: erecta vero ceruice mitigatur, neq; ullus accedit angustiae sensus. Vbi verò cum tumore est imbecillitas, vnam quāpiam particulam angustiores cæteris efficit, atque per eam tardior erit transitus. Quod si tumor inflammationis fuerit particeps aut erysipelatis, accedit ei pariter & dolor, & fitis, & multi caloris sensus, & febris non admodum ardens, quæ

quæ etiam siti proportionē haudquaquā
respondet. Si verò tumor aliquis ex non ita
calidis fuerit: tūc citra febrim, & calorem,
& sitim, deglutitionis inæqualitas eueniet;
retentis in parte quapiam alimentis, præfer-
tim si maiusculum, atque solidum fuerit id
quod deuoratur: acceditq; dolor aliquis sed
exiguus. Ergo quum aliquando huiusce-

*Abscessus
in gula.*

20 bis apparuissent, accedente nonnunquā
ephemera febre, nonnunquā etiam horro-
re, coniecturam faceremus abscessum con-
coctu difficilem esse in gula: accidit proce-
dente tempore, vt laborans ruptionis sen-
sum perciperet, ac subinde pus euomeret:
idq; non solum eodem, sed postero quo-
que die; atque itidem tertio, deinde succede-

*Vlcerata
gula in-
dicia.*

20 siue acerba deuoraret, aut vellicationē, aut
constrictionem sentiebat: dolebatq; hac in
parte, vel nihil deglutiēdo, sed moderatius.
Vehementiorem verò dolorem excitabant
ea, quibus mordendi, aut constringendi vis
erat. Hic ergo longo temporis spacio vix
seruatus est, fetus scilicet ætatis benefi-
cio etenim nati maiores, ferè omnes perie-
runt. Sanè quotquot dolorificum quem-
piam in gula habet affectū, omnes ex dorfi

*Dorfi do-
lor gula
affectum*

quod

quoque dolore ipsum significanter declarant. cuius rei causa haud obscura est, iis qui gulam spinæ incumbentem viderunt. Quin etiam constat, quod ex gulæ vasis, haud secus quàm ex reliquis omnibus sanguis vomendo reijci potest. Id si ob ruptum vas acciderit, dolor ibi percipitur: ac locū, vbi aliquid ruptum est, indicat. Haud secus vbi venæ aut rupta acciderit, siue diabrofin, siue anabrofin, siue aliter quomodolibet nominare volueris, locus affectus deprehēdi potest. Aperto autem vasis alicuius ore, nullus omninō dolor sentitur. atque hac re à reliquis distinguitur, ac præterea quòd neque ictus, neque casus hanc profusionem præcessit, id quod rupto vase videre est. Quanquam ob solam sanguinis plenitudinē, nulla adueniente extrinsecus causa, vasa interdum dirumpi possunt. At venæ erosionem, vlcus præcedere solet. Fit autē vlcus, vel rupto vase, vel viciolorum humorum influētiā, id quod in cute quoque sæpenuerò accidere vidimus.

Vlcus in
gula.

Os vetriculi.

De oris ventriculi affectibus.

CAPVT V.

Os vetriculi cor ab antiquis nominatum.

Veteres os ventriculi cor nominabant, ab accidentibus quæ inducere videtur hanc (vt aiunt) deducentes appellationē. Neque enim vt cardiacis syncopis: ita & sto

stomachicis, nonnulli corripuntur: sed etiā *Affectus*
cōuulsionibus, sopore, morbo comitiali, & *stomachi-*
melancholia, nec non accidētibus qualia per ci.
suffusiones infestant, vt iam antea, quum
de oculis loqueremur, dictum est. Atque o-
mnes ij affectus, consentientibus ei cæteris
partibus, in ipso fieri dicuntur. Nam ad pro-
priam eius rationem pertinet, & appetētiam
prohibere, & natantes cibos corrumpere,
10 quemadmodū id haudquaquā fieri so-
let, quum sibi in ventriculi fundo firmātur,
præcipuè si suapte natura non ita facilè cor-
rumpātur. Igitur exactè animum aduertere
oportet, vt discernantur affectus, qui in ipso
per consensum eueniunt ab iis qui huiusmo-
di particulis, quarum actionibus nocere con-
suevit os ventriculi affectū (quod vt veteres
omnes cor appellabant, ita nostra tempesta-
te stomachus vocatur) primario accidere cē *stomachū*
20 sentur. Sed hæc inter se discernere facilè po-
terit is, qui assidua exercitatione circa no-
tiones versatus, ea quæ præcesserunt, diligen-
ter considerauerit. Sunt enim proprietates *stomachi*
quædam ineffabiles, sed quæ accidentibus
quæ narrari possunt, succedunt, quibus cer-
tiores stabilioresq; euadunt affectarum par-
tium notæ, sed has vnusquisque per se inue-
nire poterit. Quæ verò tanquam fundamen-
ta vniuersæ dignotionis existunt, atque ex-

T

quibus studiosissimi quique, ineffabiles accidentium proprietate ediscunt, deinceps explicare aggredior. Igitur Grammaticus quidam iuuenis, quoties vel nimis vehementer doceret, aut cogitaret, aut in ediam sustineret, aut irasceretur, comitiali morbo corripiebatur. Perpendi quidem in hoc, os ventriculi (utpote quod facile sentiret) affectum esse: & corpus vniuersum conuulsione concuti. cui probam concoctionem accuratè procurare, ac tertia vel quarta hora panem optimè præparatum exhibere iussi, atque hunc quidem solùm, si non sitiret: si verò siti cruciaretur, ex vino diluto, & quidem albo, at-

Addit Aë que modicè stringente. Nam huiusmodi vinum ut ventriculum robustum efficit, ita Vinum haudquaquam tentat caput: id quod facere album mo solent ea quæ vehementes vires optinent. Quum igitur ac victus ratione utens non ut antè afficeretur: exactam iam notitiam me habere arbitratus sum eorum quæ prius solâ coniectura consequebar. Itaque quolibet anno bis, aut etiam ter medicamentum amarum ex aloë ei exhibui: totum enim ventrem purgat, viresq; reparat: atque ita vir ille viginti annis, quibus postea superstes permansit, integra inculpataque valetudine vitam exegit. Quod si aliquando ob ingruentia nego

negotia diutius à cibo abstinere cogeretur,
 exigua quadã cõuulsione vexabatur. Iam *Conuulsio*
 alios quoq; vidimus conuulsione comitali *comitalis*
 ob oris stomachi vitiũ correptos: quum aut ob *vitium*
 non probè concoxissent, aut vini & qui *oris stoma-*
 dem ineracioris plurimũ potassent, aut vbi *chi.*
 veneri immodicè operam dedissent. Quin-
 etiam per febres quosdam conspeximus dere-
 pente conuulsione prehendi, nullo (quod eã
 10 præsagiret) præcedente indicio: qui bilioso *Biliosus*
 superueniente vomitu, protinus ab omni *vomitus*
 noxa liberati fuerunt: atque hoc modo af- *conuulsio-*
 fectorum nonnulli res quasdam fuscas vo- *nẽ solues.*
 mendo reiecerunt, alij humorem porri suc-
 co similem: quidam etiam vitiosis grauari
 cibis, soporosi permanserunt, donec ea quæ
 os ventriculi opprimebant, omnia euomuis-
 sent. Atqui horum accidentium vix vllum
 crederes à ventriculi ore procedere, quemad-
 20 modum ne syncopas quoque, nisi tam cre-
 brò ita euenire viderentur. Quãquam enim *Nervi ad*
 non pauci ad ipsum ex cerebro nervi perue- *os ventri-*
 niunt, non tamen tot esse videntur, vt per *culi perti-*
 eos tantus sit principij cum ore ventriculi *nentes con-*
 consensus, vt inde conuulsio inferri possit. *uulsionem*
 tantum abest, vt quis credat, cor ipsum tam *non infe-*
 vehementer ori ventriculi consentire, vt *runt.*
 acuta protinus sequatur syncopa. Por-
 rò multos non solùm insomnia, & somni

tumultuosi molestant, sed amentia quoque, propter vitiosum humorem in ore
Flatuosus, ventriculi aceruatum. De flatuoso verò vo-
& hypo- cato & hypochōdriaco morbo nemo non
chondria- dixit, quomodò tristitiam, desperationem,
eius mor- mœstitiam inducat: atque, vt summam
bus. dicam, ad melancholiæ accidentia nihil reli-
 qui facit. Quippe laborantes huiusmodi
 morbo, post cruditates dictis accidentibus
 multò vehementiùs infestantur: ac quidam 10
 ex ipsis splenici quoque fiunt. quocirca con-
 iiciendum est, ex hoc etiam viscere vitio-
 sam saniem in ventriculum irruere. Ergo ea
 accidentia quæ vel cerebrum, vel oculos af-
 ficiunt, vitiosorum humorum vaporatio-
 nem sequuntur. At syncopa quæ stomachi
stomachi vitio solet euenire, ob dolorum ipsius pro-
ritio eue- prietatem exolutionem inducit: eius quo-
niens. que intemperie ad cor fortasse perueniente.
Citta. Quemadmodum vbi cor vehemēter intem 20
Pice. peratum est, vires agminatim cadere necesse
Appetētia est. Atque constat etiam, quòd $\kappa\tau\eta\alpha\iota$ (id est
canina. picæ) vocatæ mulieribus accidunt, vbi hæc
Nausea. particula affecta est. Quæ enim aut canum
Cordis do- more, aut nihil omninò, aut malos cibos
lor. cupiunt, iis appetentiæ instrumentum læ-
Singul- sum esse certum est: id verò os ventriculi
tus. esse demonstratum iam est. Sic etiam nausea
 cordis dolores, singultus, inter huiusce partis
 affe

affectus numerari debent. Verùm omnium harum affectionum causas in libro de Accidentium causis, iam diximus, vt nihil nunc opus sit, in earum explicatione temporis iacturam facere. Etenim quæ per intemperantiam ei veluti simili corpori morborum differentia adueniunt, iam ibi enarratæ sunt.

Instrumentales verò morbi, qui ei accidere solent, adeò manifestas habent notas, vt latere possint neminem, qui communes significationes: quæ & in his antea commentariis, & in aliis quibusdam præscriptæ sunt, memoriâ tenuerit. Neque enim abscessus, neque inflammatio, neque erysipelas, neque vlcera huius loci in obscuro sunt, vtpote quorum communes sunt notæ cum iis quæ supra de gulæ affectionibus, dictæ sunt: atq; illis eò manifestiores, quò facilius huic parti sensus est, ac claram quoque promptamque notionem habet. Similiter vbi ex hac parte sanguis reicitur, indiciorum proprietas communis est cum illis, quæ de gula iam diximus: verùm cognitio longè manifestior euadit. Atque par esse videtur, totum ventriculi spatium simili dispositione affici, quales sunt illæ quas in ipsius ore fieri diximus, atque similia quoque ei aduenire accidentia. Quòd verò longè maiorem inferunt violentiam ea, quæ in ipsius

Instrumentales morbi oris ventriculi.

Ventriculi spatij affectus.

ore contingunt, idcirco Medici ea quæ in parte ventriculi inferiore eueniunt, perinde ac si omninò nō fierent, & despicere & contemnere solent. At quia coctionis opus in partibus ab ore inferioribus fieri nemo negat, necesse est hanc ipsam partem, quum malè disposita fuerit, cruditatum esse causam. quum videlicet vel ob inordinatā alimentorum ingestionem, aut multitudinem, aut qualitatem homo concoquere nequit. 14

Morbi verò cæteris partibus omnibus communes, siue instrumentales sint, siue per solā intemperiem infestent, quorum sedes affectæ manifestæ sunt, ad hanc præsentem commentationem propriè non pertinent. quippe eas duntaxat partes, quæ sensus iudicium *Sanguis à* effugiunt, considerare propositum est. Sed *ventricu-* de sanguine qui ex ipso vomendo reiicitur, *lo reiectus* non conuenit inter Medicos. Etenim sunt qui putent nequaquàm fieri posse, vt sanguis vel ab hepate vel à liene effluens per ipsum euacuetur: similiter de pure quoque ab ipsis erumpente existimāt. verum enim uerò per artis exercitationem vtranque opinionem examinanti mihi, visa est per ipsum fieri euacuatio ex dictis visceribus. Cæterum differre volumus huius rei doctrinam in eum locum, vbi de ipsis sermonem faciemus: quippe deinceps & iecinoris & lienis *affe* 20

affectus percurrere propositum est.

De iecinoris affectibus. CAP. VI.

Hic parti, quemadmodum & cæteris
omnibus duplex morborum genus
accidit: vnum à sola intemperie, citra tumo-
rem præter naturam. Alterum vbi vnà cum
intemperie tumor quoque infestat, vt inflā-
matio, erysipelas, scirrhus, id est tumor du-
10 nis: obstructions à crassis & viscosis hu-
moribus, spirituosæ, seu flatulæta distentio-
nes, idque in extremis vasorum partibus
quæ ex venæ ipsius portis exoriuntur. Has *Obstru-*
quidem obstructions sequitur grauitatis *ctioni iec-*
sensus, quæ dextro hypochondrio incum- *coris si-*
bat. Quod si halituosus quoque spiritus, cui *gna.*
non pateat exitus, ibi concludatur: non so-
lùm grauitas, sed tensionis etiam sensus se-
quetur. Inflammationes verò quæ in hoc *Inflamma*
20 viscere citra ipsius imbecillitatem nascun- *tio gibba-*
tur, si quidem in gibba parte consistant, *rum ieco-*
præcipuè si grandes fuerint, perfacile vel *ris parui.*
solo tactu dignosci possunt. At si marum
partium inflammationes per alia potiùs ac-
cidentia, quàm per tactum inuestigare oportet.
Incipiam igitur ab his quæ in parte
gibba oriuntur: si priùs vos admonuero
eorum quos in corporum dissectione con-
spexistis musculorū, qui sub cute tenduntur.

T 4

Musculo Sunt verò octo numero, quatuor contenti
rum epiga coniugationibus. Quarum prima ex muscu
strij disse lis constat rectis, per totum carneis, à locis
et 10. quæ circa sternon sunt, ad pubis ossa, ita
 enim vocant dissectores, descendantibus.

At reliquarum trium coniugationum mu-
 sculi, vsque ad rectorum contactum, carnea
 quidem parte constant: vbi verò primùm il-
 los attigerunt, in neruosas membranas dege-
 nerare videntur. Horum itaque musculorū 10
 vna cōiugatio, quæ quidem reliquis omni-
 bus exterior est, à thorace obliqua deduci-
 tur, in anteriores partes & deorsum descen-
 dens. Altera huic contraria ab infernis exor-
 ta partibus, obliqua ad anteriores & superio-
 res ascendit. Huic tertia musculorum coniu-
 gatio subiicitur, qui transuersum habent po-
 situm: atque peritonæo, id est membranæ
 quæ intestina continet, innituntur. Recto-
 rum autem musculorum tumores præter na- 20
 turam oblongi, atq; per medium totius ven-
 tris extensi videntur: vmbilicum, veluti ipsi
 quoque muscoli, comprehendentes. quapro-
 pter haud obscura est eorum dignotio, vt-
 pote quos & positus, & figura declarat. acce-
 dente ad hæc, quòd ipsi à nullo exteriore
 musculo conteguntur. Hæc autem obliquis
 quoque musculis, qui à thorace descendunt,
 sunt communia. At multò difficilior est
 noti

notitia musculorum qui iis subiecti sunt: difficillima verò transversorum. Constat autem *Iecoris pot-*tem iecur intra hos sub peritonæo esse positi *sitis exte-*tum, quod quum tribus contegatur muscu- *rior.*lis, fieri non potest, ut tactus aliquam ipsius notitiâ præstet, nisi vel magna in ipso oriatur inflammatio, vel incumbentes ei musculi extenuentur. Sed iecur affici declarant, in *Iecoris af-*dextra præcordiorum parte grauitas, dolor *fecti nota.*

10 tota præcordia retrahens, atque ipsius usque ad iugulum extensio (nam & hoc nonnunquam euenire solet) exigua tussis, linguæ color in primis quidem ruber, deinde verò niger, ingens fastidium, sitis inexhausta, vomitus tum synceræ bilis, tum eius quæ ouorum vitellis similatur, quæ postea æruginis aliquando colorem referre conspicitur. Aluus quoque adstringitur, nisi vnâ cum visceris huius imbecillitate inflammationem excitari

20 contingat. Erysipelatis autem accidētia his *Erysipelas* ferè similia sunt, & insuper febris quoque cum *in iecore.*vehementissima siti laborantes cruciat. eas enim febres quas ardētes antiqui vocabant, *Febres ar-*magna ex parte aduenire videmus, *iecoris dentes.*aut ventriculi flammeis dispositionibus, atque *Phlegmo-*que in pulmonis inflammatione erysipelatis *ne erysipe*participes (Græci φλεγμονῆς ἐρυσιπέλας ὁδὸν ἀπ' *latodes-*pellant) ardentes febres excitantur. quemadmodum ubi in vniuerso quoque corpore bi-

liosi humores ad immoderatum feruorem
 perueniunt. Verùm hæ quæ aut iecoris, aut
 ventriculi occasione eueniūt, omnium sunt
 vehementissimæ. Quibus particulis ita labo-
 rantibus febres magna ex parte in marco-
In libr. de rem transmutātur. Sed de hac alibi seorsum
marcore. scriptum est. Quæ in finis iecinoris partibus
Simarū ie eueniunt inflammationes, vt magis quàm
coris par- illæ quæ in eius gibbo fiunt, fastidium, nau-
tium inflā seam, vomitum biliosum, sitim ingentem 10
matio. inducunt: sic e contrariò hæ maiori quàm il-
 læ, inter spirandum dolore (vt dictum est) la-
 borantem afficiunt, magisque tussim exci-
 tant, atque dolorem vsque ad dextræ partis
 iugulum, adeò vt detrahi videatur, exten-
 dunt. porrò vtriq; parti quum dolor adest,
 nothæ costæ nonnūquàm cōsentiunt. Ita-
 que eis commune est, non omnibus: pro-
 pterea quòd iecur per membranas non o-
 mnibus coniungitur: id quod non solū in 20
 finis, sed in aliis quoque animalibus videre
 est. Etenim aliis quidem coniungitur, aliis
 minimè. Igitur quemadmodum interdum
 in gibbis duntaxat, ita & in finis huius vi-
 sceris partibus inflammatio oritur: quam-
 uis in neutra partium exquisitè distincta
 possit consistere. Nam omnium eius par-
 tium carnes inter sese continuantur. Cæ-
 terum quibus naturâ, abdomen gracile est,
 quando

quando morbo gracilius efficitur, in iis facile est videre ingentem iecinoris inflammationem, quæ propriam hanc à musculis incumbens sortitur differentiam: quòd moles sub manibus ad coaceruatam circumscriptionem desinit. At musculus quilibet, quum totus sibi continuus sit, inflammationis ipsius moles sensim diminui consuevit. quippe soli iecinori proprium est, vt tumoris cumulum comprehensim habeat circumscriptum. Vnde manifestum est, quòd durus in ipso tumor (Græci scirrhus rhon vocant) multò euidentius dignosci *heparis* potest, eo quòd durior sit scirrhi ipsius, quàm inflammationis moles, quodque in huiusmodi dispositione extenuata sint corpora, quæ ei incumbunt. At verò tractu temporis quauis magis increseat scirrhi tumor, non tamen æquè facile fuerit, per tactum ipsum cognoscere, intercipiente scilicet iudicium aqua inter cutem, quæ illicò scirrhum sequi consuevit. Quippe nisi hepar afficiatur, haudquaquàm fieri potest huiusmodi affectus, non tamen semper ob primariam eius affectionem excitatur, quamuis hoc sit quàm frequētissimum. Etenim quia ipsum, eius facultatis, quæ sanguinem gignit instrumentum est, consequens est, vt vitiatò hoc viscere, actio quoque eius vitietur.

Acci

Accidit autem (ut dixi) quum aliàs aliam partem frigida admodum intemperies afficit, ut hepar quoque refrigeretur. Igitur si vel lienis causa, vel ventriculi, vel intestinorum vniuersorum, maximè ieiuni, mesentericæ venæ[omnes] habituali intemperie afficiantur, facilè etiam vnà refrigerare possunt omnes simarum iecoris partium venas: quò fit ut ad hepatis quoque corpus intemperies ipsa perueniat. Si verò vel pulmonis, vel septi transuersi, vel renum occasione id accadat, in primis venæ, quæ in visceris huius partibus gibbis consistunt, per consensum afficiuntur: deinde tractu temporis totum hepar quoque eadem dispositione infestatur. Ergo quæ hucusque diximus, sic se habere nemo inficiabitur, nisi fortè quis aut suapte natura cõtentiosus, aut omninò fuerit indoctus. De obstructione verò, nõ æquè certæ habentur cõiecturæ. Et enim quòd simarum partium venæ, ab ea quæ in porta exoritur, in tenuissimas extremitates finiantur, haud obscurè apparet. Atque quòd ad eundem locum aliæ quoque venarum extremitates à concava vena, in gibbas visceris partes distributarum perueniant, similiter constat. licet quomodò per sua ora ipsæ inter se coniungantur, videre nequaquam possimus. Neque enim dubitat

Hepatis
obstru-
ctio.

rat aliquis, sed omnes ferè Medici ex vno ore enuntiant, quòd cibus vniuerso corpori distributus ex omnibus fimarū partium venis exiens, ad gibbas partes per dictas extremitates transsumitur. Quòd si fateamur sanguinis transitum, ob tumoris venarum quæ inflammatione & scirrho occupantur, molem constringi: rationi consentaneum esse videtur (vt nonnullis placuit) vt pars

10 quæ in sanguine magis tenuis atque aquosa est, tràssumatur, atque vehatur per vniuersum corpus: syncerus autem sanguis, qui propter sui crassitudinē in caua visceris parte permanet, ei morborum qui ex plenitudine fieri solent, causa esse censeatur. Per-
scrutantibus verò nobis huius sectæ placita, videntur partim cum iis quæ iam suprà dicta sunt, cōsentire: partim verò nonnihil ab iis, quæ apparere solent, differre. Quòd

20 enim aquosa sanguinis pars transsumpta in venā concavam vsquequaque per corpus dispergatur, consequi videtur ad ea, quæ iam in confesso esse diximus. Quemadmodum crassiorem sanguinem in visceris venis præ angustia earum retentum ad intestinum ieunum & tenue, & colon, & cæcū atque rectum deferri, & (vt quispiam dixerit) in ventrem fortasse, nemo tamen id accidisse vidit, neque in hepatis præter
natu

naturam tumoribus, neque etiā obturationibus. Verū in omnibus corporis partibus, tum ſpernis, tum inferioribus pituitosus ſanguis contineri conſpicitur in iis morbis, quos Græci & anafarcas & leucophlegmatias nominare conſueuerunt. Per aluum autem nihil cruentum, neque in iis, neque in aſcite, neque in tympania ſecerni ſolet. Sed ſpacium quod inter peritonæum & partes ei ſubiacentes eſt, aquoſo humore impletur. 10

Anaſar-
ca. Proinde rationi magis cōſentaneum eſt, ut ob viſceris refrigerationem cibus qui reli-

Hypoſar-
ca. quis partibus diſtribuitur, in ſanguinē tranſ-

Aſcites.
Tympania. mutari non poſſit, quin etiam refrigerantur cum ipſo vniuerſi corporis venæ, idque maximè, vbi nullo plarumque tumore in iecinore apparente, laborans aqua inter cutem moleſtari videtur: vitio exiſtente vel in lie-

Hydropi-
corum af-
fectus. ne, vel ieiuno aut tenui inteſtino, aut meſenterio, vel pulmone, vel renibus, aut etiā vbi 20

plurimus per hæmorrhoidas ſanguis excernitur, aut ob muliebri profluuium, aut quū retinentur mēſtrua, aut ob aliam ingentem vteri diſpoſitionem. Nam per omnes huiſcemodi affectus aquā inter cutem hominem vexari contingit, vel nullo exiſtente in

Aquæ fri-
gide po-
trio. hepate præter naturam tumore. Id verò præcipuè intelligitur ab iis, qui didicerunt quomodo ex intempeſtiua aquæ frigidæ potatione

tione iecur affatim refrigeratum, statim a-
quam inter cutem inducit, antequàm scili-
cet in durum tumorem attollatur. Verùm
sic affecti vehementi ciborum desiderio te-
nentur, nec mirum, quippe ob refrigeratum
os ventriculi, huiusmodi cupiditates inuale-
scere, iam antè didicimus. Sed de aqua inter
cutem, quantum ad præsens attinet propo-
situm, hæc dixisse satis est.

10

De morbo regio. CAP. VII.

Porro vtrum semper in morbo regio lo Morbi re-
cus affectus sit hepar, an alia prætereà gij cau-
dispositio hunc affectum efficere possit, de- sa et in-
inceps percurrendo scrutemur: siquidem vi- dicia.
demus nonnunquam iecinore nequaquam
affecto per morbi iudicationem, effundi ad
cutem bilem pallidā, quomodò humorum
in aliquam partem † decubitus quoque ali- † απο-
20 qui interdum euenire consueuerunt. Vide- σκιμμε-
mus etiam aliquando citra morbi iudica- τας.
tionem sanguinem ab extranea quadam cor-
ruptione in bilem verti: qualis ferarum mor-
su fieri solet. Etenim Imperialium seruito- Impera-
rum quidam, qui viperarum venationi de- toris ser-
putatus erat, quum à vipera morsus esset, uis qui-
aliquanto tempore medicamenta quibus dam à vi-
uti consueuerat, potabat: cumq; vniuersi cor pera mor-
poris color mutaretur, adeò vt porri co- sus.
lorem

lorem referret, accedēs singula nobis enarrauit, cui epota theriaca, quam celerrimè color secundum naturam restitutus est. Solent autē Medici inuestigare, an assumpti veneni propria extent signa, eo quòd sæpenumero videant, citra letalis veneni potionē humores similiter vt epoto veneno corrūpi. Verūm non mirum est, si sic aliquādo mutantur humores, vt vniuersum corpus auringinosum euadat. Quāquā fieri etiam potest, vt iecinoris secundum naturam temperies mutata, humores huiusmodi vitio afficiantur, & quidem citra obstructionē, aut inflammationem, aut scirrhum. Quinetiam manifestè quandoque videmus, vniuersum corpus herbis candenti pallore infectis simili: interdum plumbeum, aut etiam magis fuscum referre colorem: interdum etiam alias quasdam ineffabiles colorum proprietates, quæ iecinore suo munere non rectè fungente, sine tumoribus præter naturam accidere solent. Sic ob splenis quoq; vitia, huiusmodi colores eueniunt, sed multo nigriores quā ab hepate. Quos vt clara interpretatione enarrare difficillimum, ita cognoscere facillimum, iis præsertim qui illos sæpenumero conspexerint. Etenim Stesianus quum Medicorum iudicium subiisset, nescio quo pacto eorum non pauci abscessum

Stesianus
abscessu
in muscu-
lis epiga-
strij labo-
rans.

sum in ipsius hepate consistere crediderint. Sed postea quàm longo temporis spacio nihil se in melius proficere sentiret, me quoque vocauit. Igitur simul atque domum, vbi iacebat, fuissem ingressus, aspiciēs eum, hoc inquam scias velim, nullum tibi esse in viscere vitium: sed quid aliud te molestat, nudatis præcordiis declarare conabor. Inueni ergo in profundis musculis abscessum, 10 contracto iam pure, in medio spacio eorum musculorum, qui per transuersum incedunt, atque illorum qui obliquè ab infernis sursum tendunt, qui (vt nouistis) medii sunt inter eos qui transuersi peritonæo incumbunt, & eos qui sub externa cute obliqui deorsum feruntur. Sic etiam alios complures scitis me notasse, per colorem declarando modò iecur, modò splenem esse affectum: nullâ audita præteritorum accidentium narratione, neque etiam per tactum 20 inuestigato viscerum affectu. Proinde facta. penumerò audiuiſtis me malè imprecantem iis, qui medicæ quidem professionis (quod ad spectatiuam pertinet) principes se esse iactabant, nullius verò ægri volebant aggredi curationem. De quorū numero plurimi fuerunt tum empirici, tum methodici: quibus si quis dixerit, fieri posse, vt solo perspecto colore, affecta sedes interdum cognos-

scatur, illi aperto ore, atq; rabidi canis exemplo, exerta lingua impudenter ei resistunt. Verum præfens sermo haudquaquam ad illos dirigitur. Itaque ad aliud accidentiū genus quod sola iecinoris imbecillitate, quæ
Iecoris imbecillitas. per se ac sine inflammatione euenire solet, cōtinetur, nūc transeamus. quemadmodum & de ipsius inflammatione, quæ citra propriæ facultatis suæ imbecillitatem accidit, seorsum iam diximus. Cæterum postquam
Propria hepatis facultas. sanguinis generationem hepatis munus esse intelligimus, si causa aliqua fuerit, quæ hunc generare possit, eam hepatis propriam facultatem esse dicemus. Propriam autem diximus, propter eas quæ omnibus corporis nostri partibus communes esse dignoscuntur: quas in libro de Naturalibus facultatibus, iam percurrimus, attractricem dico, & retentricem, & expultricem. Nanque quarta generatim quidem alteratrix, speciatim verò
Cōmunes facultates. sanguifica vocatur. Porro omnium facultatum essentiam in peculiaribus partiū temperantiis cōsistere didicistis. proinde quum iecur ad aliquam octo intemperantiarum labitur, accidet viribus ipsius noxa, quæ illi intemperantiæ peculiariter debetur. Sed de iis generalem scripsimus sermonem, in tertio libro de accidentium causis: proprius autem cuiusque secundum speciem partis
 com

communi ad portionem respondet. Igitur calidæ iecoris intemperantiæ, cum conten- Iecoris in-
 tos in ipso humores, tum eos qui per me- temperan-
 senterii venas deferuntur, & assant & adu- tia.
 runt: frigidæ autem, contentos iam in ip-
 so humores, crassos atq; ad fluxum & mo-
 tum contumaces reddunt: id verò quod
 ad ipsum fertur, & pituitosum, & crudum,
 & semicoctum efficiunt. Sic de reliquis
 10 quoq; duabus dicendum est. Arida quidem
 intemperantia, sicciore, crassioresque hu- Ga. lib. 8.
 mida verò, magis tenues aquosioresque de comp.
 reddit humores. Igitur quum alui sedi- med. κατὰ
 mina, aquæ, in qua nuper mactata caro τὸ πρῶτον. ca.
 abluta est, similia esse videritis, efficacissi- de iecino-
 mum inde affecti iecinoris signum elice- ris affec-
 re nequaquam dubitetis. Ac nominantur
 hepatica, ea præcipuè quæ ob imbecillita-
 tem ipsius deiiciuntur: quippe ad iecoris Hepatica
 20 essentiam pertinent huiusmodi affectus. At- excremen-
 qui didicistis cuiusque primorum corpo- ta.
 rum essentiam ex quatuor qualitatibus con-
 stare temperamento. Sic etiam quum faci
 sanguinis similia per aluum excrementa dei-
 ciuntur iecur affectum esse coniiciendum
 est. Vt enim tenue & saniosum excremen-
 tum infirmi iecinoris sanguinem creare nō
 potentis, ita id quod faci similatur, super-
 assantis sanguinem hepatis indicium est. Ne-

que enim à memoria vestra decidit, quum
 sæpe videritis quosdam, in primis quidem
 saniem & cruenta quædam, dein tractu tem-
 poris crassum, ac melancholicum sangui-
 nem, postremò atram quoque bilem, &
 quidem synceram deiicere. Accidit autem
 interdum, vt hic affectus ob frigidam in-
 temperiem citra febrim incipiat, quando
 tenuis sanies sanguinis excernitur, deinde
 tractu temporis, corrupto in viscere sangui- 10
 ne, febris superuenire solet, quæ tamen ab
 imperitis vsque adeò negligitur, vt laboran-
 tem interdum nequaquam febricitare pu-
 tent, quippe hunc affectum ob inedia ac-
 cidisse existimant. Siquidem quòd nulla sit
 ipsis cibi cupiditas potius, quàm ob medi-
 corum institutum, laborantes à cibo absti-
 nere inuenerunt. Itaque quum interim ni-
 hil excernatur, videaturque laborans omni-
 no liber à febre, balneis eum exponunt, ac 20
 debitam victus rationem præscribere negli-
 gunt. Quocirca rursus corruptos cibos alius
 deiicit, quos deinde hepaticorum excre-
 mentorum nonnihil sequitur. At nonnulli
 qui ob frigidam intemperiem laborare ince-

Calida perunt, non solùm non perdunt cibi cupidi-
intempe- tatem, verùm etiam interdum multo magis,
ries ieci- quàm antea se esurire aiunt. Calidas verò
noris. intemperies nunquam comitatur ciborum
 appe

appetentia, sed cibi fastidium, sitis vehemens,
 febris insignis, vitiosorum humorum vomitus. Hæc sunt propria hepaticorum accidentia: sic enim nominari iam dixi eos, quibus *Gal. lib. 3. de symp. causis.*
 visceris ipsius vires fuerint imbecilles. Quam in re vulgus medicorum errans, hunc affectum
 putat esse dysenteriam. Inflammationem autem
 alia (ut dictum est) sequuntur accidentia. Quum
 itaque ambo interdum affectus conueniant,
 10 utriusque accidentia simul apparere solent,
 quæ in promptu medicum habere oportet. Sic
 enim non solum laudabunt nos, sed admirabun-
 tur etiam illi, qui opera nostra indiguerint,
 præsertim si accidentia quoque, quæ aliis mor-
 bis communia sunt, insuper prospexerimus.
 veluti quod dolor ad nothas costas perue-
 nit, quod iugulus detrahi videtur, quod spi-
 ratio parua redditur & frequens. Equidem
 quum primum Romam venissem, magnifice
 20 admiratus est me Glaucos philosophus ob
 huiusmodi quadam dignotionem. Etenim
 per viam mihi occurrens, opportunè (inquit) *Glaucos philosophus.*
 aduenisti, iungensque dextram dextræ, proxi-
 mi sumus (inquit) laboranti, quæ nuper vidi:
 itaque oro, ut unam mecum ad ipsum venias.
 est autem Siculus medicus, quæ non ita pridem
 mecum ambulantiem vidisti. Ego verò, quid
 inquam molestat ipsum? Tum ille & copiose
 admodum & aperte id declarare aggressus

est. Neque enim adeò erat vafer, vt aliquid me cælare posset. Quoniam heri (inquit) & Gorgias & Apelas mihi nuntiauerunt, notiones præsagiaq; edidisse te, quæ ad diuinationem potius, quàm ad medicinam pertinere videbantur: cupio equidem periculum facere, non adeò vt tuam experiar doctrinam, quàm vt sciam, num tanta sit in arte medica tum cognoscendi, tum præsagiendi facultas. Interim quum hæc diceret, 10
venimus ad laborantis hostium, vt neque verbo eius prouocationi respondere, neque etiam ea quæ sæpenumerò me dicere audiuiſtis, effari possem: quòd scilicet multa interdum nobis feliciter facileq; apparent, interdum verò omnia sunt ambigua: atque idcirco & alteram & tertiam quoque considerationem expectamus. Itaque in primo statim aditu obuiam nobis venit quidam peluim à cubiculo efferens, continentem 20

Affecti iecinos in- tenuem cruoris saniem carniū nuper ma-
diciū eui- ctatarum ablutioni haud ab similem euiden-
dentissi- tiſſimum affecti iecinoris indiciū, qua vix
mum ab dum inspecta, vnà cum Glaucone ad medi-
excremen cum ingressus sum. Apprehendi itaque ma-
tis per al- num in carpo, id est brachiali, quò intelli-
num deie- gerem utrū inflāmatio, an sola imbecillitas
ctis. esset in viscere. Quia verò (vt diximus) me-
dicus erat: nuper (inquit) à deiectione decu-
bui,

bui, itaque perpēde arterias ob id quōd sur-
 rexeram crebrius pulsare. Hæc quidem ille
 dixit, ego autem deprehendi inflammatio-
 nis indicium. Prospiciensque ad fenestram,
 hyssopum ex aqua mulsa decoctum in olla
 consideraui. proinde cogitavi, medicum se
 pleuriticum esse putare, dolore videlicet no-
 thas costas infestante, qualis iecinoris quo-
 que inflammationibus aliquando accidere
 10 consuevit. Hunc itaque quum sentiret, es-
 setque spiratio & parua & crebra, atque exi-
 gua tussi infestaretur, pleuriticum se esse exi-
 stimabat. quamobrem hyssopum quoque
 ex aqua mulsa præparauerat. Intelligens ita-
 que ego, quōd fortuna viam mihi præbe-
 ret, qua apud Glauconem clarum nomen
 adipisci possem, manum eius ad nothas in
 dextro laborantis latere costas detuli, in-
 dicatoque loco, dixi eum ibi dolere. Quod Prædicat
 20 cum ipse fateretur, Glauco ex solo arteria- Gale. corā
 rum pulsu existimans me sedem affectam Glaucone
 inuenisse, planè admirari me coepit. Verūm medicum
 vt vehementius stuperet, hæc quoque ad- quēdā nō
 didi: Quemadmodum hoc in loco dolere pleuritide
 te cōfessus es, ita velim fatearis, etiā tussien- (vt puta-
 di cupiditate vexari te. etenim ex longis bat) sed ie
 interuallis tussis exigua, arida, & qua nihil coris affe-
 expuis, molestare te solet: atque ita me dicē. Et tu labo-
 re incepit fortè fortuna huiusmodi quadam rare.

tussis specie (qualem iam diximus) tussire: qua de re tanta admiratione Glauco commotus est, ut continere sese non valens, magna voce exclamando, in laudes meas prorumperet. Tum ego: Non putetis (inquam) sola hæc ex arte posse præfagiri. Sunt enim alia quoque, quæ nunc dicere aggredior, quibus & laborans ipse testimonium feret. Itaque rursus incipiens dixi: Quum magnam trahis spirationem, dolor ea parte 10 quam notaui, vehementius te cruciat, sentisque in dextra præcordiorum parte gravitatem. His auditis, ne infirmus quidem sese potuit continere, quò minùs præ vehementi admiratione, vnà cū Glaucone exclamaret. Itaque sentiens equidem arridentem mihi fortunam, de iugulo quoque, quòd videlicet ad inferiora trahi videretur, aliquid efferre volebam. At quia magnas inflammationes, quemadmodum & scirrhum, id comi- 20 tari solet, dicere non sum ausus, veritus ne laudem quam antea de me excitaueram, facerem. Quumque animum induxissem tutò me aliquid eloqui oportere, aspiciens laborantem, haud ita multò post (inquā) iugulum ad infernas partes detrahi senties, nisi fortasse id iam antea tibi euenerit. At cum hoc quoque; fateretur, conuersis equidē oculis ad ægotantem mirificè attonitum, vna (inquam)

(inquam) addenda est prædictis diuination.
Etenim dicam, quam de morbo suo labo-
rans ipse habuerit suspicionem. Tum Glau-
co, ne de hac quidem diuinatione desperare
se aiebat. Laborans autem incredibili hac
pollicitatione in stuporem adductus, & acri-
ter me intuens, quid essem dicturus attenta
mente expectabat. Igitur dicente me, quòd
infestantem morbum pleuritidem esse pu-
10 tasset, ille ingenti cum admiratione huius
quoq; rei se testem, exhibuit: id quod etiam
affirmabat ex astantibus vnus, qui paulò
antè latus eius ex oleo fouerat. Atque ex
eo tempore Glauco tum de me, tum de vni-
uersa arte quam optimam concepit opinio-
nem, quum antea nihil magni ab arte expe-
ctaret, vtpote qui nunquam cum consum-
matis in arte viris versari consueuisset. Hæc
ideò dicere volui, vt intelligatis quæ acci-
20 dentia cuilibet morbo propria sint, & quæ
aliis quoque morbis communia, ac præter-
ea quæ ab vtrolibet genere sint inseparabi-
lia. Item quæ magna ex parte & quæ rarò
videri solent, atque ea quæ ancipitem ha-
bent euentum, vt si aliquando fortuna hu-
iusmodi vobis occasione qualem mihi fuis-
se oblatam iam dixi, præbeat, eâ commodè *Fortuna*
vti sciatis. Sæpe enim fortuna non contem- *non contem-*
nendam adipiscendæ laudis ansam suggerit, *nenda.*

eâ tamē vulgus medicorum ob imperitiam
viti nescit. Quanquam doctissimus quisque
quum accidentium aliquod huiusmodi cō-
spexerit, haud difficulter reliqua quoque in-
ueniet: quorum alia quidem necessariò, alia
verò magna ex parte, & locum affectum, &
morbum ipsum sequuntur. Verùm memi-
nisse debetis generalium præceptorum, quæ
& vniuersalia appellantur, & quæ multo-
rum specialium communia genera sunt, vt 10
ea in particularibus providè discernere di-

Naturales scatis. Est igitur communis sermo, quem in-
faculta- uenire proposui, de naturalibus facultati-
tes. bus, quas in qualibet parte generatim qua-

Attractrix. tuor esse didicistis: Primam voco attractri-
cem, quæ peculiare parti succos alēdi ipsam

Alterat- gratiā, & appetere, & attrahere potest. Al-
trix. tera deinde est, quæ alteratrix dicitur, qua
succus attractus similis euadit parti quæ ali-

Retētrix. tur. Huic aliæ duæ ministrant: Retētrix, 20
quæ suo munere fungitur, quando pars at-
tractum succum coquit, donec in suam ip-
sius naturam eum mutauerit: Et expultrix,

Expul- quando à coctione, quod inutile est, excer-
trix. nit, idque excrementum vocatur. Has ita-

Excremē- tum. que facultates in qualibet affecta parte utrū
validæ sint, an infirmæ, consideretis hortor:
vt in hepate. quoniam de hoc dicere insti-
tuimus, vis attrahēdi si quomodolibet affi-

cia

eiatur, cibum in ventriculo iam in succum
transmutatum relinquet, vt per aluum ex-
acte confectus, liquidus, & haudquaquam
exiccatus excernatur. Atque hoc quod ipsa
affecta sit, signū vobis erit. Quicquid enim
ab aliquo tāquam à causa procedit, id etiam
illius signum esse constat. Hunc affectum
nōnulli ad mesaræum pertinere autumant, *Meseraici*
vocatque sic laborantes meseraicos, eò *ci.*

- 10 quod vident cibum per venas mesaræo &
mesenterio intextas, distribui, vt solebat,
non posse: eodem seducti errore, quo ij qui
manus eorum, quos syncopa, vel stomachi-
ca, vel cardiaca prostrauit, affectas esse arbi-
trantur: vtpotē quæ haudquaquam, vt an-
teā, munere suo fungantur. Quippe iecur, *Vena me-*
mesaræi venis, veluti manibus, quæ ex ven- *seraica*
triculo ei cibum afferant, vtitur. Similiter *quid con-*
etiam falluntur nonnulli, vbi crura resoluta *ferant ie-*
20 sunt, ob affectum aliquem, eam spinæ par- *cori.*

tem, quæ iuxta lumbos est, infestantē. quip-
pe neglecta spina, cruribus remedia adhibēt.
Igitur si mesenterium vel inflammatione, vel
alio eiusmodi affectu laboret, hunc propriè
ad ipsum referemus: si verò iecur ob imbe-
cillitatem per venas suas cibum allicere ne-
queat, nō mesenterio (id est lactibus) sed ie-
cinori, remedia sunt adaptanda. Quēadmo-
dum ne resolutis quidem vel manibus, vel
cruri

cruribus, ob affectum qui in spina consistit.
Mesenterij Verum ubi vel inflammatio, vel erysipelas
inflamma mesenterium afficit, haud ita difficile est
tio. discernere, si alui excrementa diligenter con-
 sideres. Neque enim solum qualia excer-
 ni diximus in iecinoris imbecillitate, quum
 ad sese cibum trahere non potest, talia pla-
 ne deiciunt: sed apparet etiam, veluti ab
 inflammatione, sanies quaedam admixta.
 Nam ab omni parte inflammata, cui spissum, 10
 crassumque tegmen non incumbit, in
 primis quidem tenuis sanies defluit, quae,
 concocta deinde inflammatione, & cras-
 sior, & puri similior redditur. Quum ergo
 nulla existente in iecore inflammatione, hu-
 iusmodi quippiam, cum excrementis succi
 speciem consequutis deicitur, in mesaræo
 affectum esse censendum est. Igitur ut non
 potente ob imbecillitatem hepate succum
 à ventriculo attrahere, attrahendi facul- 20
 tas afficitur: ita quum retinere nequit, com-
 prehensens, continensque facultas, infirma
 putanda est. Proinde in primis quidem cruo-
 rem saniosum excerni videmus, postea verò
 crassum, & faculentum. Similiter aliae quae-
 dam eueniunt excretiones, non quidem ob
 imbecillitatem, sed ob expultricis facultatis
 robur, ratione plenitudinis, & quidem sa-
 penumerò integra etiam dum constante va-
 letu

letudine. Sic plærunque pars aliqua, quum affecta est, per hepar purgatur, viribus ipsius iam factis robustioribus, quippe cōcoctis in ipsa vitiosis humoribus, sequitur excretio, *Ordona-* sed ita sequitur, vt vtilis humores retinean- *tura.* tur, expellantur verò inutiles. Atque sunt nonnulli qui huiusmodi vacuationes nominent cruentas dysenterias: quæ euenire solent quibusdam, vel mutilato aliquo membro, aut vbi quis in exercitatione educatus, *Cruenta dysente-* ad ocium se conuerterit. Ac solet quoq; mulieribus retentis menstruis huiusmodi per sedem vacuatio fieri. Atq; interdum pervomitum quoque eandem ob causam quibusdā mulieribus. Verum his syncerus sanguis excernitur, similis ei qui ab hostia interfecta profundi consuevit, modò infernè per anum, modò per superiores etiam partes. At per erysipelata, & inflammationes, accedente concoctione, vitiosus, coenosus, & putris, deiicitur. Atque vt in hepaticis affectibus (quanquàm rarò) medicamentorū auxilio, robustiore euadente iecinore, interdū deiiciuntur excrementa, tum colore, tum odore pessima, purgato ita viscere: sic eodē modo vrinæ quoq; deteriores redduntur, quibus imperiti Medici nonnunquam decepti, grauis morbi periculū subesse arbitrantur. Etenim quib⁹ sine ratiocinatione, rudis dū-
taxat

taxat experientia suffragatur, de his quæ raro eueniunt experientia habere non possunt, veluti eorum quæ sæpenuerò accidunt facile meminerunt. Quòd autem protractio per longum spacium morbo, apparentibusque notis concoctionis, huiusmodi fiant euacuationes, non semel duntaxat, imò creberrimè, ex enarrationibus, quas in Hippocratis opera edidimus, didicistis. Igitur quemadmodum retentrix facultas quæ 10 imbecillior est, ac rem quæ ipsam grauat, retinere nō valet, vis expultrix id quod molestat euacuat: ita infirma expultrice, res quædam retineri solent, facultate retentrice non admodum grauata. Nam in quolibet instrumento, aliàs alia facultas, vel fortior fit, vel imbecillior, facta videlicet ad actionem relatione: si modò vniuscuiusque facultatis rationem intellexerimus. Nam reuera tota semper particula, secundum temperamen- 20 ti quod ei frequentius inest, agit proprietatem. Verùm aliquando rem grauanti sustinet, ac longo temporis tractu eam vincit, conficit, alterat, & concoquit: deinde rursus alio tempore, rei infestantis vel qualitatem, vel multitudinem ferre nō valens, ad ipsius excretionem insurgit. Sicut e contrariò, quæ interim admodum molestat: ipsam rem molestantem deicere cupiens, viribus gra- uissi

uissimè prostratis, ob imbecillitatem id effi-
 cere non potest. Igitur hæc omnia in quo-
 uis naturali instrumento perpendere, atque
 mentem in ipsis dignoscendis exercere de-
 betis. Sic enim inuenietis partium quarun-
 dam affectus, antea haudquaquam indaga-
 tos, veluti ne folliculi quidem fel continen-
 tis. Si enim (vt ostēdimus) biliosum humo-
 rem ad se trahit, quemadmodum renes vt
 10 sanguinis serum, aut splen, id quod vini fac-
 cib, aut amurcæ similatur: accidit inter-
 dum, vt ob huius folliculi imbecillitatē, im-
 purus fiat sanguis, atque idcirco alia eueniat
 regij morbi species, præter eas tres quas iam
 suprâ proposuimus. Ac nonnunquam ita
 repletur etiam (quemadmodum vesica quæ
 vrinæ est conceptaculum) vt euacuari non
 possit, aut quia obstructus est, aut quia secre-
 toria ipsius facultas est imbecillior. Veluti
 20 etiam, quum obstructis, aut infirmis, vasis,
 quæ ab ipso exorta, ora sua in hepar exten-
 dunt, biliosum humorē interdum attrabe-
 re nō potest. Proinde excrementorum pro-
 prietatem in morbo regio cōsiderare, per-
 quam necessarium est. id enim non medio-
 cre nobis ad huiusmodi notitias auxilium morbo re-
 suppedabit. Hæc equidem considerans in-
 ueni quorundam regio morbo affectorum
 excremēta, flaua bile vehementer colorata,
 simi

Excremē-
 torū consi-
 deratio in
 morbo re-
 gio.

similiter etiam & vrinas: item per cutē quoque, vt nonnullis plurimum flauæ bilis à balneo profundi, ita aliis plurimum ipsius retineri, ac per quā exiguum effundi comperimus. Hanc rem si accuratiori experimento intelligere volueritis, nulla prius adhibita vnctione, homini sudorem frigili auferri iubete: videbitis profectò nō eodem modo in omnibus, frigilis concauitatem impleri, vtpotē quod in aliis magis aquosum, atque in aliis magis biliosum est. Itaq; loci affecti notitia vobis multò erit dilucidior, si cum prædictis, hanc quoque notitiam adiiciatis.

Morbis re Quidam enim acuta biliosaque febre laborans, die septimo multa flaua bile ad cutem transmissa, à morbo liberatus est, mansitque sequentibus deinde diebus auriginosus. Ita-
gius post que & excrementa, & vrinas cōsiderauimus:
febrē acu vtrisque; verò secundum naturam se habentibus, atque ob eam causam nullū visceris affectum declarantibus, venit in mentem, fieri posse, quòd translata in cutem bilis crassior esset, qua ratione promotus, discere volui qualisnam esset sudor: illo autem apparente aquoso, conieci bilem esse, dissipari contumacem, præcepi itaque laboranti, vt aqua suapte natura calida, & cui discutiendi vis esset, vteretur, ac prætereà victum adhiberet humidiorē, qui humorum crassitudinem

dinem moderatè posset extenuare. Hic au-
 tèm bonam valetudinem consequutus est,
 vnico auxilio, & notitia cõfirmata, & cura-
 tione absoluta. Quinetiam alium multam
 in strigili bilem relinquere vidimus, vnde eã
 plurimã in vniuerso corpore procreari per-
 pendentem, ipsum adhibita idonea curatione
 sanauimus. Quibus verò citra febrim mor- *Morbus re*
 bus regius accidit: vrgente in dextra præcor *gus citra*
 10 diorum parte grauitatis cuiusdam sensu, iis febrẽ quo-
 omnibus aperiens (vt scitis) obstructiones, modo cu-
 & cibis & potibus & medicamentis exte- *ratur.*
 nuantibus, deinde medicamentum quod bi-
 lem ducere posset exhibẽs, eorũ plurimos
 vna die sanitati restituimus. Qui verò pur-
 gatione liberari non potuerunt, iis rursus va-
 lentiore ad aperiendum data portione, medi-
 camentum quod vehementiũs purgaret, ex-
 hibui. Sic deinde sub fine purgationis, vel
 20 cærulea, vel flaua bilis, cum acri mordacitate
 fecernebatur. In iis conieci fellis folliculum, *Folliculi*
 simili quopiã affectu laborare, qualis in ve- *fellis imbe*
 fica exuberante vrina interdum fieri solet. *cillitas.*
 etenim adeò multam nonnunquã recipit,
 vt nimis intenta nequeat eã quæ in ipsa con-
 tinetur, expellere. Verũ in vrine recepta- *Vesica af-*
 cu'o (neque enim absurdum fuerit; vesicam *fectus ob*
 ita nominare) bifariam id fieri solet. Inter- *imbecilli-*
 dum ob excretoriæ facultatis imbecillita- *tatem.*

tem: Interdum vel ob grauem somnum, vel
negotia quapiam, retentâ vltra quàm par
est vrina: quæ deinde vesicam nimis inten-
dens, hac ipsa ratione vires eius prosternere
potest. At fellis folliculus, vtpotè cui nullum
succurrit ab animali facultate præsidium,
vnicum habet imbecillitatis princi-
pium, veluti cætera quoque na-
turalia instrumenta, à par-
tis intemperie or-
tum.

10.

LIBRI QVINTI
FINIS.

323
CL. GALENI

DE AFFECTORVM

LOCORVM NOTITIA

LIBER SEX-

T V S.

*

Hoc postremo libro absoluit artem qua è no-
tis lienem affectum, ventriculum, intestina, re-
nes, vesicam, uterum & colem intelligas.

De affectibus lienis.

CAP. I.

EX iis quæ de iecinore diximus, facile inuenientur notæ, quibus lienis affectus discernatur. Hoc addito, qd ipsius inflammationes, Nota qui-
ob duritiem, facile tangendo deprehendan- bus discer-
tur. Quum itaq; splen multa habeat acciden nantur lie-
tia cum hepate communia: illa, nulla re dif- nis affe-
20 ferre videntur, nisi quod quædam magis, ctus.
quædam verò minus, alterutri euenire so-
lent. Nam quod ad coloris rationem perti-
net, vniuersum corpus, vbi splen imbecillita-
te affectus est, magis nigricare videtur. Nā
hoc ei natura officium dedit, vt melancho- Officiu
licum sanguinem ex hepate ad sese attrahat, lienis.
quo ipsum ali iam demonstratum est. Igi-
tur attrahendi facultate facta imbecillio-
re, sanguis ex iecore in vniuersum corpus

X 2

impurus transmittitur, quocirca color nigrior euadit. Quinetiam hepatis exemplo, sæpenumerò excrementa quædam ex se reicit. Itaque vomitione, cui nausea quoque accedit, melancholicum sanguinem excernit:

† ἀθυμίας qui interdum per inferiora quoque decedente καὶ δὲ ure videtur. At huiusmodi vacuatione suppressi, nonnulli in cæstitia melancholica vexantur, atque cibos avidissimè concupiscunt: αὐτὰς idq; præcipuè si valde fuerint acida, quæ ad 10
† ἀνατρο- ventriculū transferuntur excrementa. Quam πέντε καὶ quam nonnunquam + eversa deiecta que ὑποτίσ- penitus cupiditate, cibum fastidiunt, alia μὲν. quadam urgente ipsum, affectionum differentia. Quod verò indurato ipso, aqua inter 20
κατὰ πῖ- cutem succedere possit, consentiente iecinore, iam antea dictum est. Quinetiam laborantibus, rante aliquando utroque viscere, regium quæq; e- morbum euenire conspeximus, nigriore, τῷ causi quam pro consuetudine, subsequente colore. 20
S. de cæpsi re, ita ut putaretur flaua bilis fuligini esse tione medi permixta, atque medici quidam iecur nullo camento- affectu tūm laborare existimantes, dubium κατὰ tant quomodo à splene morbus regius nasci τίποτ. possit. Quemadmodum sunt, qui à solo Morbus re liene indurato, nullo existente in iecinore gnis ex af vitio, aquam inter cutem fieri posse arbitran fectio liene tur. Haud secus hallucinari consueuerunt, in 20
ex iccore. ea quoque aquæ inter cutem specie, quæ ad acutos

acutos morbes sequitur. quippe ab iis iecur,
calida, & saepenumero sicca quoque intem-
perie tam grauitur afficitur, vt cibum in san-
guinem transmutare nequeat. At qui ne in
iis quidem iecur affici existimant: ab Eras-
trato accepta consuetudine, vt nullam par-
tem affici arbitrentur, nisi vel tumor quis-
piam, vel vlcus in ipso consistat. Verum id il-
lis concedendum est, qui existiment nullum
10 ab intemperie morbum fieri. At Medici qui
sequuntur ea, quæ manifestè apparent, qui &
refrigerata parte quapiam: accidentia quæ-
dam fieri suspicantur, admiratione digni
sunt, quòd aquam inter cutem cōsistere pos-
se putant, ne vnico quidem loco affecto. Si
enim ob id, quòd nullus est in hepate tu-
mor, ipsum haudquaquam affectū esse exi-
stimant: neque aliarum partium vlla afficie-
tur, in his qui aqua frigida vitiosa epota, *Aqua vi-*
20 *triosa frigida* mox aqua inter cutem corripuntur: quippe
noxam infert internis partibus aqua sic inge-
sta, aliàs aliis, sed præcipuè & in primis ei,
quæ fortè fortuna eo tempore reliquis fue-
rit imbecillior. Verum nisi ad iecur frigus
transmittatur, aqua inter cutem subsequi
potest minimè. Sic splenis quoque vitio *splenis vi-*
aqua inter cutem nonnūquam euenire con-
tuo, *aqua* *interiniē.* *interiniē.* sive-
it, sicut in scirrhis, aut vbi citra tumorem

refrigeratum est, ut quum quis aquam frigidam, & vitiosam, affratim & importunè potauerit. Quòd verò melancholica mœstia, ipso huiusmodi excrementa ad os ventriculi transmittente, proueniat, antea, vbi de ore ventriculi tractauimus, iam dictum est: quamobrem in hoc viscere diutius nobis immorandum non est: cum eius instrumentales affectus rationali dignotione non indigeant: qui verò ab intemperie proficiscuntur, partim ex his quæ iam diximus, partim ex ea doctrina quam suprâ de iecinore proposuimus, noti sint. Nam alij quidem nominatim sunt explicati: alij verò qui similiter ut illi consistunt, similem quoque habebunt dignotionem.

De ventriculi & intestinorum affectibus.

CAPVT

I I.

Partes ventriculi.

QUum de ventriculi affectibus, superiore libro loqueremur, in duas maximas ipsum partes secari diximus: quarum altera quæ superior est, gulæ continua est, ex multis nervis sensificis contexta: altera verò huic continua, ad intestinorum vsque exitum extenditur. Porro sicut vtraque in animalibus proprio munere fungitur, ac pro utilitatis differentia diuersa eis eueniunt accidentia: ad eundem modum quicumque affectus communiter tùm similaribus, tùm in-

strumentalibus partibus aduenire solent, ij
 etiam iis, tùm inter se, tùm etiã cum vniuer-
 sis intestinis, communes esse censentur. Ve-
 rùm accidentium similitudo, non solùm in
 iis inter se, sed etiam in vicinis quoque parti-
 bus, quæ ipsa attingunt, inuenitur: qualis est
 renum, & coli communicatio: atq; horum
 nonnulla sedem affectam habent cognitu
 facilem, vt dysenteria, & tinesmus. Sanè in *Dysente-*
 10 præsentia nomen dysenteriaè propriè audire *ria pro-*
 oportet, vtpotè quod ex appellatione ipsa, *priè voca-*
 intestinorũ vlcus significat. Neq; enim re- *ta.*
 pentè & affatim fit huiusmodi affectus, id
 quod in eo què hepatis vitio accidere dixi-
 mus, fieri solet, atq; proprias etiam habet no-
 tas. Etenim protinus ab ipsius initio, bilis
 mordax secernitur, quã deinde interaneorũ
 abrasiones sequuntur, postea paulum cruoris
 simul excerni videtur, quando videlicet affe-
 ctus ipse iam dysenteria esse cõsetur. Quum *Excremen-*
 20 itaq; huiusmodi abrasiones solæ excernun- *torum in-*
 tur, considerandum est, num pingue quip- *dysenteria*
 piam simul cum ipsis deiiciatur, ita enim in *considera-*
 crassis intestinis vlcus consistere credendum *tio.*
 est. Vbi verò cruorem quoq; excerni vide-
 ris intueri oportet, vtrum is reliquis excre-
 mentis ita sit admixtus, vt vniuersus miscea-
 tur vniuersis, an pars eius aliqua reliquis
 supernatet. etenim si admixtus est, in iu-

perioribus: si verò supernatat, in humilioribus
 intestinis vlcase portendit. Ac idem
 quoque in abrasis excrementis videre est, ve-
 rum non ita manifestè ut in cruore. Similis
 etiam si ramētum excernatur, ratio est. nam
 & ipsa, quòd intestinum fuerit oblasum, de-
 clarant: tum ab essentia propria, tum ex mo-
 do, quo vel commisceri reliquis excrementis,
 vel vni eorum parti supernatare videntur.
 Cæterum non mediocriter conducit ad cu- 10
 rationem, nosse in qua intestinorum parte
 consistat vlcus. Nam si in superioribus inte-
 stinis est, ab epotis medicamentis præsidium
 petendum est: si verò in humilioribus, cly-
 sterem subiicere magis conuenit. At huius-
 modi dysenteriae, ab his quæ ab hepate pro-
 fluunt, ita discernuntur. Nam ab initio te-
 nuis sanies sanguinis ab hepate deiicitur, de-
 inde aucto malo, crassius humor, facibus vi-
 ni haud ab similis. Præterea quòd in hepati- 20
 cis excretionibus nihil abrasum expellitur,
 atque interdum duorum aut trium dierum
 interuallo, supprimitur euacuatio. deinde
 rursus redit malum, atque excernuntur ex-
 crementa prioribus multò peiora. id verò
 per intestinorum vlcera haudquaquam ap-
 paret, quippe in his neque affatim neque ex
 longis temporum interuallis, laborantes de-
 iicere consueuerunt. Atque vlcera quæ in
 recto

Dysente-
 rie hepa-
 tica si-
 gna.
 De excre-
 tionibus
 quas πρῶ-
 τος
 vocauit
 Hippocra-
 tes primo
 Prorrhæ-
 Gal.

recto intestino oriuntur (tinesmum vocāt) *Tinesmus.*
vehementi quidem tensione, & prompta
deiciendi cupiditate infestant, paucis admo-
dum sequentibus excrementis, quæ quidem
ab initio pituitosa & pingua, progressu ve-
rò temporis etiam ramenti specie deiciun-
tur: sed per totum morbi spatium, iis quæ à
supernis descendunt, haudquaquam misceri
videntur. Scribunt nonnulli quòd à forti *Lapis ex*
10 excernēdi conatu, praecedente dolore vehe- *ano per ti-*
menti, aliqui lapides callosos deiecerunt, *nesmū cie-*
iis qui in vesica nascuntur haud absimiles: *ctus.*
id quod ego neque vidi, neque alium, qui
viderit vnquam audiui. Sed coli vehemen-
tem dolorem saepenumero conspexi, medi-
cis illum non ad colum, sed ad renes perti-
nere putantibus. veluti renum quoque cru-
ciatus, ad colum referte videntur. Sunt qui
omninò negent in sinistris partibus, coli-
20 cam dispositionem euenire posse. Igitur vt
ab initio, horum affectuum distinctio diffi-
cilis est, ita hoc tempore, non ita magnam
præsidiorum differentiam ipsi requirunt.
Itaque accidentia, quorum magna est in *Colicū af-*
his affectibus copia, diligenter intueri oportet. *fectū quo-*
Nam & nausea & vomitus vrgent, sed modo di-
multò grauiore & magis assidui, dolente *scernas à*
colo. Euomuntq; ita laborantes, pituitosa *nephriti-*
quædam atque corrupta, hac in re nephriti- *de.*

cos longè superantes, ac retinent etiam magis excrementa, vt ne flatum quidem neque etiam ructum, excernere possint. Sæpenu-
 rò etiam veluti circuire videtur dolor, atque plurima loca occupare, qui modò in hac, modò in illa parte vehemētior fit: nephritici verò dolores, eodem in loco stabiles, iugiter infestant. Quū itaq; dolor in loco fuerit renibus altiore, manifestum colicę indicium portendit. Si verò in vno loco, vbi scilicet 10
 renes ponuntur, stabilis constiterit, nihil ad notitiam potest positus ipse conferre. proinde cum his notis, quas nuper percurrimus, Nephriti-
 corum si-
 gna, quan-
 tum à co-
 licis diffe-
 rant. vrinæ quoque considerandæ sunt. Nam nephritici, ab initio dilutas, purasq; reddunt
 vrinas, deinde sequentibus diebus, inæquale
 aliquid in ipsis subsidere videtur. Demum
 omninò arenosæ minguntur. At in colica, si
 quid ab aluo deiicitur, id flatuosum quo-
 dammodo est, & sæpenuerò aquæ super- 20
 natate consuevit, similem habens bubulo
 stercore consistentiam. Quinetiam colico-
 rum cruciatus multò magis quàm nephriti-
 corum, laxantibus mitigantur clysteribus.
 Atque euenit interdum, vt frigido aliquo
 humore simul eiecto, ilico quiescant, eritq;
 mitigans præsidium, non mitigans tantum,
 sed etiam curatiuum & diagnosticū. Porro
 vt hi frigidum humorem aluo excernente,
 ita

ita nephritici cum vrina lapide exeunte, & à dolore liberantur, & simul locum affectum ostendunt. Itaque nihil relinquitur, nisi vt prouideatur, ne postea tam facile affici possint. Nā vt perseverāte dolore, vtraque pars eisdem indiget præfidiis, ita tempore subsequente oportet diuersa auxilia adhibere. Quapropter nullum, quod ad curationis rationem pertinet, committetis errorem, si in

10 prima protinus horum morborum accessione, eos difficulter discernatis, eò quòd tū neque extrinsecus, neq; intrinsecus, differentibus egent auxiliis, quòd satis sit, ea quæ dolorem lenire possint, adhibere. Cū autem *Intestino-*
omnia intestina à ventriculo ordine quodā *rum ordo.* descendant, atq; omnium supremū ieiunum sit: deinde quod tenuè vocatur postea cæcum, quod vsq; ad infernas partes extēditur: deinde colum, quod ad superiores reuertitur

20 partes, donec sepe numero & lienem, & iecur attingat: satis mirari non possum, quomodo non solum Medici ferè omnes, sed etiam populares, vehementissimos quosque dolores, in quacunque parte euenerint, ad colum referant. Id quod mihi quoque verisimile visum est. Sed quum causam quærerem, cur tam vehemens, tamq; perseverans esset dolor, non simpliciter huic assertioni credere potui. Neque enim similiter, vt in renibus, atque

atque vteris, impacto lapide, ingentes dolores in transitu excitantur, sic & in tenuibus intestinis, rationi consentaneum esse censibus, frigidos spiritus retentos, atq; similes iis *Tenuiorū* humores, dolorem in ipsis efficere. Nam *intestino-* nuum intestinorum tunica, rara tenuiq; *rū dolor.* sentia constant, vt nō ita diu huiusmodi causas continere possint. Ergo probabile est, frigidum, eundemq; crassum, aut viscosum humorem, aut flatuosum spiritum, in corpore 10 crasso densoq; genitū, sed egredi nequeunt, dolorē excitare: vehementem quidem, geminam ob causam, intemperantiam, & corporum quibus cōtinetur retentionem: longum verò, quia difficulter vacuatur. Nam corpora ambientia, tūm ob crassitudinem *Sublimio-* tūm spissitudinem, ipsum arcere possunt. At- *rum inte-* que interdum alij quoque dolores, & quidē *stinorum* vehemētissimi in sublimioribus intestinorū *dolores.* partibus eueniunt, grauiter vomitionibus 20 cruciantes, adeò vt nonnulli sub fine, stercus quoq; euomere conspiciantur, à quo affectu *Vt Diocles* vix vnquàm aliquis potuit sanus euadere. *Chari-* *stius* qui hunc *χάρδαρον* (id est voluulum) vocāt: nonnul- *χάρδαρον* li etiam chordapsum, quum scilicet tumor *intestini* tenuioris morbum, *χάρδαρον* verò plenioris, alij contra eius accidentia ex tertio *ἐπίδ.* licet colligere in historia mulieris, quae *apud Tisaneum* laborabat. Cor. Cels.

aliquis

aliquis eminet, in tenuium intestinorū parte; vt videatur intestinum ad chordæ similitudinem conuolutum. Itaque non ab re visum est Medicis antiquioribus, vel ab inflammatione vel obstructione aridi stercoris, huiusmodi tenuium intestinorū affectus oriri. Suat alia quoque accidentia, quæ quidem haud absurdè, & intestinis, & ventriculo, simul affectis euenire creduntur, vt quas *Αετη-*

10 *τεπιας* (id est læuitates intestinorum) & *κοιλιακας* (id est ventrales dispositiones) no *Cæliaca* minant: quū videlicet materiæ nequaquam *dispositio* sunt mordaces. Nam vt mordaces, ob mordendi vim, omnia intestina ad excretionem excitant: ita non mordaces intestinorū imbecillitatem sequi consueuerunt: quia retinere contenta, nē exiguo quidem tempore possunt. Siquidem illicò excernunt ea, perinde ac si graue aliquod onus deponerent.

20 Haud secus quàm in stranguria contingit. *Strangu-* Nam & in hac modò ob acrimoniā, & vel *ria* licationem, vesica iugiter, quicquid ad eam peruenit, secernit: modò ob id quod molem ipsius vel exiguā, sustinere nequit. Ceterū à quibus causis intestinorum læuitas proueniat, alibi particulatim ostēdimus, præter ea quæ in libris de Curandi via & ratione, de Naturalibus facultatibus, & de Accidentium causis, iam dixeramus. Etenim hunc librum
non

non incœpimus, vt causas quæ morbos efficiunt, sed vt affectorum locorum, qui & tactus & visus iudicium effugiunt, notas perfringeremus. At quia ad exactam horum notitiam, etiam de ipsis dispositionibus interdum aliquid dicere coactus sum, idcirco de causis quoque, quæ ipsas efficiunt, mentionem facere non sum grauatus, Itaq; sermone de intestinorum affectibus finem imponamus. Sunt enim in ipsis affectus quidam cogniti faciles, qui scilicet cum prædictis communes habent notas. Nam abscessuum, inflammationum, scirrhorum, inflationum, erysipelatum indicia, omnibus cognita, quum in ventriculi locis apparent, & affectus ipsius, atque simul affectæ sedis notitiâ ostendunt. Sed de iis iam antea satis dictum est.

Nephriticus dolor.

De renum affectibus.

CAP. III.

Igitur cum derepentè nephritis incidit, lapide notatu digno, vel in renum aliquo, vel in vreteris impacto dolorem excitat, colico haud ab similem. Verum dignitudo, stinguitur ab eo, ex nausæ tum multitudi-
colicum ne, tum magnitudine. Suntque per vomitum reiecta & biliosa, & pituitosa, quibus præassumpti quoq; cibi aliquid admixtum videtur: sæpenuerò etiam ex loco, quum superiores coli partes afficiuntur. Atque ex

eo interdum, quòd non vni loco dolor in-
 nititur, sed reuoluitur, & ad plurimas exten-
 ditur partes. præterea quòd ne flatus qui-
 dem transmittitur. Atque omnia hæc coli-
 cis duntaxat euenire solent, sed alia qui-
 dem magis, alia verò minus. Quum verò
 ex his quæ in vrinis resident, aut lapide cum
 vrina excreto, planè discerni possunt nullus
 relinquitur quæstioni locus. Sunt non pau-
 10 ci laborantium, qui dolorem modicum in
 profundo lumborum infestantem sentiunt,
 quamuis ab initio nondum sabulosum quip-
 piam manifestè excernatur. Quibus (vt sci-
 tis) dato medicamento, quod lapidem in re-
 nibus contereere posset, simul & affectum
 ipsum, & sedem affectam cognouimus, atq;
 ipsum habuimus curationis principiū. Quū
 enim à medicamenti potione, in vrinis sabu-
 losa quædam subsidere conspicerem, nephri-
 20 ticum affectum esse cognoui: atq; deinceps
 eadem medicamenta exhibendo, reliquam
 perfecì curationem. Quumq; renem quem
 30 piam ita affectum esse cognoueris, si dolo-
 res cum horrore interpolato, varioque infe-
 stare videantur, sequaturq; febres quædam
 inordinatæ, tum prouum in ventrem de-
 cumbere, atq; interdum in alterum latus, vt
 sublimis sit affectæ partis positus, laboran-
 tem sese vertere iube, ac deinde interroga,
 num

*Renum
 abscessus
 indicia.*

num circa renem dolentem veluti suspensi cuiusdam ponderis sensum percipiat. etenim quum hæc ei acciderint, abscessum iam collectum conicere oportet: quo cōcocto: pus miſtum, vt laborantem à dolore liberat, ita vlceris in rene periculum affert. proinde exacto studio laborandum est, vt inducatur cicatrice, quod nisi illicò contigerit difficilior rem reddet curationem. porrò perseuerantis

Vlceris per vlceris notæ, ex vrina haud obscurè depre- 10
seuerantis henduntur. adde quòd laborans creberrimè
in renibus in affecto rene dolorem sentit, atque inter-
notæ. dum cum vrina exiguum pus, veluti ab vl-
 cere excernitur. Similiter ramentem nonnū-

quàm cum vrina expelli videtur. Ac interim sanguis quoque, qui erosi iam vlceris indicium est. Quanquàm rupto aliquādo vase, 20
Lib. 4. A. aut ob plenitudinem, aut casum, aut vehem-
pho. 76. entum ictum, nōnulli magnam sanguinis copiam meiendo profuderūt. Id quod aperto interdum venæ alicuius ore, fieri videre est. Sed efficacissima vlceratorum renum coniectura est, si cum vrina exigue quædam

Caruncu- carunculæ excernantur, vtpotè quas renum
le in vri- essentia partes, easque ob vehementem vl-
na. ceris erosionem auulsas esse constat. Ea ve-

Pilis simi rō quæ pilis similia sunt, Hippocrates quolia quædam
in vrinis. que cum vrinis excerni vidit, quemadmodum in Aphorismis scripsit: ac ipsi etiam
vidi

vidimus aliquādo, quæ semipedis, longitu-
 dinem æquarent, interdum etiā iis longio-
 ra. Quæ nōnunquam adeò videbantur exi-
 gua, vt mirarer quomodo in renum spacio
 talia possent cōsistere: proinde probabilius
 mihi videbatur in venis huiusmodi res pro-
 creari. Quemadmodū in quodam Ara-
 biæ loco (vt aiunt) in tibiis hominum dra-
 cunculi vocati nascuntur: neruosa naturâ,
 colore, crassitudineq; lumbricis similes. Igi-
 10 tur quum multos audiuerim qui sese vidisse
 eos dicerent, ipse Verò nunquā viderim:
 idcirco neq; de ortu, neque de essentia ipso-
 rum quicquam exactè conicere possum. In India
 At vbi pilos meiando excretos vidi, tūm
 ex colore, tūm ex mole, credidi dicenti-
 bus eos ex crassā, lentaq; materia, quam ca-
 lor calfecit exiccavitq;, in venis consistere.
 quanquā longitudinis ipsorum causam
 20 non intelligo. Verū quum primū eos
 vidissem, curationem à medicamentis quæ
 vrinam ciere possent, tentavi: quam post-
 eā experientia comprobauit. Omnes verò
 quotquot huiusmodi affectu laborare con-
 sueuerunt, neque ante ipsum, neque rursus
 post ipsum nephritico aliquo accidente fue-
 runt molestati. etenim curati fuerunt me-
 dicamentis quæ ciere vrinam possunt. Ve-
 rū etiam si alia quæpiam humorū vitia,

Y

à venis per urinā expurgentur, quemadmo-
Puris ex- dum si puris quoque multa fiat per viinas
cretio per excretio, nihil ab iis vel renes, vel vesicam,
urin. 15. vel vteras, molestari cognouimus. Cæ-
 terum in hac re non parum cum intestinis
 conuenire videntur, quæ in hepaticis dispo-
 sitionibus nihil læduntur, licet à bile syn-
 cera lædantur, veluti vesica quoque, vbi
 longo tempore acres per ipsam urinæ tranf-
 eunt, vlceribus affici solet. Est etiam alius **10**
Renūim- renum affectus, quo tenuis sanies sangui-
becillitas. nis mingitur, similis excrementis quæ in he-
 paticorum affectuum initio excernuntur, ni-
 si quod magis videtur cruenta. cuius rei cau-
 sa est dispositio haud ab similis ei qualem in
 iecore diximus imbecillitatem esse: Insuper
 quum ora, aut meatus (vtcunque nomina-
 re volueris) per quos ex concaua vena in re-
 nes vrina percolatur, supra modum dilatan-
 tur. Atque ad renes quoque pertinere is vi- **20**
Hydrops detur affectus, quem alii hydropem matel-
matelle. læ, alii urinæ profluuium, alii diabetem, alij
Vrinae pro dipsacon appellant: qui certè quàm rarissimè
fluuium. venire solet. E quidem eum antehac bis dū-
Diabetes. taxat videre potui, supra modum videlicet
Dipsacos. sitientibus infirmis, atque subinde bibenti-
 bus: quapropter exhuberāter quoq; reddūt
 id quod biberunt, eo à sua qualitate nō mu-
 tato. Atque hic renum, vesicæq; affectus si-
 mi

milis est ventriculi intestinorumque laxita-
 ri. Sed de intestinorum laxitate, alibi sepa-
 ratim iam dictum est: vbi ostendimus non
 ventriculum duntaxat, sed vniversa quoque
 intestina ad excretionem, tum ciborum, tū
 potuum assumptorum, celeriter excitari,
 adeò quòd ne pauxillo quidem tempore, ci-
 tra molestiā, ferre possint, ipforum aut pon-
 dus aut qualitatem. At quòd affatim, celeri-
 10 terque ad vesicā vrina defertur, id neque ad
 vētriculi, neq; intestini ieiuni, neque tenuis,
 imbecillitatem tanquā causam referendū
 est. Si enim ob id quòd potum sustinere nō
 possunt, ad excretionem properant, quid
 obstat quò minus per sedem excernatur? id
 quod in laxitatibus intestinorum fieri pla-
 nè videtur. Neque enim cibus duntaxat tam
 celeriter per tam longam intestinorum cō-
 uolutionem transiens delicitur, verum etiā
 20 ea quæ epota fuere. Porro transmissionem *Diadosis*
 à totius ventris partibus, ad hepar didicimus, *à vêtre ad*
 neque per hepatis, aut venarum in lactibus, *hepar.*
 aut ventre quomodò neque per earum quæ
 ab hepate exortæ ad renes tendunt, imbe-
 cillitatem, fieri. Quippe in libris de Natu-
 ralibus facultatibus, iā ostēsum est iecur ex
 ventriculo per mesenterii venas, veluti arbo-
 res à terra per radices, cibum ad sese allicere
 sic etiam renes id quod aquosum in san-

Vesica nō guine est. Verūm vesicam nō trahere à re-
trahit à nibus, quemadmodū neq; intestina a ven-
renibus. triculo, sed renes quidem per vieteras excer-
Intestina nendo in vesicam mittere, ventriculum au-
nō trahūt tem in ieiunū, per eam partem quam Ero-
succum à philus dodecadactylon vocat, à duodecim
ventricu- digitorū longitudine nomen ei imponens.
lo. Itaque renum potius imbecillitas accusanda
Dodecada est, utpote qui cōtinere diutius vrinam non
ctylos. valent, non verò aliarum partium, per quas 10
 potus transire solet. Sed rursus reprehen-
 dendo dicet quispiam, quum infirmi fue-
Quomodo rint renes, quomodo fieri potest, ut tam ce-
renes tam leriter vrinā ad se attrahant? an dicere pos-
celeriter sumus, quemadmodū in ventriculo qui-
vrinā ad busdam lientericis vehementissima excita-
se attra- tur ciborum cupiditas: ita in renibus quo-
hant. que cupiditatem simul oriri [vehementem]
Appetētia atque hanc ob causam eos vrinam per con-
canina. cauam venam ad sese trahere, sed illicò ab 20
Seleucides attractionis impetu grauari? Etenim quem-
anicula. admodū in his qui canina vocata appeten-
 tia vexantur, videmus ut assatim impleti
 paulò pōst aut euomant, aut fluore deii-
 ciant: id quod nō solūm iis qui præter natu-
 ram se habent, accidere solet, verūm etiam
 animalibus quibusdam integrā valetudine
 degentibus, ut in auiculis quas nostrates in
 Asia seleucidas vocant, videre est: quippe
 quæ

quæ iugiter locustas edunt, easque celeriter
 excernunt. Ac in aliis quoque animantibus
 huiusmodi accidens naturale videtur. Vt
 igitur canina cupiditas in ore ventriculi
 consistens, non potente ipso deuoratorum
 pondus sustinere, multa impetuosè ingere-
 re, atque ea celeriter excernere cogit: Ita in serosæ hu-
 renibus quoque accidit serosæ humiditatis
 cupiditas, vnà cum virium imbecillitate, vn-
 10 de & humiditatem affatim attrahere, ac eam
 deinde in vesicam impellere coguntur. Sed
 quæres fortasse, quamobrem urinæ fluor su-
 bitò euenire potest, læuitas intestinorum
 non potest: veluti neque canina cupiditas,
 sed plurium dierum numero opus est. Nam
 affectus initium ab incremento, incien-
 tum à vigore distinguitur. Quoniam ven-
 triculi cupiditas, qua cibum potumque ap-
 petit, animale officium est, quo citra sensum
 10 nostrum nequaquam fungitur. Renum ve-
 rò desiderium naturale est, neque ab ipso
 sensus nostri afficiuntur. Proinde quum ad
 statum peruenit, ne sensum quidem mouet,
 quemadmodum appetentia canina. Qua de
 rerationi consentaneum videtur, vt quum
 inceperit, paulatim increseat. In primis enim
 trahit sanguinis serum ex venis: vel nihil no-
 bis sentientibus, quem quum totum attra-
 xerit, videaturque sanguis in venis, huius-

serosæ hu-
 miditatis
 cupiditas
 nimia in
 renibus.

Renum desi-
 derium na-
 turale.

Quare v-
 rinæ fluor
 subito eue-
 nit in re-
 nibus.

modi humiditate spoliatus, exiccata tum va-
sa humorem trahunt ex hepate, deinde hoc
ex intestinis & ventriculo. Quum itaque
exiccata fuerint venæ, quæ in ore ventricu-
li sunt, potum desiderat homo, utpote di-
spositionem ipsam tum primum sentiens,
deinde exhibitam potionem venæ ex hepa-
te ad ventriculum venientes, utpote aridæ,
totam rapiunt, atque ex his aliæ deinceps,
donec ad renes perveniat transumptio. quip- 10
pe in libris de Naturalibus facultatibus, di-
ctum est, non solum potionem, verum etiam
cibum transumptione per attractionem fa-
cta, per uniuersum corpus deferri. Igitur
hic affectus quod ad transitus celeritatem
pertinet, per similes est intestinorum læuita-

Renū di-
spositio
quid dif-
ferat ab
intestino-
rū & ven-
triculi di-
spositio-
ne.
Diabete
ad vētri-
culum nō
pertinet.

ti: atque etiam quod renum dispositio ven-
triculi dispositioni eadem sit. Verum hoc
vno inter se differunt, quod quæ ante re-
nes fit lationis actio, in naturalibus nume- 20
retur, attractoria facultate successione agen-
te. atque hac ratione inter sese non nihil dif-
ferunt, quāvis in vna re similitudo inuenia-
tur. quippe ex concaua vena ad renes attra-
ctio, primæ degutitioni eorum quæ ex ore
in ventriculum deferuntur, haud ab similes est.
At verò actiones quæ hanc antecedunt, ad
vrinæ fluorem propriè pertinent. Non re-
ctè autem putasse quosdam, diabetem ve-
luti

luti caninam cupiditatem, ad ventriculum
 pertinere, hinc manifestum est. Nam qui præ
 nimia siti ventriculum impleuerunt, serua-
 re potionem longo tempore possunt. Sed
 vehementi siti laborantes quatuor acciden- *Siti velie-*
 tium periculum à potione subire solent: *mentis la-*
 Vnum, & quidem primum, vomitio est: *borantes*
 alterum, velox per aluum excretio, aut *quatuor*
 fluore, aut intestinorum laxitate: tertium, *accidētis*
 10 quod potus diutius quam par est in ventri- *pericula*
 culo manet: quartum id ipsum, de quo *subeunt.*
 nunc sermo est, siue id diabetem, siue dipsa-
 con, siue vrinæ fluorem nominare volue-
 ris. Neque enim vt idoneum ei nomen im-
 ponamus, sed vt curationis viam tum ex lo-
 co affecto, tū ex ipsa dispositione inuenia-
 mus, scrutari animus est. Atque alius inter. *Ciborum*
 dum affectus occurrit diabete perquam si- *dissipatio.*
 milis, & quidem à multis cibis, qui neque
 20 crudi sunt, neque per aluum deiciuntur,
 neque plenitudinem efficiunt, neque etiam
 probè alere possunt, sed dissipantur, discu-
 tiunturq;. Cuius vt crebrior est, quàm dipsa-
 ci euētus, ita faciliorem admittit curationē.
 quippe si prius quàm ad summum peruene-
 rit, ipsum cognoueris, haud ita difficulter cu-
 rabitur. Nam vbi quis duplum consuetorū
 alimentorum assumpserit, neque corpus ali-
 videatur, idque citra alui fluorem, hunc af-

fectum non solum priuati, verum etiam me-
dici paruipendunt. Quum verò triplum in-
gerit, idoneis auxiliis liberari potest, prius-
quàm scilicet ad quadruplum aut quintu-
plum perueniat. Igitur rationi cōsentaneum
est, hunc affectum à celeri dissipatione inci-
pere, omnibus partibus attractricem, atque
ei coniugatam facultatem, quæ propriè ap-
petentia vocatur, seruantibus. At verò in-
gentis sitis quæ citra diabetem accidit, causa
est ventriculus, aut calida, aut sicca, aut vtra-
que intemperie affectus, maximè verò os
ipsius. Proximè ventriculo hepar, sed maxi-
mè pars eius sima: simul eis exæstuantibus, ni-
mirum mesenterio, ieiuno, ipso ventre, sto-
macho, & pulmone. Atque huius accidentis
radix inde plerunque proficiscitur, quòd à
dispositione erysipelatis naturam referente
incenduntur. Quæ magna ex parte marcor
sequitur, aliàs alius, veluti quum hanc tra-
ctaremus materiam, declaratum est. Hæc
itaq; propter accidentium communicatio-
nem simul cum renū affectibus dicta sunt.
Porrò diabetes proprius renum affectus est,
qui caninæ in ore ventriculi cupiditati pro-
portione respondet, accedente præterea re-
tetricis facultatis imbecillitate. Nam si citra
vehementem cupiditatem ipsum fieri dice-
remus, in primis nihil penè vrinæ ad renes
perue

*Appeten-
tia.*

*Ingēs sitis
citra dia-
betem.*

*Gal. lib.
de mar-
core.*

*Diabetes
proprius
renum af-
fectus.*

peruenire notaretur: si verò citra retentricis facultatis imbecillitatem, non tanta celeritate sequeretur vrinæ profluuium.

De vesicæ affectibus.

CAP. IIIL.

VESICÆ superueniunt accidentia partim cæteris communia, veluti omnes ipsius præter naturam tumores, dolores, atque quæ hos facere possunt affectiones, partim ipsi soli propria, vt ischuria (id est vrinæ retentio) *Ischuria.* stranguria (id est vrinæ stillicidium) ac alio quoque modo immoderata *Stranguria.* vrinæ excretio, verum huiusmodi vacuationes (vt de renibus supra dictum est) vesicâ tanquàm meatu vtantur, ipsa haud quaquàm affecta. At verò stillicidiū, si ob vrinæ acrimoniam fit, accidens vesicæ est, affectus vero minimè. Si verò aut ab vlcere, aut imbecillitate procedit, à vesicæ affectu factum *Stillicidium vrinae vnde* esse dicitur. Quemadmodum vbi acrimonia in causa est, aliquādo ob renum vitium, aliquando ob alias partes, quæ cum vrinis, humorum suorum vitia, aut pus, vbi abscessus aliquem infestauerit, transmittere possunt. Euenit etiam interdum vrinæ stillicidium, humoribus qui in venis sunt, & *Propria vesicæ actio, vrinae excretio.* per renes, & per vesicam expurgatis. Cæterum quum ab intemperie vesica sit imbecillior, læditur propria ipsius actio, quæ est *actio.*

Y 5

vrinæ excretio: ad quam animal excitari so-
let, quum vel à multitudine contentæ in ipsa
materiæ vesica grauat, vel à mordacitate
conuellitur: sed ab horum utrolibet magis
imbēcilli quàm robusti dolere cōsueuerūt.
Quinetiam instrumentales affectus imbecil-
litate interdum inducere possunt. Item in-
temperantiæ omnes cum aliæ, tum maximè
illæ, quæ nonnullis sæpe eueniunt, quum
frigore corripuntur: tunc enim planè gra- 10
uari videtur, vel paucò admodum conten-

Retentio to in ipsa humore. Atque vesicæ etiam velu-
vrinæ vn ti meiendi instrumento ischuriæ accidēs su-
de fiat. peruenire solet. Interdū quidem (vt dictum
est) quum id quod in ipsa continetur, non
ita comprehendere valet, vt ipsum exprimat:
Interdum etiam obstructo inferiori mea-
tu, aut à crassis humoribus, aut impacto
lapide. Atque accidit nonnunquam, vel ab
inflammatione, vel alio huiusmodi tumo- 20
re, vt angustior reddatur meatus, vel etiam
omnino obstruatur. At verò neque neruo-
rum à spinali medulla exortorum, neque
etiam spinæ ipsius affectus, vesicæ tantam
imbecillitatē afferre possunt, vt vrina pro-

Vesica nō ptereà supprimatur, quemadmodum nōnul-
habet mo li putauerunt, credentes vesicæ officium à
tum volū- cōsilio & electione procedere, quòd scilicet
tarium. vrinam retinemus quoad voluerimus, atq;
cam

eam pro voluntatis imperio excernimus. Verum satius fuisset nos sic non vesicæ sed mendi officium, veluti etiam deiiciendi, non intestinorum munus ab electione consilioque pendere. Quippe vesicæ officiū vnicum *Vesicæ officiū, contractio.* est, contractio. At musculus qui urinae meatum in circuitu ambit, in origine cervicis vesicæ extensus, instrumentum est, cuius opus ab electione excitatur, utpote qui ambiens *10* vesicæ cervicem, eam ita exactè stringit, ut nihil humoris ex vesica in meatum ingredi possit. Atque similem quoque & actionem *Musculi ani actio.* & utilitatem habet musculus, qui recti intestini partem extremam ambit. Proinde ipsis resolutis, neque urinam vesica, neque sterora alius retinere potest: sed præter voluntatem paucis omnino intervallis utraque excernuntur. Itaque veluti in reliquis musculis, quod à resolutione sit nobis inuitis, id electio nostra haud inuita efficere solet: ita eadem ratione ab horum actione quiescimus, quum vel sterco, vel urinam excernere propositum est. Atque ut nonnulli cum urinarum, tum cibi excrementorum deiectione, totam ab electione procedere existimantes erraverunt: ita rursus alii his è diverso, totum hoc opus naturale putantes, à veritate deviarunt. Etenim cibi à vetriculo in ieiunum expressio, tota, naturæ opus est. Rursus omni-

no ab electione pendet & vtrorumque membrorum, & cuiuslibet digiti tum extensio, tum
Delatio à inflexio. delatio enim quæ à ventriculo ad
 ventriculo ieiunum fit, & quæ ab hoc in tenue intesti-
 ad intestinum, à sola naturali facultate procedit. At
 na, à natu alui deiectio, & vrinae redditio vtroque in-
 rali facul strumento, propriis suis facultatibus agen-
 rate fit. te, perficiuntur. Rectum intestinū, atque ve-
 fica naturali vtuntur facultate, musculi verò
 ea quæ & animalis, & voluntaria nomina- 10
 tur. Quippe musculi qui fluores cohibere so-
 lent, tunc quiescunt ab opere, ab dominis mu-
 sculis munere suo fungentibus, maximè ve-
 rò mediis. Sunt nonnulli qui quum non ita
 facile deicere possunt, manibus huiusmo-
 di musculos comprimunt, neq; non vbi vri-
 na ita suppressa est, vt omnino retineatur,
 idem facere consueuerunt. Quū itaque ner-
 ui, per quos animalis facultas ad iam dictos
 musculos peruenit, afficiuntur, aut vbi spi- 20
 na ipsa læsa est, resoluitur musculorum actio,
 atque excernitur & vrina & stercus, vel in-
 uito laborante. Quum verò vesicæ corpus
 stercoris et ita fuerit affectum, vt quod in ea contine-
 vrina e- tur, exprimere non possit, supprimitur vri-
 missio, à re na, nominaturque hoc accidens ipsius, ischu-
 solutis ner ria. Atque accidit interdū propter obtusum
 415. ipsius sensum, vt non reddatur vrina, citra ta-
 men expultricis facultatis læsionem, si pro-
 prij

prii vesicæ nerui afficiantur, neruis musculi
 ceruicem eius stringentis, munere suo fun-
 gentibus, ipsorum scilicet facultate seruata.
 Nam si resoluantur, propriū indicium, quod
 musculus hic resolutus sit, est vrinæ præter
 voluntatē excretio. At huiusmodi euenien-
 te affectu, quum meatus ipsius fuerit obstru-
 ctus, vtraq; dispositio cognitu difficilis erit.
 Proinde vt exquisitè dignoscantur, nō so-
 lum ij, sed reliqui quoq; omnes vesicæ affe-
 ctus, per quā necessarium est præscire eui-
 dentes causas extrinsecus aduenientes, quas
 propriè procatarcticas (id est initiatrices) Procatar-
 Medici vocāt. Sed multò etiam accuratiori *ctica cau-*
 inuestigatione, eos qui præcesserunt in ani- *sa.*
 mantis corpore affectus, inquirere oportet. Spina ex
 Igitur cuidam, quum cecidisset, spina sinua- *casu cui-*
 ta est, quapropter vrinam reddere non po- *dā sinua-*
 tuit. Nam & id aliquando fieri solet, quem- *ta, vesicæ*
 20 admodum ab Hippocrate dictū est. Verū inflamm- *tionis cau-*
 non illicò suppressa fuit vrina, sed perendie, *sa fuit.*
 ob afflictarum vertebrarum ab interna lu- *Luxatæ*
 xationem, inflammata vesica. Itaque dole- *exterius*
 bat in ea parte vel nemine tāgente, sed mul- *vertebræ*
 tō magis, si quis manu eum tangeret. Atque *strangu-*
 hunc curauimus inflammationi remedia adhi- *riam cui-*
 bentes. Rursus alter luxatis ad externas par- *dam indu-*
 tes vertebris, vrinam inuitus profudit, nullo *xerunt.*
 infestante vesicā dolore. in hoc coniecimus *eius*

eius musculi neruum qui vesicam claudit, fuisse affectum, proinde spinam curare voluimus. Atque in alio similiter affecto, suppressa fuit vrina, torpente ob affectos nervos vesicæ sensu, quam itaque inter dormiendum non sentiret homo vesicam impleri, ipsa extensa nihil excernere potuit: et enim accidit interdum, ut hoc modo vrina supprimatur. Quemadmodum etiam sanis quibusdam, aut urgentibus negotiis, vel in concionibus, vel senatu, vel foro, vel conuiuio, tum enim retenta longo tempore vrina, extenditur vesica, atque vrina supprimitur, contractrice facultate læsa propter immoderatam tensionem. Quidam etiam quum cecidisset, manente spina illæsa, in primis quidem magnam sanguinis copiam cum vrina emisit, postea verò omnino suppressa est vrina, cuius rei causam esse coniecimus, quòd cœcreti sanguinis grumus intus se opposuit, quocirca demissa per colem fistula, paulum vrinæ reddidit, extracta deinde fistula, apparuit in ipsius ore grumi indicium. Prætereà quum alios quosdam diuturni dolores vnà cum abscessuum notis infestassent, finitis abscessibus, tenuè pus cum vrina profluerè visum est, deinde subsequens vrinæ retentio coniecturæ occasionem dedit, quòd à crasso pure meatus obstrueretur. Atque in puer

Cuidam ex casu suppressa vrina.

Meatus vrinarius à crasso pure obstructus. Lapis in vesica vrinā supprimit.

pueris etiam quos lapis in vesica cruciabat,
 vidimus sæpenu-merò vrinam retineri. Eos
 itaque resupino figurato corpore concussi-
 mus, vt ita à meatu lapis dimoueretur. Quñ
 verò id quod iam iam dicam, sæpe videritis,
 oro vt ipsum tenaci semper memoria serue-
 tis. Quòd ad grumos vocatos, non solù eos *Grumi in*
 qui in vesica, sed multò magis illos quoque *vesica ex*
 qui in intestinis, ventriculo, atque thorace *alijs inter*
 10 nonnunquam continentur, animi defectio, *nis parti-*
 & pallor sequi solet, pulsus verò paruus, ob- *bus nota.*
 scurus, frequens apparet, & laborans ipse cū
 anxietate resoluitur, quemadmodum in
 magnis musculorum vulneribus sæpenu-
 merò accidit, vt mirari aliquis possit, quæ-
 nam sit huius euentus causa. quippe quum
 omnium quæ in corpore sunt, sanguis maxi-
 mè nobis sit familiaris, quomodò ex vasis
 suis effusus, tanti mali autorem se præstet,
 20 vt & putredo partium, & marcor ipsum se-
 qui possit. Etenim vidimus, vbi vesicæ mea-
 tum grumus obstruxerat, eadem sequi acci-
 dentia: grumum verò adesse cōiecimus hoc
 argumento, quòd plurimùm antea cruorē
 laborātes cum vrina reddidissent. Itaq; me-
 dicamentum quod lapidem terere possit ex
 oxymelite, atque ipsum quoque oxymeli
 per se in potu dedimus. At nihilominus alijs
 quidem perierunt, vno quodam seruatō,
 60

solutis grumis, quos paulò pòst cum vrina excreuit. Quoniam verò non satis est ad affectæ sedis inuentionem ea duntaxat accidentia, quæ in præsentia infestant, intueri: sed & ex his quæ præcesserunt, subinde definimus, facillè intelligetis, si eorum quæ antea vidistis, memineritis. Igitur quum multi creberrimè pùs cum vrina emitterent, præteritorum accidentium memoria, & sedem affectam nobis ostēdit, & dispositionem in ipso cōsistentem declarauit. Quidam enim quum priùs in regione renum sæpenumerò doleret, accedente inordinato horrore & exigua cōcussione, febre correptus est. Alius circa vesicæ positum simul cum horrore ac febre dolores præsensit. Nonnulli circa septum trāsuersum, & thoracem. Atque alij in dextra præcordiorum parte. Coniecturam itaque fecimus, in iis omnibus, quòd pus per renes expurgaretur, vomica scilicet in loco dolente erupta. Cum indiciis autem suprà propositis nonnihil confert puris quantitatem, & quomodò totum cum vrinis misceatur, vtrum confusum, an contrà, considerare. veluti iam antea de intestinis dictum est. Nam vt in his, si à superiori- bus intestinis quidpià defertur, id ciborum excrementis perinde admixtum videtur, ac si cum ipsis subactum fuisset. Si verò ab humilio

Vomica in vesica, se-
pto, aut
alijs par-
tibus eru-
pentis si-
gna.

milioribus, cum vna ipsorum parte excerni-
 tur. Simili modo vrina, aut tota à pure cum *Suppura-*
 ipsa emisso cōturbatur, aut per partes quas- *tio in vesi-*
 dam dispersum pus inæqualiter defertur. Plæ ca, ex pure
 runque etiam solùm pus sine vrina excerni- *excreto p-*
 tur: idq; haud obscure in vesica suppuratio- *vrinas.*
 nem consistere indicat. Quod verò exactè
 commixtum est, à supernis alicūde partibus
 venit. Sed quod mediam inter hæc condi-
 tionem seruauerit, id à renibus descendisse
 certum est: similiter si erupta vomica, cū af-
 fecti loci indiciis, vlceris quoq; signum ali-
 quod appareat. Nam & hoc aliquando qui-
 dem exactè commixtum videtur, aliquādo
 verò mediocriter, interdum vel nullam ha-
 bet mixtionem, vel quodammodo superfer-
 tur, vel solùm excernitur. Atque vocatum *Ramentū*
 quidem ramentū, vlceris: essentia verò pro- *excretum.*
 prietas, affectæ partis proprium indiciū est. *Lama.*
 20 quippe partes à vesica auulsæ, lamis: à renibus *Caruncu-*
 verò, carūculis sunt similes. Ita etiam vbi ex *la.*
 sublimioribus pars aliqua affecta est, excre- *Viscera*
 menta, cum vrinis eiecta intueri, & ea suspe- *interiora*
 ctarum partium essentia comparare oportet. *quomodo*
 Igitur cum vrina expurgantur gibbae *per aluum*
 hepatis partes, atq; omnes quotquot sunt his *& vrinas*
 superiores: per aluum verò pars iecinoris re- *expurgen-*
 fina, intestina, ventriculus, lienis. Præter *tur.*
 has, alia quædam sunt purgationes, sed

Z

rarò, vt cùm thorax & pulmo per aluum pur-
 gatur: quæ infra septum transuersum positæ
 sunt partes, per vrinas. Quorû causam cùm
 nonnulli ignorent, neque id vnquam acci-
 disse viderint, quod à multis visum est, ne-
 gant fieri posse, quòd abscessu interim in
 pulmone orto pus expurgari per renes pos-
 Vide libr. fit. Nos verò pulmonis vomica per vrinam
 3. Epid. thoracis autem per intestina & aluum, expur-
 gari vidimus. Quamquàm in primis ex pul- 10
 monibus feri mone per renes transitus, nullam reuerà du-
 bit purga- bitationem excitare debet. Etenim vt à con-
 tos vasis caua vena, ita ex magna quoque arteria ra-
 per aluum mi descendunt ad renes. Hæc quæstio tamen
 scilicet & Erasistrati sectatores nō parum vrget, quip-
 vrinas. pe qui putauit solum spiritum in arteriis con-
 Lib. 7. tineri. Nobis verò nihil difficultatis affert,
 aph. 30. vtpote intelligentibus, quòd laevis arteria
 pulmonis, quantum puris ex erupta vomica
 suscipit, id in sinistram cordis sinum deferre 20
 potest, quod inde in magnam ipsius arte-
 riam incidens, per renes transit in vesicam.
 Hoc tamen non ita crebrò euenire videtur,
 vtpote pure prius in asperas arterias magna
 ex parte transumpto. Itaque quam ob cau-
 sam pus in pulmone genitum, cum vrinis
 (licet rarò) excernatur, iam dictum est. Id
 verò quod per ventrem expellitur, aliam
 & quidem raram (quæ in corporum disie-
 ctione

tionem apparet) habet causam, quippe conca-
ua vena, mediante vase quodam stelechiæ
(id venæ quæ arboris caudici proportionem
respondet) videtur interdum adaptari. Proin- *Pus ex*
de nihil mirum, neque impossibile est, & ex *partibus*
partibus septo transuerso superioribus, *pus in septo supe-*
ventrem defluere, & ex his quæ eidem *rioribus*
ponuntur, ipsum per renes in vesicam perue- *in vètrè*
nire. Nam corporum raros habitus, par est *defluens.*
10 vt rara etiam accidentia sequantur.

De vteri affectibus..

CAP. V.

ATq; ne hoc quidè loco sollicitos esse *Valua.*
oportet, vtrum vuluam, an vterum ap *Vterus.*
pellemus, eam partem quæ mulieribus ad pa-
riendum à natura data est. Neq; rursus vtrū
numero plurali vuluas, aut vteros, an singu-
lari vuluam aut vterum quis nominauerit.
20 Etenim satius fuerit in rebus vtilibus tempus
collocare, ex quibus vel ad notitiā, vel præ-
sagia, vel curationem, fructū aliquem decer-
pere possimus. Veluti in eo affectu quē nō-
nulli vteri suffocationem, alij spirationis ob *Vteri suf-*
vterum ablationem vocant, volētibus me- *focatio.*
dicis vtræque appellatione vnum quendam
affectū explicare. Ego verò multas vidi mu *Hystericae*
lieres hystericas, id est ab vtero suffocatas, *mulieres.*
nam priores fœminæ artē medicā professæ,

à quibus nomen ipsum audiri potuit, ita se-
 ipsas nominare solebant. Alias quidem sine
 sensu immobiles iacere, cum obscuro par-
 uoq; pulsu, vel omnino sine ullo pulsu: A-
 lias sentientes quidem, & moueri potentes,
 atque integra ratione, sed tamen animi defe-
 ctione, & difficili spiratione laborantes: Alias
 etiam crura & brachia contrahentes. Ex qui-
 bus coniecturam feci, multas esse utri affe-
 ctuum differentias, vel pro causae efficientis
 magnitudine, vel pro specierum quarundam
 varietate inter se differentes. Igitur prima
 species, cuius Heraclides Ponticus in suo com-
 mentario mentionem fecit, multam exhibet
 de ortu suo ambiguitatem. Ait enim sub
 hac specie neque pulsum, neque spirationem
 mulieris deprehendi posse. Atque ob id dun-
 taxat non videri mortuam, quod exiguum
 in mediis corporis partibus calorem habe-
 ret. Est autem libri titulus Apnus (id est per-
 dita spiratio) Heraclidis. Ac astantes quo-
 que medicos quæsiuisse ait, an nondum sit
 mortua? Rursus nonnulli Heraclidæ poste-
 riores credentes seruari aliquid spirationis,
 quamuis ipsa non appareat, carptæ lanæ
 flocculos coram naribus suspendi iubent, ut
 exactè deprehendatur, num spiritus aliquis
 inter spirandum tum intro, tum foras rur-
 sum deferatur. Sunt qui poculum aquæ
 ple

Species v-
 tri suffo-
 cationum
 plures.

Apnus He-
 raclidis.

plenum ori ventriculi imponere præcipiūt,
 quippe immotum omnino seruari humore
 aiunt, si tota perierit spiratio. Itaq; si omnes
 ita affectæ mulieres interissent, simplex ef-
 set quæstio. quum verò nonnullæ seruatae
 videantur, geminam oriri quæstionem ne-
 cesse est, inuestigantibus nobis, tum disposi-
 tionem ob quam spirationis munus deperdi-
 tur, tū vel magis, quomodo viuere possint,
 10 quæ nihil omnino spirant. Quippe in con- spiratio à
 fessio est, & spirationem à vita, & vitā à spira vita sepa-
 ratione separari non posse: adeò vt viuentem rari nō po-
 non spirare, & spirantem non viuere, sit im- test.
 possibile. Atque hæc quæstio, quanquam su-
 periore difficilior videtur, non est tamen
 perinde difficilis. quippe facile sustinebitur,
 si latebris inclusa animalia consideres, nulla
 apparēte in ipsis spirationis nota. Hoc enim
 cognito, perspectisque animalibus, vtpote
 20 frigidis atque eo demonstrato, quòd ma- Respira-
 ximus respirationis vsus est, vt intimus calor tiōis vsus.
 & refrigeratione & ventilatione seruetur,
 haud ita difficile fuerit perpendere, exiguū
 illum calorem in ipsis derelictum, arteria-
 rum cordisque officio conseruari, quæ actio
 à quibusdam medicis transpiratio: velu- Transpira-
 ti ea quæ à thoracis pulmonisque officio tio.
 prodit, respiratio vocatur. Itaque in vteri Respira-
 suffocatione quoniā vniuersum corpus re- tio.

frigeratur (id enim manifestè videtur) fieri potest, vt nulla prodeat ab ore spiratio, quãuis ea quæ in arteriis sit, nequaquam interceptiatur. Verùm adeò potest esse exigua, vt sensum omninò effugiat. Ergo vt nihil ad hunc affectum pertinens maneat indiscussum, succedit iterum alia quæstio. Quam ob causam corpus refrigeretur? Ea verò haud difficulter dissolui poterit, si causas quæ præcesserunt diligenter intueamur. Sunt ¹⁰

Vidua mulieres veteri suffocationibus laborantes, per corpus refrigerantur. autem huiusmodi: Conuenit inter omnes medicos hunc affectum magna ex parte viduis euenire, iisque maximè, quæ antea profectè purgarentur, ac parerent, atque virorum concubitu gauderent. Quibus rebus omnibus priuata, quid probabilius excogitari quis posset, quàm quòd ob retenta menstrua, vel semen cohibitum, huiusmodi mulieres vteri dispositionibus crucientur? siue eas apnceas (id est, non spirationes) siue suffoca- ²⁰

A semine retento quæ accidentia etiam viris euenire soleant. tiones quis vocauerit, siue etiam contractiones quædam contigerint. Idquæ fortasse magis à semine retento accidere potest, vtpotè magnam vim obtinente. vt est enim in mulieribus humidius, ita etiam frigidius: proinde ipsum excerni oportet, præsertim si naturaliter multo semine exuberat mulier. Id verò viris quoque euenire solet. quippe non parua est horum differentia. Sunt enim nonnulli

nulli quos protinùs à iuventute concubitus
 imbecilliores efficit. Alij nisi assiduè coëant,
 capitis gravitate molestantur, cibos fasti-
 diunt, ac febribus obnoxij fiunt, atque vt
 deterior est ipsis appetentia, ita & conco-
 ctio minor, hos Plato arboribus immodicè
 fructiferis comparat. Equidem novi quos-
 dam quibus huiusmodi erat natura, qui præ
 pudore à libidinis vsu abstinentes torpi-
 10 di pigriq̃ue facti sunt: nonnulli etiam me-
 lancholicorum exemplo, præter modum
 mæsti ac timidi: cibi etiam tum cupiditate, *Cibi cupi-*
 tum concoctione vitiata. Quidam vxoris *ditas*, &
 mortem lugens, & à concubitu, quo an- *cōcoctio vi-*
 teà creberrimè fuerat vsus, abstinens, *cibi tiata ex*,
 cupiditatem amisit, atque ne exiguum qui- *retento se-*
 dem cibum concoquere potuit: vbi ve- *mine.*
 rò seipsum cogendo plus cibi ingerebat,
 protinùs ad vomitum excitabatur, mæstus
 20 etiam apparebat, non solùm has ob cau-
 sas, sed etiam (vt melancholici solent) ci-
 tra manifestam occasionem. Verùm hic
 quam celerrimè liberatus est, ad pristinam
 consuetudinem reuersus. Hæc ergo confide-
 ranti mihi apud meipsum, visum est longè *Maiores no-*
 maiorem ex retento semine quàm men- *xa ex retō*
 struis, corporis noxam euenire posse, præ- *to semine.*
 fertim in his qui suapte natura vitiosis abun- *quàm mē-*
 dant humoribus, & pleni sunt, atque *struis.*

ocio educati, quiq; cū anteā nihil ad libidi-
 nem reliqui fecissent, affatim continere cō-
 perunt. Equidem perpendi in iis, naturalem
 excernendi ipsum cupiditatem huius rei cau-
 sam esse. quum enim & tale & tantum fue-
 rit, neminem nō ad sui excretionem vi qua-
 dam stimulat. Ita Diogenem Cynicum nar-
 Cynicus li rant, virum alioqui omniū mortaliū, quod
 bidini in- ad continentiam pertinet, constantissimum,
 dulcit ut libidini tamen indulgisse non à copulata illi 10
 noxā retē voluptate, veluti bono aliquo illectum, sed
 ti seminis ut noxam, quā à retento semine provenire
 evitaret. solet, evitaret: Eum meretrix adire pollicita,
 Epigram. quum diutius cessaret, ipse manu pudendis
 libr. 7. τὴν admota, semen proiecit, ac venientem dein-
 δ' ὑμῖν αὖ- de mulierculam remisit, inquit, manus hy-
 ον ἡ εὐδερ menæum celebrando te præuenit. At planē
 παλάμῃ, constat modestos viros non ob voluptatē,
 αἰσθ. & sed ut ab impedimento præseruentur, libi-
 κατ' ἴδιν. dini indulgere: perinde ac si nulla esset ei 20
 Cur ani- voluptas coniugata. Sic etiam reliqua ani-
 malia ad malia ad coitum excitari arbitror, nō quod
 coitū exci- existimēt voluptatem boni cuiuspiam spe-
 tentur. ciem præ se ferre, sed ut semen, quod
 ob retentionem ipsa molestat, excernant:
 haud secus quā deiciendi stercoreis, ex-
 cernendæque vrinæ desiderio, suapte na-
 tura moveri consueverunt. Cogitanti ita-
 que mihi aliquando super hac re, tale quod-
 dam

dam accidens apparuit in muliere ex Ion. Nervorū
 go iam tempore vidua: quæ præter cæte. *distentio-*
 ra mala, nervorum quoque distentione ve. *ne laborās*
 xabatur ac dicente obstetrice, vterum esse *quedā vi*
 retractum, remediis ad huiusmodi affectus *dua, obre-*
 consuetis vti decreuit: quibus adhibitis, par. *ictum se-*
 tim ob ipsorum calorem, partim etiā quod *men.*
 inter curandum, manibus tractarentur par. *De qua-*
 res muliebres, obortā titillatione, cum labo. *Gale. libr.*
 10 re & voluptate veluti per coitum usu veni. *2. de semi-*
 re solet, excreuit crassum plurimumque se. *ne sub præ-*
 men, atque ita à molestia sua liberata est *cipium.*
 mulier. Proinde manifesta coniectura asse-
 quutus sum, vitiato semini maiorem quàm
 menstruis esse vim ad noxam vniuerso cor-
 pori inferendam. Itaque licet hæc quidem
 aliquando profluant è viduis, suppressum
 nihilominus semen molestiam noxamque
 20 ipsis inferre potest. Quibus verò nequa. *Hand se-*
 quàm persuaderi potest, exiguum succum in *cus nocet*
 vna parte contentum tantorum acciden- *suppssum.*
 tium quæ vniuerso corpori eueniunt, esse *sperma, ac*
 causam, ij omninò immemores esse viden- *venenati*
 tureorum, quæ quotidie contingunt. Et. *animalis*
 enim à phalangij ictu totū corpus affici vi- *ictus.*
 detur, exiguo veneno per minimum tora-
 men iniecto. Sed longè maiori admiratio-
 ne dignus est scorpionis ictus, qui breui
 admodum tempore grauissima infert acci-

dentia: quippe quum sese implicat, aut perquam exiguum est id quod iniicitur, aut nihil omninò, nullo apparente foramine in ipsius aculeo. Atqui fieri non potest, quum primùm quis perinde quasi ab acu punctus est, ut vniuersum corpus veluti grandine percuti videatur, animi simul defectione accedente. Nam rationi magis consentaneum est, ut vel à spiritu quodam, vel tenui humiditate iniecta, hæc eueniant accidentia. Sunt ¹⁰ qui putant res quasdam solo tactu per qualitatis vim, ea quæ eis vicina sunt, alterare posse, idque planè videri in marina tor.

Torpedo pedine: utpote cui tam vehemens sit potentia, ut per piscatoris tridentem transmissa *marina* ad manum alteratione, derepentè totam *venenosa.* reddat torpidam. His coniecturis facillè deprehenditur, parvæ molis res quasdam solo tactu maximas inducere alterationes. Id

Vis ma- quod in Heraclio quoque lapide, quem ma ²⁰
gnētis. gnetem nominant, videre est: ferrum enim quod tetigerit, ei adhæret, vel nullo adhibito vinculo. Deinde si aliud id quod primò tactum fuerit tetigerit, similiter ut primum illi inhærebit. Postea tertium secundo, ita ut planè constet, rebus quibusdam vehementissimas esse vires. Reliquum est ut inuestigemus, an in animantibus corruptio aliqua nasci possit adeò vehemens, ut veneni

ni tum qualitatem tum vires æquet: an id iam à Medicis enodatum discussumque esse videtur, qui hanc solent proponere questionem: Vtrum propriæ sint notæ veneni, necne? Nam qui maximè videntur super hac ambiguitate disputasse, ij eosdem fieri affectus concedunt, & à letalis veneni portione, & à corruptione quæ è corpore ortum habet: verùm facile discerni posse eos

- 10 qui venenum sumpserunt, ab iis qui aliunde affecti sunt. Quum enim homo suapte *Veneni e-
poti nota.* natura probis humoribus abundans, ac sanorum more educatus, derepentè moritur (vt letali assumpto veneno fieri solet) deinde corpus aut liuens, aut nigricans, aut varium est, aut defluens, aut putredinem molestem olet: hunc venenum sumpsisse aiunt. Igitur si eiusmodi affectibus nos infestari fateamur, qui ex nobismetipsis accepto suæ
- 10 originis impetu similes sint his, qui pernicioso epoto veneno eueniunt: nihil mirum, si vitiatum semen, aut menstruum huiusmodi, quum retinetur, aut putrescit, corporibus vt afficiantur idoneis, gravia inferat accidentia. Quippe facile intelligitur à canibus, quantam habeat vim afficiendæ rei aptitudo: quum enim reliquorum animalium nullum rabie capiatur, solus canis eo affectu corripitur: atque tanta sit in ipso humo-
rum

Canis, ra- rum corruptio, ut solū eius sputum, si huma
biofi sputū num corpus contigerit, rabiem excitare pos
rabiē exci sit. Ut igitur ab exiguo initio, sputi videli-
tat. cet qualitate, aucta quædam in corpore di-
 spositio, quando ad magnitudinem notatu
 dignam peruenerit, discerni potest: idq; post
 sex menses, quū nōnunquā ante id tempus
 nulla notaprehendatur. Sic eodem mo-
 do vitioso humore in animalis corpore ge-
 nito, paulatim tractu temporis principalium 10
 partium aliqua consentit, à qua deinde vni-
 uersum corpus celeriter alteratur. Quod
 autem à priscis iam inde seculis optimo iure
Hysterica creditum fuerit, hysterica dicta accidentia,
accidentia ad vterum, tanquā ad radicem pertinere,
ad vterū vel maximo argumento esse potest, quod
pertinent. & solis viduis, & iis quibus menstrua sup-
 primuntur, huiusmodi affectus euenire con-
 sueuerunt. Quod verò ad eos excitandos,
 retentum semen, maiorem: menstruum ve- 20
 rò minorem vini obtineat, facile intelli-
 gitur ab his mulieribus, quibus cū non sint
 viduæ, purgationes supprimuntur: quamuis
 enim pluribus infestentur accidentibus (quæ
 post hac dicentur) spiratione tamen non
 priuantur, neque animi defectione, ne-
 que aliis quoque accidentibus, quæ pau-
 lō antea dicta sunt, laborare videntur.
 Præterea ex eo quod sunt viduæ quædam,
 quæ

quæ licet æquè vt antea, aut paulò minùs purgètur, nihilominùs similibus corripuntur accidentibus. Quippe medicæ quæ eas exquisitè tetigerunt, fatentur circa vterum notas quasdam apparere. Nam ceruix eius inclinata videtur, interdum quidem veluti sursum retractus sit totus vterus, interdum verò veluti ad latus trahatur. Proinde quidam vterum veluti animal esse statuentes, 10 quod creandæ prolis gratiâ mouetur: si priuetur his quæ concupiscit, vniuerso corpori nocere dicunt. Quæ de re Platonem ita scri. *Platonis*
 » pisse comperimus: Ea pars quæ in mulieri. *sententia*
 » bus & vterus & vulua nominatur, quum sit *de vtero,*
 » animal prolem generare cupiens, si intem- *in fine Ti-*
 » pestiue, diuq; infructuosum fuerit: succen- *mai.*
 » sens ægrè fert, erransq; per totum corpus, &
 » spiritus meatum obstruens, respirareq; non
 » finens, in extremâ anxietatem deiicit, atque
 20 multos alios morbos excitat. Hæc dicente Platone, quidem addiderunt quòd postea quàm ita per corpus vterus errauerit, ad septum trāuersum perueniens, respirationem impedire solet. Alij errare ipsum veluti animal negantes, vbi suppressa sunt menstrua, exiccari aiunt: deinde humectari cupientem, ad viscera vsque ascendere: quum verò ascendendo nōnunquàm septum transuersum contingat, idcirco animal spiratione
 pri

priuari. Etenim qui ignorātea, quæ in dissectionibus apparent, quique neque naturales, neque à voluntate pendentes actiones, vnuquam considerauerunt, quamuis ea, quæ iam diximus, nulla audiant demonstratione roborari: fieri tamen posse arbitrantur, vt aliquid ex ipsis à veritate nequaquam abhorreat. At verò qui in vtriusque fuerint exercitati, hanc rationem, vtpote infirmam, vel metacente, despiciunt. Nā si aliquid vteri ascendere videatur, id perexiguū est, neque sufficit ad hoc, vt totū ipsius spacium, ne ad ventriculum quidem ascendisse ostendat: tātum abest vt hunc prætereundo, ad septum transuersum pertingere possit. Quòd si detur etiā vt attingat, quid momenti habebit id, vt spirationem tollere, aut animi defectionem, aut membrorum contractionem aut integram soporem inducere possit? Etenim cum aliquis se impleuerit, ventriculus intumescens, planè videtur septum transuersum comprimere, atque hanc ob rem spiratio redditur crebrior: sed nullo insuper alio accidente animal infestatur. Atque prægnantibus quoque vterus adeò intenditur, vt crebrior fiat spiratio, sed ne has quidem aliunde lædi videmus. Id autem quod dicunt, exiccatos vteros, humoris desiderio ad viscera ascendere, nemini non absurdum videri

ri

ri potest. Si enim inutilem aliquando vterus
requirat humorem, vesicam atq; crassi inte-
stini partem inferiorem, totam sibi proxi-
mam haber: si verò non simpliciter humo-
rem, sed sanguineum humorē desiderat, ad
hepar potius quàm ad septum transuersum,
ipsum moueri oportebat. At verò quid opus
est vt aliis extrinsecus irruat partibus, quum
à spissa membrana ipsum ambiente conti-
neatur? quippe omnes tunicæ quæ ad sese
humorem ex intestinis attrahunt, per ora
quamplurima id efficere solēt. At qui ad vte-
rum multa admodum venarum ora perue-
niunt, per quas ex concava vena, vtpote cui
ex hepate sanguis influit, sanguinē attrahere
potest. Etenim quam aliam fistulam, hac in-
signiorem quis inuenerit? qua ex hepate in
vterū sanguis deferatur, aut per quam aliam
omninò vterus ex iecinore quippiam attra-
here possit. Quòd si hunc concavæ venæ
riuum non maximum, saltem non alium es-
se fateamur oportet. quippe sola hæc vena,
partibus sub transuerso septo constitutis, ex
hepate defert sanguinem. absurda igitur o-
mninò est illorum ratio, cum hoc quòd
vterum esse animal, hac ratione astruere vi-
dentur. Sed si hoc ipsis concedatur, ergo
agrè feret vterus priuari se, eo quod concu-
piscit, ac fortasse à cibo quoque abstinebit,
quem

Venarum
ora ad v-
terum.

Phœnices quemadmodum Phœnices amatores affici
amatores perhibentur. verum ob hoc neq; ad septum
à cibo ab- transuersum, neque ad aliū quemuis locum
stinent. perueniet. Nam vt cætera omittamus, per-
 quàm arida est septi trāsuerſi tēperies, atqui
 vterus iuxta illorum placita, qui ipsum exic-
 cari dicunt, humidarum partium cōmuni-
 catione indiget. Sed interrogaueris fortas-
 ſe, quam ob cauſam modò ſurſum, modò in
 latus retrahi vterus videatur? id enim obſte-
 trices aiunt, aut cur ipſo in ſua ſede ſæpenu-
 merò manente, nihilominùs mulieres quæ-
 dam ab hyſtericis accidentibus corripian-
 tur? Equidem huius rei cauſam explicare
 tentabo, ea quæ ab Hippocrate dicta ſunt
Cur tan- imitādo. Igitur vteri tenſiones in cauſa eſſe
gentibus dixerim, cur tāgentibus obſetricibus, mo-
obſetri- dō ſurſum, modò in latus retrahi videatur.
cibus, vte Nam ſimul cum vtero, ceruicē quoq; ipſius
rus ſur- retrahi neceſſe eſt: ſupereſt ergo vt declare-
ſum & in mus, quam ob cauſam, vterus vel ſurſum,
latus re- vel ad latus retrahatur: hoc enim huic ſer-
trahi vi- moni deerat. Ea eſſe cenſetur vaſorum ad
deatur. ipſum perueniētū & plenitudo, & ſuſpēſio.

Etenim oſtēdimus in enarratione eius apho-
 Lib. 6. riſmi, quo inquit: Cōuulſionem, & à pleni-
 aph. 39 tudine fieri, & euacuatione, quòd plenitudo
 repletorum corpora & in latum & profun-
 dum extendit, ſed longitudinem abbreviat.

Ergo

Ergo quo efficiuntur breuiora, eo magis ad
origine retrahuntur. Nam Erasistratus mu-
sculos quoque si spiritu impleantur, in lati-
tudine augeri, in longitudine verò minui,
atque ob id etiam retrahi dicit. vnde ergo
oritur plenitudo, tum venarum, tum vincu-
lorum? nempe ex menstruorum retentione. Ex men-
struorum
Nam peruenit quidem ad vterum sanguis, *retentione*,
sed ad interna ipsius ingredi non potest, aut
10 quia crassior est, quam vt per ora vasorum oritur ple-
nitudo ve-
possit penetrare, aut quia clausa sunt ora. *narum*
Itaque multiplicatus in venis eas extendit, *vinculorum*
atque vicina ipsis vincula madefacit: ad ho-
rum autem extensionem continuò vterum *uteri*.
retrahi necesse est. Igitur si equaliter vndiq;
trahantur, recta erit, & sine inclinatione ipso-
rum transmutatio: si verò inæqualiter, ad
partem vehementius trahentem intendun-
tur. Non ergo veluti animal errabundum,
20 aliàs ad alium locum discurrit in mulieribus
uterus, sed ab extensione retrahitur. Quòd
si dixerit quispiam, vteri corpus, tum non
esse affectum, sed peruersione laborare, quum
aliàs aliorum trahitur, hic haud absurda di-
cere videbitur. Nam circa reliquas quoque
corporis partes accidit, vt huiusmodi appa-
reant affectus, & vt sæpenuerò decipian-
tur Medici, qui peruersam partem, quia vel
incuruari, vel extendi non possit, arbitran-

AA

Hippocratur esse affectam. Atque hoc docuit Hippocrates in eo libro quem de Articulis scripsit, ubi etiā de vteri vocato errore mentionem fecit, ita scribens: Si in posteriorem partem caput femoris exciderit, quāquā hoc raro fit, extendi non potest crus, neque secundum luxatum articulum, neque adeo secundum poplitem quoque, iiq; minimè, ubi longo spacio durauerit malum, vel inguinis, vel poplitis articulum extendere possunt. Hoc in sermone quāuis poplitis articulus haud quā afficiatur, quia tamen cum inguine communicat, ipsum extendi non possit. Atque deinceps subiūgens, inquit: Sanè animaduertere hoc oportet vt enim utile est, ita magna est ipsius habenda ratio. quamuis nō paucos lateat, quod ne sani quidem extendere possunt poplitis articulum non extenso inguinis articulo, nisi sursum leuato pede, ita enim possunt. Neque etiam similiter, sed longè maiori cū difficultate flectere possunt poplitis articulum, nisi simul flectant articulū inguinis. His dictis deinceps ait: Multa alia quoque iis haud dissimilia in corpore inueniuntur, & secundum nervorum distentiones, & musculorum figuras, quinetiam plurima notatu fortasse digniora, quā quis putauerit, contingere solent, & secundum intestinorum naturam, & vniuersum

uerſum ventriculum, atque vteri, tum erro-
 res, tum extensiones. His verbis Hippocrates
 de poplitis articulo dicere propoſuerat, non
 potente ſecundum naturam moueri, id quæ
 non ob proprium ipſius affectum, ſed quia
 coxæ conſentit: quinetiã extensionum, quæ
 vtero accidunt, mentionem fecit: quum vi-
 delicet ipſe, non per ſe tranſmutatur, ſed à
 quibuſdam aliis trahitur. Igitur vteri per-
 10 uerſiones, eo quem diximus modo, ad ſup-
 preſſa ſequuntur menſtrua, eaſtamen ob hoc
 accidentium quæ in animalis corpore appa-
 rent; cauſas eſſe, nequaquam putandum eſt.
 quippe quæ communẽ habent cauſam, ple-
 nitudinem à ſuppreſſa mēſtruorum purga-
 tione euenientem. Quæ verò citra peruer-
 ſionem, aut menſtruorum retentionem, vi-
 duas moleſtant noxæ, hæ ob retentum fe-
 men euenire putantur. Cæterum pro mul-
 20 titudinis, qualitatiſve ratione, tū mēſtruorū
 tum ſeminis, aliàs aliæ accidentium ſpecies
 oriri ſolent. Etenim noxia cauſa vniuerſum
 corpus refrigerare potente, ad eò vehemēter
 inſrigidatur corpus, vt & ſpiratio, & arteria-
 rum pulſus, ſenſu deprehendī nequeāt. Quæ
 ſi vel craſſa fuerit, vel acri conuulſiones: ſi
 verò atræ bilis naturam habuerit, mœſti-
 tiam inducet. quemadmodum animi quoque
 defectiones, & ad fortes extensiones, & re-

*Veteri per-
 uerſiones.*

Stoma-
chus os
ventri-
culi.

Acciden-
tia ob a-
stricta
mēstrua.
Lib. 5. A-
pho. 39.

Suppres-
sionem men-
struorum
nota.

Clausula
uteri cer-
uicis citra
duritiem,
pregnan-
tem indi-
cat.

frigerationes, & stomachi æstuationē sequi consueuerunt. Constat autem quod in huiusmodi sermonibus os ventriculi stomachū solemus appellare. quippe omnium medicorum mos est, in syncopa quæ ab oris ventriculi vitio dependet, huiusmodi vti appellatione. Porro accidentia quæ ob astricta menstrua infestare solent (nam de iis quoque nonnihil me dicturum pollicitus sum) nunc enarrate aggredior, sumpto initio ab his quæ ab Hippocrate in aphorismis scripta sunt: præcipuè verò quum dicit: Si mulier neque prægnans, neque puerpera, lac habet, menstrua eius defecerunt. At nullo in mammis apparēte lacte, menstrua suppressa hisce notis deprehenduntur. Grauitas totum corpus molestat, item fastidium quoq; , vt nulla sit cibi cupiditas, horror inæqualis: quòd si citra horrorem inæqualitas aliqua fuerit, atque fastidium, cupiatque mulier quædam aliena: iube vt obstetrix vteri ceruicem tangat. Nam si citra duritiem clausa inueniatur, eam prægnantem esse coniicies: ex his nonnullæ cibum prætereà euomunt, ac terram aut extinctos carbones, aut alia quædam huiusmodi edunt. Si verò clausum fuerit os ceruicis vteri, ac duritiem quoque habeat: affectum aliquem in vtero esse portendit: oportet itaque speculari obstetricē, ad quam par

partem vel declinet, vel retrahatur: nam in ea parte affectam vteri sedem esse coniiciendum est. † Atque in quibusdam fœminis, spectat eius partis dolor cum grauitate, non nihil significare potest, quin etiam in coxam dolor 6. epid. transit, ac crus ipsum, quod è regione est, per par. 1. incessum claudicat. Quòd si longiori tempore supprimantur menstrua, nullamq; meri in co-
 10 mor aliquis præter naturam, in ilibus inter-
 dum exoritur, ostendens nimirum ex inter-
 nis partibus quampiam esse inflammatam. Panus ob-
 Nonnullis † panus in extrema ilium parte ex-
 citatur: veluti viris quoque eodem in loco †
 nonnunquam oriri solet, qui vbi suppuratus aliquando fuerit, secari debet. Atq; hanc
 partem † siue membrum suppuratum dissec-
 tumque vidimus: interdum ignorantibus temporis
 20 medicis inexpertis quid incideret, interdum
 verò intelligentibus quoque. Atq; omnia vix fini-
 membra ita suppurata facile curantur. Vte-
 ri verò sectiones maiori cum difficultate ad-
 conglutinantur. Huiusmodi accidentia fe-
 dunt. qui suppressa menstrua cōsueuerunt, ac præ-
 terea lumborum, & colli, & sincipitis do-
 lor, qui etiam oculorū fundamenta infestat: ad inte-
 item febres ardentes, & vrinæ nigricantes, stinū co-
 cum rubra quadam sanie, perinde ac si aquæ lon refe-
 ex qua nuper macinata carnes abluta fuerūt, rendum

videtur fuliginem quis miscuisset: quibusdam vrina
quod ima aut difficulter redditur, aut omninò suppri-
parte suū mitur. Quum ergo horum aliquod in mu-
ita voca- liere conspexeris, vterum veluti radicem ip-
ri scribit sorum conicere oportet. Quòd si per aliū
Pan. quempiam corporis locum sanguis effluxe-
rit, aut inflammatio, aut erysipelas excitatur:
an menstrua purgentur interrogare debes,
siquidem nihil horū accidere solet integrè
purgatis. Igitur quibus menstruorum cohi- 10
betur purgatio, iis huiusmodi plærūque eue-
niunt accidentia. Quum verò immodicè
Immodicè vacuantur, sequitur color fœdus, pedes mol-
vacuato- li tumore attolluntur, corporis robur pro-
rum men- sternitur, vitiatur ciborum tum concoctio,
struorū ac tum cupiditas. Atque in totū omnia, quot-
cidentia. quot immoderatam sanguinis vacuationē
siue ex hamorrhoidē, siue alio quopiā san-
guinis fluore euenientem, sequi consueue-
runt accidētia: huiusmodi fœminas infestāt. 20
Muliebri Sed accidit interdum fœminis muliebri vo-
profluvii. catū profluvium, vel vtero haud quaquā
affecto, quū videlicet vniuersum corpus per
ipsum expurgatur. quemadmodum interdū
per renes quoq; euacuatur. Id verò potissimū
fit, si mulier laxis sit carnibus, & pituitosa.
Huiusmodi mulieres intacto quidem vtero,
sed vniuerso corpori adhibitis remediis sa-
nauimus. Atq; id quod excernitur nonnun-
quā

quàm rubra sanies, est interdum aquosa, aut
 subpallida. Quòd si purus fuerit sanguis qua-
 lis ex dissecta vena profluit, diligenter ani-
 maduertere oportet, num erosio sit in ute- *Erosio in*
 ro, ea verò magna ex parte in ceruice po- *utero.*
 tius, quàm alibi contingere solet: discerni-
 turque per excretam saniem, si fuerit pro-
 funda: Si verò circa os ceruicis constiterit,
 non solùm per hanc, sed per tactum quoq;
 10 cognosci potest. Atque prægnautes quoque
 quum ora venarum in ceruice aperiuntur,
 sanguinem excernunt. Si verò mulieri utero *Pregnan-*
 graui, mammae subito extenuantur, abortus *tiù men-*
 sequitur. Atque geminos ferens, si altera *strua.*
 mamma extenuetur, alterum amittit: & om- *Lib. 5. a-*
 ninò si dextra mamma extenuata est, ma- *ph. 36. et*
 rem: si sinistra, foeminam amittit. Quippe foe- *37. et 38.*
 tus, qui mares sunt, parte uteri dextra conti-
 nentur, qui foeminae, magis sinistra. Atque ra-
 20 rò aliter euenire compertum est: adeò ut in
 animalibus quoque, quae suapte naturâ gemi *Lege dis-*
 nos ferre solent, itidem accidere videamus: ut *putatione.*
 in capris, ouibus, atque aliis quadrupedibus *Arist. con-*
 nò paucis videre est. Si mulier promptè qui- *tra Empe-*
 dem conceperit, deinde secundo, aut tertio, *doclem ca.*
 aut quarto imprægnationis mense, foetum *primo. 4.*
 eiecerit, circa uteri accetabula humorem pi- *de gene*
 tuitosum abundare, atq; idcirco venarum, arte *rat. ani-*
 riarumque eius loci, ad ora vasorum in uterum *malium.*

descendentiū, nexum debiliore reddi coniciendum est, vt factum ob grauitatem ferre nequeat, sed facile abrumptatur.

De colis affectibus. CAP. VI.

QUemadmodum ab excrementis quæ per anum deiiciuntur, pauca admodum super vicinarum partiū affectibus indicia accipi possunt, vtpotè quæ magna ex parte, & intestinorum, & ventriculi, & splenis, & iecinoris, atque nonnquam humorū in vniuerso corpore exuperantium notæ sunt. Siceodem modo pauca per colem educta excrementa, proprium ipsius affectum portendunt, sed complura vesicæ, renū, hepatis, splenis, pulmonis, thoracis, atque humorum in vniuerso corpore, dispositiones significant. Verum huiusmodi signa per alia, quæ vnicuiq; parti affectæ subseruire diximus, indicia distinguuntur. 20

Colis vrilis affecti indicia.

Igitur affecti colis hæc erunt indicia: Nam vlcus manifestè deprehenditur à dolore ipsum infestante, atque si aliquid ex iis per vrinas excernatur quæ vlcera comitari solent. Id verò ab eo quod ex vesica secernitur, ita discerni potest. Nam ipsum in primo protinus exitu apparens, vrinam præuenire cōsuevit: quod verò à vesica egreditur, vrinæ admixtū videtur: quinetiam assidue in-

ter

ter meiendum mordicus dolent pudendo-
 rum vlcera, præcipuè quum vel crustula, vel
 sordibus solutis, pura fuerint. Sed lōgè cui-
 dentiùs ipsius inflammationes, ac reliquæ
 huiusmodi dispositiones vel sine indiciis
 dignoscuntur. Verùm de gonorrhæa, &
 priapismo diffusè aliquid percurrere satius
 fuerit. Ergo gonorrhæa, est feminis excre- *Gonor-*
 tio inuita, quam inuoluntariā quoq; nomi- *rhea.*
 10 nare licet. Sed significantiùs dixeris, feminis
 assiduam excretionem, cole haudquaquam
 extenso. Priapismus verò, est quum coles, & *Priapif-*
 in lōgitudine & circulo totus augetur, nul- *mus.*
 lo stimulante ad libidinē aut desiderio, aut
 acquisito calore, vt quibusdam accidere cō-
 suevit, qui supini decumbunt, sic enim qui-
 dam ipsum descripserunt. At breuiori quoq;
 compendio dicere potes, permanentē colis,
 aut auctiōnem, aut tumorem deducta verò
 20 denominatio est, à priapo scilicet. Nā hunc,
 vt cui suapte naturā huiusmodi coles esset
 ita finxerunt, atque pictura descripserūt ho-
 mines. Gonorrhæa autē nomē, planè com- *Vnde di-*
 positum est, ex γονῆς (quod semen genitale) *eta gonorr*
 & ῥῆν, quod fluere significat. Etenim semē *rhea.*
 modò γονῆ modò γόνος nominari solet.
 Porro quemadmodum omnia corporis no-
 stri excremēta duobus modis vacuātur, in-
 terdum enim à cōtinētibus ipsa corporibus

Secretio
humorū.

Retentio
humorū.

excernuntur, interdum spontè profluunt, eò
quòd ob imbecillitatem ab ipsis corporibus
contineri non possunt, ita de semine quoq;
dicendum est. Nā in omnibus huiusmodi,
vt excernere tempestiuè, ita continere, natu-
ræ officium est. Verùm secretio quidem fit
aperto fluxionis meatu, ac reliquo concepta-
culi spacio, & contracto, & ad apertum iam
meatum, quicquid in continente spacio con-
tinetur, impellente. Retentio verò fit, quum 10
clausus permanet meatus & contentū à con-
tinente haudquaquàm impellitur, sed cōtrā
per contractionem comprehenditur, & reti-
netur. Hoc modo cōtenti in cauis instrumē-
tis humores, in his qui integra valetudine
degunt, naturaliter & excernūtur, & retinen-
tur. In illis autem qui præter naturam se ha-
bent, retentio quidem ob excretiæ virtutis
imbecillitatem: excretio verò ob retentricis
facultatis infirmitatem euenit, vel ob dispo- 20
sitionem aliquam, quæ haud secus, quàm na-
turalis ipsa excretoria vis, partes mouere pos-
sit. Id quod in seminariis vasis videre licet,
vbi aliquis vel comitali morbo, vel con-
uulsione violenter irruente fuerit correptus.
Cæterùm videmus alias quoque partēs, vt
manus, aut pedes, aut digitos conuelli, mo-
dò simul cum vniuersi corporis conuulsio-
ne, modò ipsis solis affectis. Proinde haud-
quaquàm

quaquàm absurdum fuerit, in seminariis va-
 sis, & quidem solis, aliquando huiusmodi
 dispositionem excitari huiusmodi ea est, in
 qua inuita vrinæ excretio gonorrhææ pro-
 portione respondet, quum contentricem vi-
 delicet facultatem resolui contigerit. Igitur
 gonorrhæa instrumentorum seminis affe- *Instrumē*
 ctio est, non pudendorum, quæ seminis ge- *torum se-*
 nitalis via sunt, qua excernatur. Priapismus *minis af-*
 20 verò, planè colis est accidens. At fieri po- *fectio go-*
 test, vt nullo præcipuo proprioque ipsum *norrhæa*
 affectu infestante, ad arterias referatur, vt. *Colis acci-*
 pote quæ sole interdum huiusmodi ha- *dens pria-*
 beant præter naturam dispositionem, quali *pismus.*
 videlicet affici consueuerunt, quum natura-
 liter totus coles intenditur. Atqui à spiritu in-
 tumorem ipsum attolli manifestè patet, iis
 qui celeritatem eius, & quum intumescit, &
 quum iterum residet, perpèdunt, quippe nul-
 20 lus humor tam subitam in alterutram partē
 mutationem efficere posset. His sic se habē-
 ribus, quum in corporū dissectione, magnæ
 videantur arteriæ in pudendum (exiguam
 scilicet particulam) irruere, sitque coles essen *Colis com-*
 tia talis qualem in nulla alia parte videre est, *positio.*
 vtpotè cuius corpus neruosum est, atque vn-
 decunque fistulosum, excepta ea parte quam
 glādē vocāt quid aliud excogitauerit quis,
 quàm quò à vaporoso spiritu, ab arteriis,
 af

Glans pu-
dendi.

affluente, per extensiones in tumorem attol-
latur? Ideo quæ glâdem æqualem semper ha-
bere magnitudinē, quod fistulosus in ipsam
neruus nō ingreditur. Ergo quid causæ est,
quum libidinis impetu quis stimulatur, aut
vbi ob supinum decubitum, calfacti sunt lū-
bi, vt coles exrendatur? Nempe hac inuen-
ta facile priapismi quoque dispositionē in-
uenire nos posse speramus. Quod verò prin-
ceps causa sit plenitudo, vel arteriarum, vel io-
nerui fistulosi, aut etiam vtriusque quum ex
priori conditione mutatur, palam constat.
At verò vtrius magis, aut si etiam ambo-
rum, deinceps consideremus, hinc sermo-
nis nostri sumpto exordio: Natura corpo-
ris partes fingens, perficiensque, fecit vt ip-
se citra doctrinam, proprias actiones ag-
grederentur: cuius rei exactissimum aliquā-
do fecimus periculum, hœdum alendo, sed
ita alendo, vt matrem quæ ipsum in vte- 20
ro gestauerat, nunquàm vidisset. Quum
enim capras dissecarem, dissectorum que-
stionibus, quibus fœtus in vtero formatio-
nem speculantur, promotus, inueni elegan-
tem quendam hœdum, quem à matre abso-
lutum, ita pro meo more abstuli, vt ipsam
haudquaquàm videret. Atque in domū quā-
dam, vbi multæ pelues erant, deposui: qua-
rum aliæ vini, aliæ olei, aliæ mellis, aliæ la-
ctis

hœdus idem v-
bi d. mor-
m. l. co.
7. Hœdi na-
turalis in-
dustria.

Etis, aut alterius cuiuspiam humoris erant ple-
 næ, aderantque fructus non pauci, tum Ce-
 reales, tum ab arboribus decerpti. Hunc ita.
 que hœdum conspeximus: in primis quidem
 pedibus incedentem, perinde ac si audiuiſſet
 sibi inſeſſus gratiâ, crura fuiſſe cōceſſa, dein-
 de excuſſit quàm à matre contraxerat humi-
 ditatem: poſteâ pede latus ſcalpere, ac dein-
 de ſingula vaſa olfacere vidimus. Percepto
 10 itaque ſingulorum odore, lac tandem ab-
 forbuit. Quibus viſis omnes exclamauimus,
 Hippocratem verè dixiſſe, animalium natu-
 ras eſſe indoctas. Sic ergo hœdum hūc edu-
 cando, non ſolūm lac, ſed multa inſuper alia
 quæ fortè offerebātur, comēſſe vidimus. At
 quia nō longè aberat vernale æquinoctiū,
 quum eriperetur hœdus à matre, exactis
 duobus deinde menſibus, tenellos ei tū fru-
 ticum, tum aliarum plantarum ramulos ob-
 20 tuli: quorum omnium quū experiretur odo-
 rem, alios quidem contempſit, alios verò
 guſtauit, atque ſic ad adultarum caprarum
 cibos conuerſus eſt. Sed hoc fortāſſe non
 adeò magnum videtur. At lōgè maiori ad-
 miratione dignū eſt, quòd poſteâ quàm &
 folia, & teneros ramuſculos deuorauerat,
 paulò poſt ruminare cœpit. Quod rursus o-
 mnes quotquot aderāt vidētes, exclamaue-
 runt cum magna facultatū admiratione, quæ
 anima

animalibus naturâ insunt. Quâvis enim magnum videbatur, quod impellente fame, per os, atque dentes cibum assumeret: multò tamen vehementius admirati sumus, quod cibum in ventriculo iam contētum, in primis

De rumi- quidem ad os subleuando reduceret, dein-
natione et de multo tempore mādendo tereret, postre-
mentu- mo rursus ipsum deuoraret: idque non in
lorum dif- eundem, sed in alium ventriculum. Vulga-
ferētis in res autem huiusmodi naturæ munera de- 10
ruminan- spiciunt, nihil nisi peregrina spectacula ad-
tibus lege mirantes. Nam quis nō miraretur, quod me-
c. 14. 3. de dici in secandis corporibus peritissimi, quæ
partibus rere solent, à qua causa articulus hic exten-
animaliū. ditur? subiiciamus verò exempli gratia co-

xe articulum, aut à qua causa incuruatur, aut quid est quod ipsum in vtranque partem intransuersum abducit, aut quid ipsum vtroque circumuoluit, quum interim hæc, singulos articulos, ad quamcunque motionem 20 libitum fuerit, possit excitare: quemadmodum homines ipsi, quamuis à quo musculo motus efficiatur nō intelligant. Porro de lingue motione (nam hanc pro exemplo inducimus) quis non mirabitur, si dissectores inter ipsos, non solum de musculorum numero, sed de ipsorum etiam actione pugnantem viderit, ac infantes quoque quomodo natura vocē, aut aliud huiusmodi munus imitari

**Lingue
motio.**

tari docuerit. Quomodo etiam linguā moueant, aut quibus musculis vocem eandem efficiant. Similiter etiam de omni reliquorū animalium, tum voce, tum respiratione. Atque (vt summatim dicamus) miraberis fortasse, quo docente, omnium quæ à cōsilio, & voluntate pendent actionū, instructa fuerint instrumēta: de quib⁹ quidē actionibus, licet acris inter dissectores sit pugna, quomodo fiat, & quibus instrumētis: nihilominus omnia animalia, simul atq; genita sunt, & spirant, & vocem reddunt. Igitur nō mirum esse debet genitales partes, eas actiones quarū gratiā à natura institutæ sunt; protinus ab initio cognoscere. Etenim quāobrem vterus, quum semen genitale cōceperit, donec perfectus fuerit foetus, exactè clausus permanet, perfecto verò foetu plurimūm aperitur, ac deinde sic apertus foetū excludit. Populares autem hæc propter crebrum euentum, & contēnunt, & despiciunt, vtpotē qui nihil, quod reuerà sit admirabile, sed ea dum taxat quæ rarò vident admirari consueverunt. Quid autem in rerū natura potest esse sibi ita admirabilius, quàm quòd nouem perpetuis mensibus clauditur os vteri, adeò exactè, vt ne specilli quidem acumen admittat: perfecto autem foetu, vsque adeò distenditur, vt mem totum anima! per ipsum egredi possit? Non igit

igitur dubites pudendorum facultatem per
Fistulo- se doctam esse, vt fistulosum hoc neruo-
sum ner- sumq; corpus, vbi ad coitū insurgit animal,
uofumq; à naturali facultate, quę ipsum attollere po-
corpus cau- test, protinus distendatur. Cuius rei simile
lis virilis. & in corde, & arteria, planè videre est, nisi
quòd horum motus perpetuus est, eò quòd
necessaria sit nobis eorum actio: fistulosus
verò nervus non semper, sed quum vsus re-
quit. Quū ergo sic fuerit extensus, sequi- 10
tur ex arteriis spiritus, quemadmodum pul-
mo thoracem ob eam quam habet ad mo-
tum ipsius sequelam. Verum posses fortasse
replentis fistulosum nervum spiritus vim,
quum ad coitum irrumpit animal, ad arte-
rias quoque referre, quanquam multò satius
est, vt huiusmodi actionē ad nervum, non
ad arterias referamus: quū præsertim actio-
nes, ex propria partium essentia, non ex ea- 20
rum positu provenire, rationi cōsonum est.
Nam cor si in alia quapiā parte poneretur,
nihilominus actionē suam obtineret. Nec
aliter de iecinore quoque, liene, ac reliquis
omnibus sentiendum est. Etenim vniuersi
corporis arterias, eandē habere actionē pro-
babile est. quippe eodem tēpore omnes to-
Arterie tius animalis arteriæ, inter sese similiter pro-
pudendis ducuntur. Itaq; haud quaquā par esse vi-
innata. detur, vt arteriæ pudendis innatæ, aliam ali-
quam

quam habeant facultatem, præter eam quam
 antea in toto corpore habebant, sed ratio-
 nabile est ut latiora quam reliquæ arteriæ
 ora habeant, ut quæ ad celeritatem sequelæ,
 ad id quod euacuatur sint præparatæ. Sem-
 per enim natura videtur unicuique actio-
 ni, id quod utile est, undiquaque expleuisse.
 Caterùm nullam aliam insuper præcipuam
 habent actionis facultatem, quum ad puden-
 dum peruenerint, licet calfactis lumbis, par-
 sit ut & arteriæ calidiores reddantur, & ma-
 gis etiam pateant ipsarum ora: quamobrem
 non exiguam tunc spiritus essentiam, in fi-
 stulosum neruum effundunt: qui paulatim
 impletus, colem extendit, ita ut tota ipsius
 essentia in fistuloso neruo consistere vi-
 deatur. His itaque cognitis ad priapismi di-
 spositionem veniamus. Quippe ex iis quæ *Vnde priapismi*
 suprà proposita sunt, constat, vel ob arte- *affectus.*
 20 riarum ora immodicè patentia, vel vapore-
 sum spiritum in fistuloso neruo ortum, hūc
 fieri affectum. Sed utrum potius pro causa
 sit habendum, inquirere oportet. Namque
 ab utrisque ipsum fieri posse, mihi videtur,
 crebrius tamen arteriarum ora patentia se-
 qui, quippe facilius est hæc distendi, quam
 flatusum spiritum in neruo fistuloso gene-
 rari. Ac memini me huiusmodi quidem ner-
 ui dispositionem semel vidisse, arteriarum

BB

Coli pal-
pitatio.

verò sæpenumerò. Cuius rei coniecturam
feci, tum ex iis quæ præcesserunt accidenti-
bus, tum ex modo curationis. In illo enim
cui assiduè colis palpitatio præcesserat, cau-
sa erat spiritus flatuosus, ad quæ quæ omnem
curationem conuertissem, hominem sana-
ui. Quibus verò supra modum arteriarum
ora putabant, in iis nullum huiusmodi acci-
dens præcedere solebat. Porro accidit cui-
dam, vt longo tempore præter consuetudi- 10
nem à concubitu abstineret. Alteri verò vt
mali succi alimentis, acribusque vteretur, alii
etiam vt duobus mensibus præcinctus pere-
grè proficisceretur, cum antea nunquam cui-
gi cõsueuisset. Coniecimus itaq; arteriarum
ora nimis patefacta, illis quidem ob humo-
rum vitia & acrimoniam: his verò ob flatuo-
sum spiritum, & sine ordine, & violenter cõ-
motū. Etenim medicamenta excitanda ten-
tiginis vim obtinentia, tum epota, tum etiā 20
perinæo, id est scemini, lumbisque adhibita
calida omninò atq; flatuosa sunt: quæ admo-
dum contraria omnia, ventositatem nō ex-
citant, & infrigidant potius, quàm calfaciāt.
Sed aduerte ne obiter hunc sermonem præ-
tercurras. quippe de medicamentis, non de ci-
bis loquutus sum, quoniā sunt quædam ali-
menta, quæ ob id quòd plurimum seminis
pariūt, impetum ad libidinem excitare pos-
sunt,

sunt, hæc ergo sermonē illum, quem nuper
dicebamus, probabiliorem reddere possunt,
quod à concubitu abstinentes, interdū pria-
pismo vexari solent: si quidem accidit his
qui plurimo semine abundat, & præter con-
suetudinem à coitu abstinent, præsertim quū
non student, vt multa exercitatione, sangui-
nis abundantia dissipetur, maxime verò iis
qui à libidinis cogitatione nondum liberi
10 euaserunt, veluti sunt quidam suapte natura
casti, qui cum longo iam tempore huiusmo-
di cōtinentia sese exercuerunt, libidinis ima Libidinis
ginem concipiunt, ob spectacula, quæ illas cogitatio-
mouere, & ad memoriam reducere possunt. priapif-
Nam longè diuersa est huiusmodi hominū mum ex-
dispositio, vt in pudendis generetur, ab eo citat-
rum dispositione, qui nullo pacto libidinis
cogitationi sunt obnoxii. Atque fuit mihi
amicus quidam, cui præter eam quam antea
20 habuerat consuetudinem, omnino à concu-
bitu abstinenti, adeo rigidus tumidusq; fa- Rigidus
ctus est penis, vt mihi accidēs ipsum declara- penis cuti-
re cogeretur. Miror, inquit, quod huic (athle dam ob
tā indicans) ob continentiam rugosus, colla- Veneris
pliusq; penis euaserit: mihi verò ex quo con- desuetu-
tinentiam seruare studui, euenerit contra- dinem.
riū. Tūc equidem illi consului, vt collectū
iam genitale semen excerneret, postea verò
& à narrationibus, & spectaculis, & medita-

*Canto-
ribus &
athletis ru-
gosa pu-
denda.*

tionibus libidinem suscitare potētibus, sum-
mopere cauere. At cantores & athletæ, qui
iam inde ab initio, nullam vitæ partem Ve-
nereis illecebris contaminauerunt, nullam
admittentes huiusmodi vel cogitationē, vel
imaginationem, iis pudenda & exilia, & ru-
gosa, veluti senibus, fieri cōsueuerunt. Nam
præter ea, quæ accidere solent iis, qui proti-
nus à prima iuuentute immodicæ libidini
se se permiserunt, id etiam euenit, vt horum
locorum vasa, amplius patentia, maiorem ad
se sanguinis copiam alliciant: & coeundi cu-
piditas magis increseat, ea videlicet ratione,
quam in cæteris quoque facultatibus videre
est, & quæ à Platone etiam notata est, cū

Ignauia.

inquit: Ignauia quidem exoluit: proprii au-
tem officij exercitatio, robur augere solet.

*Mammæ
turgide.*

Sic mammæ quoque in iis quæ nondū im-
prægnatæ fuerunt, contractæ permanent, in
aliis verò à partu infantulos lactantibus, va-
stissimæ redduntur, atque ita magnæ per-
manent lac emittētes, donec puer fuerit abla-
ctatus: tunc enim haud ita multò post à la-
ctis generatione quiescunt. Igitur omnia
hæc, si bene considerentur, ac prætereà cau-
sæ ob quas in singulis affectis partibus, affe-
ctus ipse consistit, definiantur, non inuti-
lem ad curationis rationem ansam præbere
poterunt. Atqui non est nunc tempus ea tra-
ctare,

Etare, quare adepto huius operis fine, ora-
tioni quoque nostræ hîc finem imponi-
mus.


GALENI DE AFFE-
CTORVM LOCORVM
NOTITIA,
FINIS.

✱



Lugduni,
*Excudebant Philibertus Rolletius,
& Bartholomæus Fræ-
nus.*





Handwritten signature or name, possibly "Johannes" or "Johann", written in a cursive script.

Handwritten text, possibly "Johannes" or "Johann", written in a cursive script.



Handwritten signature or name, possibly "Johannes" or "Johann", written in a cursive script.

